

สรุปรายงานการป๋วย พ.ศ. 2557

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สรุปรายงานการป่วย พ.ศ.2557

ที่ปรึกษา

นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

คณะผู้จัดทำ

กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โทร 0 2590 1494 , 0 2590 1497
โทรสาร 0 2591 8194

พิมพ์ที่

สำนักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ในพระบรมราชูปถัมภ์
2/9 ซอยกรุงเทพฯ - นนทบุรี 31 เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สรุปรายงานการป่วย พ.ศ.2557 นนทบุรี
: สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2556
178 หน้า, ตาราง, แผนภูมิ
ISBN 978 - 616 - 11 - 2740 - 4
สถิติ - - เจ็บป่วย
สุขภาพ
การเจ็บป่วย

สรุปรายงานการป่วย พ.ศ.2557 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยนอกจากระบบฐานข้อมูลรายบุคคล(21แฟ้มมาตรฐาน) ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ และระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยในรายบุคคลจาก 2 กองทุน ได้แก่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (ผ่านสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ) ข้อมูลการเจ็บป่วยที่นำเสนอแสดงความชุก (Prevalence) ของการมารับบริการรักษาพยาบาลในสถานบริการแต่ละระดับ วิเคราะห์และประมวลผลตามโรค/กลุ่มโรค ภาพรวมทั้งประเทศ

ข้อมูลการป่วยที่นำเสนอในเอกสารนี้ได้รับความร่วมมือ จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (ผ่านสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ) และสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล จึงขอขอบคุณหน่วยงานดังกล่าวข้างต้นมา ณ โอกาสนี้

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

ตุลาคม 2558

สารบัญ

คำนำ	
สารบัญ	ก
สารบัญตาราง	ข
สารบัญภาพ	ง
บทนำ	1
ข้อมูลการป่วยของผู้ป่วยนอก	
- สถานการณ์การป่วยจากรายงานผู้ป่วยนอก	5
ข้อมูลการป่วยของผู้ป่วยใน	
- สถานการณ์การป่วยผู้ป่วยใน	12
- สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี	19
- สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยในเด็กกลุ่มอายุระหว่าง แรกเกิด-4 ปี	20
- สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยในกลุ่มอายุระหว่าง 5-14 ปี	21
- สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยในกลุ่มอายุระหว่าง 15-24 ปี	21
- สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยในกลุ่มอายุระหว่าง 15-59 ปี	23
- สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยในกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป	24
- ภาพรวมของสถานการณ์ผู้ป่วยในด้วยสาเหตุภายนอก	24
- การให้บริการด้านการรักษาพยาบาล	
- สัดส่วนการนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยใน	30
- จำนวนวันนอนเฉลี่ยของผู้ป่วยใน	32
- จำนวนโรคเฉลี่ยที่ป่วยต่อครั้งของการนอนในโรงพยาบาล	32
- ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของผู้ป่วยใน	33
ภาคผนวก	
- ผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค)	150
- ตารางการป่วย (Tabulation list for morbidity) 298 กลุ่มโรค	153
- Global Burden of Disease	173

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1	10 ลำดับแรก อัตราผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุการป่วย (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) พ.ศ.2550-2557 (อัตราต่อประชากร 1,000 คน)	8
2	10 ลำดับแรก อัตราผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุการป่วย (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) พ.ศ.2557 (อัตราต่อประชากร 1,000 คน)	8
3	จำนวน และอัตราผู้ป่วยนอก ทั้งประเทศ รายภาค (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) พ.ศ.2557 (อัตราต่อประชากร 1,000 คน)	9
4	10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ พ.ศ.2557	15
5	10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน ทั้งประเทศ และรายภาค (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) พ.ศ.2557	16
6	10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) พ.ศ.2550-2557	17
7	10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน กลุ่มอายุต่ำกว่า 1 ปี (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ พ.ศ.2557	19
8	10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน กลุ่มอายุ แรกเกิด-4 ปี (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ พ.ศ.2557	20
9	10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน กลุ่มอายุ 5-14 ปี (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ พ.ศ.2557	22
10	10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน กลุ่มอายุ 15-24 ปี (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ พ.ศ.2557	22
11	10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน กลุ่มอายุ 15-59 ปี (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ พ.ศ.2557	23
12	10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ พ.ศ.2557	24

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่		หน้า
13	10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน จากสาเหตุภายนอก กลุ่มอายุ แรกเกิด – 14 ปี พ.ศ.2557	28
14	10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน จากสาเหตุภายนอก กลุ่มอายุ 15-59 ปี พ.ศ.2557	29
15	10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน จากสาเหตุ ภายนอก กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป พ.ศ.2557	29
16	จำนวนวันนอนเฉลี่ยผู้ป่วยใน จำแนกประเภทโรงพยาบาล และสิทธิการประกันสุขภาพ พ.ศ.2557	32
17	จำนวนโรคเฉลี่ยที่ป่วยต่อครั้งของการนอนโรงพยาบาล จำแนกตามประเภทโรงพยาบาล และสิทธิการประกันสุขภาพ พ.ศ.2557	32
18	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของผู้ป่วยใน จำแนกประเภทโรงพยาบาล และประเภทสิทธิการประกันสุขภาพ พ.ศ.2557	33
19	จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน รวมทุกการวินิจฉัยโรค อัตราต่อประชากร 100,000 คนจำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยบัญชี จำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2557	36
20	จำนวน และอัตราผู้ป่วยในเฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก อัตราต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วย บัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2557	69
21	จำนวน และอัตราผู้ป่วยในรวมทุกการวินิจฉัยโรค กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป อัตราต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วย บัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2556-2557	102
22	จำนวน และอัตราผู้ป่วยในรวมทุกการวินิจฉัยโรค ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2556-2557	124
23	จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน ตามกลุ่มสาเหตุภายนอก ของการบาดเจ็บ จำแนกเพศ รายภาค/กรุงเทพมหานคร ตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 พ.ศ.2557	144

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
1	อัตราป่วยผู้ป่วยนอกทั้งประเทศ อัตราต่อประชากร 1,000 คน พ.ศ.2546 - 2557	6
2	อัตราการป่วยของผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ พ.ศ.2557	12
3	อัตราการป่วยของผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามภาค พ.ศ.2557	13
4	อัตราการป่วยของผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) พ.ศ.2550-2557	13
5	อัตราการป่วยของผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ พ.ศ.2557	15
6	อัตราการป่วยของผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วยที่สำคัญ พ.ศ.2552-2557	18
7	อัตราการป่วยของผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน จากสาเหตุภายนอก จำแนกตามเพศ พ.ศ.2550 - 2557	25
8	อัตราการป่วยของผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน จากสาเหตุภายนอก จำแนกตามภาคและกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2557	25
9	10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน จากสาเหตุภายนอก พ.ศ.2557	26
10	อัตราการป่วยของผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน จากสาเหตุภายนอก จำแนกตามกลุ่มอายุ พ.ศ.2557	27
11	สัดส่วนการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล จำแนกตามประเภทโรงพยาบาลและ สิทธิการประกันสุขภาพ พ.ศ.2557	30
12	อัตราการป่วยของผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) เปรียบเทียบ 3 กลุ่มโรค(Global Burden of Disease) พ.ศ.2552-2557	31

ความเป็นมา

รายงานการป่วย เป็นข้อมูลที่แสดงความชุกของโรคต่างๆ ที่มีผู้มารับบริการรักษาพยาบาล ในสถานบริการทุกระดับ ในอดีตได้รวบรวมข้อมูลการป่วยจากระบบรายงาน ตามแบบรายงานผู้ป่วยนอก (รง.504) ตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค) แบบรายงานผู้ป่วยในรายโรค (รง.505) ตามกลุ่มสาเหตุ (75กลุ่มโรค) เนื่องจากปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วย เป็นฐานข้อมูลรายบุคคลเพื่อใช้ทดแทนระบบทะเบียนรายงานแบบเดิม ดังนั้น ปีพ.ศ.2556 เป็นต้นมา สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้ยกเลิกการจัดเก็บข้อมูลการป่วยจากระบบรายงานดังกล่าว ปรับเปลี่ยนเป็นนำฐานข้อมูลผู้ป่วยรายบุคคลมาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลโดย กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ซึ่งการนำเสนอข้อมูลแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 รายงานการป่วยผู้ป่วยนอกจากฐานข้อมูลผู้ป่วยนอกรายบุคคลตามรูปแบบ 21 แพ้ม มาตรฐาน โดยยังคงรายละเอียดกลุ่มโรคตามแบบรายงานเดิม ตามแบบรายงานผู้ป่วยนอก (รง.504) ซึ่งแบ่งเป็น 21 กลุ่มโรค โดยนำเสนอรายงานผู้ป่วยนอก เป็นภาพรวมประเทศ จำแนกรายภาค ทั้งจำนวนและอัตราการป่วยต่อประชากร 1,000 คน สำหรับรายงานผู้ป่วยใน นำเสนอภาพรวมประเทศ จำแนกรายภาค แสดงจำนวนและอัตราการป่วยต่อประชากร 100,000 คน รวมทั้งการจัดลำดับโรค 10 ลำดับแรก ในภาพรวมทั้งประเทศ และจำแนกรายภาค ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ

ส่วนที่ 2 รายงานผู้ป่วยในจากฐานข้อมูลรายบุคคลระบบประกันสุขภาพ ได้นำเสนอ ตารางหลักๆ ได้แก่ จำนวนและอัตราผู้ป่วยในรวมทุกการวินิจฉัยโรค ต่อประชากร 100,000 คน (**นับทุก การวินิจฉัยโรคในการมารับบริการรักษาพยาบาล 1 ครั้ง**) จำนวนและอัตราผู้ป่วยในเฉพาะ การวินิจฉัยโรคหลัก ต่อประชากร 100,000 คน (**นับการวินิจฉัยโรคหลักเพียง 1 โรคในการมารับบริการ รักษาพยาบาล 1 ครั้ง**) ภาพรวมประเทศ จำแนกเพศ โรค/กลุ่มโรค การจัดลำดับโรค 10 โรค/กลุ่มโรค จำแนกตามกลุ่มอายุ รวมถึงจำนวนและอัตราผู้ป่วยในรวมทุกการวินิจฉัยโรคต่อประชากร 100,000 คน กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป และเปรียบเทียบข้อมูลปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2556) จำแนกเพศ โรค/กลุ่มโรค ซึ่งการจัดกลุ่มโรค จัดตามตารางการป่วยของบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 โดยแบ่งออกเป็น 298 โรค/กลุ่มโรค

ส่วนที่ 3 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในจากสาเหตุภายนอก ต่อประชากร 100,000 คน (**นับการวินิจฉัยโรคจากสาเหตุภายนอกเพียง 1 สาเหตุในการมารับบริการรักษาพยาบาล 1 ครั้ง**) จำแนกกลุ่มสาเหตุภายนอกหลัก ๆ 35 กลุ่มสาเหตุ ภาพรวมประเทศ จำแนกเพศ รวมทั้งการจัดลำดับ 10 ลำดับสาเหตุภายนอก

นอกจากนี้ ยังแสดงข้อมูลอื่นๆ เช่น วันนอนเฉลี่ยของการมารับบริการต่อปี สัดส่วนการนอน โรงพยาบาล เป็นต้น รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญๆ

การจัดเก็บ และรวบรวมข้อมูล

1. ระบบข้อมูลผู้ป่วยนอก

กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนารูปแบบการจัดเก็บฐานข้อมูลผู้มารับบริการของสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งจากระบบระเบียบรายงานมาเป็นฐานข้อมูลรายบุคคล ซึ่งปัจจุบันฐานข้อมูลดังกล่าวสามารถนำมาใช้ประมวลผลเพื่อทดแทนระบบรายงานเดิม ดังนั้นในปี พ.ศ.2556 เป็นต้นมา จึงยกเลิกการส่งรายงานข้อมูลผู้ป่วยนอกตามแบบรายงาน รง.504 และข้อมูลผู้ป่วยในตามแบบรายงาน รง.505 จากสำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด โดยนำฐานข้อมูลผู้ป่วยนอกรายบุคคลตามรูปแบบ 21 แฟ้มมาตรฐาน มาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรคสำคัญ ฐานข้อมูลดังกล่าวรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยนอกที่มารับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล/สถานีอนามัย โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลศูนย์ โดยสำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัดจัดส่งฐานข้อมูลเป็นรายเดือนมายัง สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลตามปีปฏิทิน

2. ระบบข้อมูลผู้ป่วยใน

ข้อมูลผู้ป่วยในรายบุคคล พ.ศ.2557 รวบรวมข้อมูลจากระบบประกันสุขภาพของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ฐานข้อมูลผู้ป่วยในหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการและครอบครัวจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ) เป็นฐานข้อมูลผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลส่งตรงให้กับหน่วยงานดังกล่าว ซึ่งครอบคลุมสถานบริการสุขภาพที่เข้าร่วมโครงการนั้น ๆ และแสดงรายละเอียดข้อมูลมากขึ้น เช่น เพศ กลุ่มอายุ โรคระดับสถานบริการสุขภาพ แต่ยังมีข้อจำกัดของข้อมูล ไม่ครอบคลุมผู้ป่วยทุกรายที่เข้ามารับบริการรักษายาบาลเป็นผู้ป่วยในของสถานบริการสุขภาพแต่ละแห่ง โดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้ประสานข้อมูลจากหน่วยงานดังกล่าว เฉพาะรายการข้อมูลที่เป็น การบริหารงานสาธารณสุขเท่านั้น

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากฐานข้อมูลผู้ป่วยรายบุคคล

1) ตรวจสอบข้อมูลราย Record โดยตรวจสอบความครบถ้วนของรายการข้อมูลสำคัญๆ (วันเดือนปีเกิด วันเดือนปีที่มารับบริการ เป็นต้น) ความถูกต้องของรหัสโรค ความสัมพันธ์และความเป็นไปได้ ของรหัสโรคที่สำคัญๆ กับเพศ อายุ ความถูกต้องของข้อมูลการให้รหัสโรคที่ต้องเฝ้าระวังที่สำคัญ เช่น ไข้ทรพิษ กาฬโรค เป็นต้น

2) การให้รหัสสาเหตุภายนอกต้องใช้ร่วมกับรหัสการบาดเจ็บ

การประมวลผล

1. รายงานผู้ป่วยนอก ประมวลผลรายปีปฏิทิน ปีละ 1 ครั้ง

1) จำนวน และอัตรา ผู้ป่วยนอกต่อประชากร 1,000 คน ภาพรวมประเทศ และจำแนกรายภาค

2) สาเหตุการป่วย โรค/กลุ่มโรค จัดกลุ่มตามแบบรายงานผู้ป่วยนอก หน่วยนับเป็น รายโรค สำหรับการนับโรคจากการวินิจฉัยโรคของการมารับบริการในแต่ละครั้ง

2. รายงานผู้ป่วยใน ประมวลผลรายปีปฏิทิน ปีละ 1 ครั้ง

1) จำนวน และอัตรา ผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน ภาพรวมประเทศ จำแนกรายภาค และเพศ

2) สาเหตุการป่วย โรค/กลุ่มโรค จัดกลุ่มตามตารางสาเหตุการป่วย (Tabulation list for morbidity) ของบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 (ICD10) จำแนกเป็น 298 โรค/กลุ่มโรค หน่วยนับเป็น ราย สำหรับการนับโรคจากการวินิจฉัยโรคหลัก และหน่วยนับเป็น รายโรค สำหรับการนับโรคจากการวินิจฉัยโรคของการมารับบริการในแต่ละครั้ง

3) จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน ภาพรวมประเทศ จำแนกรายภาคและเพศ สาเหตุภายนอกที่ทำให้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หน่วยนับเป็น ราย

การจัดลำดับ 10 ลำดับโรคของรายงานการป่วย

ในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้นำสาเหตุการป่วยบางโรค / กลุ่มโรค มาจัดลำดับ 10 ลำดับโรค

1. รายงานผู้ป่วยนอก การจัดลำดับโรค ไม่นำกลุ่มโรคดังต่อไปนี้มาจัดลำดับโรค กลุ่มโรคอาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการฯ (R00-R99) และสาเหตุภายนอกอื่นๆที่ทำให้ป่วยหรือตาย (W00-W99, X00-X39, X50-X59, X70-X74, X91-X99, Y00-Y84, Y86-Y89)

2. รายงานผู้ป่วยใน นำสาเหตุการป่วย ตามกลุ่มโรค ของบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 10 มาจัดลำดับโรค โดยไม่นำกลุ่มโรคดังต่อไปนี้มาจัดลำดับโรค ได้แก่ การคลอดของครรภ์เดียว (O80), อาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการฯ (R00-R99) และกลุ่มบุคคลขอรับบริการเพื่อการตรวจและการชันสูตร (Z00-Z99) และกลุ่มโรคอื่นๆที่เหลือของแต่ละบท

การคำนวณอัตราป่วย

ใช้จำนวนประชากรกลางปีปฏิทิน ของส่วนการทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียนโดยแบ่งการคำนวณอัตราป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม

$$\text{สูตรในการคำนวณอัตราผู้ป่วยนอก} = \frac{\text{จำนวนผู้ป่วยนอกช่วงปีหนึ่ง} \times 1,000}{\text{ประชากรกลางปีในปีเดียวกัน}}$$

$$\text{สูตรในการคำนวณอัตราผู้ป่วยใน} = \frac{\text{จำนวนผู้ป่วยในช่วงปีหนึ่ง} \times 100,000}{\text{ประชากรกลางปีในปีเดียวกัน}}$$

$$\text{จำนวนวันโดยเฉลี่ยที่ผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล} = \frac{\text{วันอยู่ของผู้ป่วยจำหน่ายทุกคน}}{\text{จำนวนผู้ป่วยที่จำหน่ายทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน}}$$

คำจำกัดความ

ราย	หมายถึง	จำนวนครั้งของการมารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน สำหรับ
ครั้ง		ในรายงานนี้รวบรวมจากการวินิจฉัยโรคหลักของผู้มารับบริการในแต่ละ
รายโรค	หมายถึง	จำนวนของโรคที่ได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยด้วยโรคนั้นๆ ในแต่ละครั้งที่มาใช้บริการ สำหรับในรายงานนี้ รวบรวมจากทุกการวินิจฉัยโรคของผู้มารับบริการในแต่ละครั้ง

จำนวนวันโดยเฉลี่ยที่ผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล¹ (วันนอนเฉลี่ย)

หมายถึง จำนวนวันโดยเฉลี่ยต่อผู้ป่วยใน 1 คน ที่อยู่รักษาในโรงพยาบาลจนจำหน่ายในระยะเวลาที่กำหนด โดยเฉลี่ยจากวันอยู่ของผู้ป่วยจำหน่ายทุกคนต่อจำนวนผู้ป่วยที่จำหน่ายทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน

การวินิจฉัยโรคหลัก หมายถึง การวินิจฉัยโรคหลัก โรคที่ทำให้ผู้ป่วยต้องมารับการรักษาพยาบาลไม่นับรวมการวินิจฉัยโรคอื่น ๆ ที่เป็นโรคร่วมด้วยในครั้งนั้น

รวมทุกการวินิจฉัยโรค หมายถึง การวินิจฉัยโรคทั้งหมด ที่ผู้ป่วยมารับบริการรักษาพยาบาลในครั้งนั้น ได้แก่ การวินิจฉัยโรคหลัก (Principle) การวินิจฉัยโรคร่วม (Co-morbidity) การวินิจฉัยโรคแทรกซ้อน (Complication) และการวินิจฉัยโรคอื่นๆ (Other)

¹ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์, ศัพทานุกรมข้อมูลสุขภาพ, 2547, โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุ, กรุงเทพฯ


ข้อมูลการป่วยของผู้ป่วยนอก



ในปี พ.ศ. 2557 การนำเสนอข้อมูลการป่วยของผู้ป่วยนอก ได้ประมวลผลจากฐานข้อมูลผู้ป่วยนอกรายบุคคล ตามรูปแบบ 21 แฟ้ม แต่การจำแนกกลุ่มโรคยังคงแบ่งเป็น 21 กลุ่มสาเหตุตาม รง.504 โดยแสดงข้อมูลการป่วยของผู้มารับบริการรักษาพยาบาลในภาพรวมระดับประเทศ และภาคตามกลุ่มโรคต่าง ๆ ซึ่งสถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยนอก พ.ศ.2556 - 2557 จะพบว่า มีแนวโน้มโรคที่เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ ยอดรวมของอัตราป่วยลดลง เนื่องจากพบว่าบางกลุ่มโรค มีอัตราป่วยลดลงซึ่งอาจเนื่องจากเดิมใช้รูปแบบการรายงาน ที่สำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัดรวบรวม หรือประมวลผลส่งเป็นรายเดือนมาเป็นส่วนกลางนำฐานข้อมูลมาตรวจสอบและประมวลผล นอกจากนี้ ข้อจำกัดของข้อมูลผู้ป่วยนอก คือได้รับข้อมูลเฉพาะสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขไม่มีข้อมูลผู้ป่วยของสถานบริการสังกัดอื่น ๆ และกรุงเทพมหานคร

สถานการณ์การป่วยจากรายงานผู้ป่วยนอก

ภาพ 1 อัตราผู้ป่วยนอก ต่อประชากร 1,000 คน พ.ศ.2546 – 2557



แหล่งข้อมูล

ปี พ.ศ. 2546-2555 รายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (รง.504) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

ปี พ.ศ.2556-2557 ฐานข้อมูลผู้ป่วยนอกรายบุคคลตามรูปแบบ 21 แฟ้ม สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

อัตราผู้ป่วยนอกในภาพรวมประเทศ ตั้งแต่พ.ศ.2546 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี โดยที่อัตราผู้ป่วยนอกในช่วงปี พ.ศ. 2549 - 2555 มีอัตราเพิ่มขึ้นมากกว่าในช่วงปี พ.ศ. 2546 - 2548 สำหรับปีพ.ศ.2556-2557 มีอัตราป่วยลดลงเล็กน้อย ซึ่งอาจมีผลจากการเปลี่ยนรูปแบบ การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการนำข้อมูลผู้ป่วยนอกรายบุคคลจากฐานข้อมูล 21 แฟ้ม มาประมวลผลที่ส่วนกลางแทนการวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานที่สำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด รวบรวมจัดส่งเป็นรายเดือนจากสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งในสังกัดเท่านั้น (ภาพที่ 1)

จากตารางที่ 1 อัตราผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ 10 ลำดับแรกในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา กลุ่มโรคที่มีอัตราผู้ป่วยนอกสูงเป็น ลำดับที่ 1 อันดับที่ 2 และ ลำดับที่ 3 จะอยู่ในกลุ่มโรคกลุ่มเดียวกัน ซึ่งเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบไหลเวียนเลือด และกลุ่มโรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม

เมื่อพิจารณาตารางที่ 2 อัตราผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ 10 ลำดับแรก รายภาค พ.ศ.2557 พบว่า โรคระบบไหลเวียนเลือดเป็นลำดับแรกในภาพรวมประเทศ เช่นเดียวกับภาคกลาง ภาคเหนือและภาคใต้ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าโรคระบบทางเดินหายใจสูงเป็นลำดับแรก

ตาราง 1 10 ลำดับแรก อัตราผู้ป่วยนอก ต่อประชากร 1,000 คน ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) พ.ศ. 2550 - 2557

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค)	2550		2551		2552		2553		2554		2555		2556		2557	
		ลำดับ	อัตรา	ลำดับ	อัตรา	ลำดับ	อัตรา	ลำดับ	อัตรา	ลำดับ	อัตรา	ลำดับ	อัตรา	ลำดับ	อัตรา	ลำดับ	อัตรา
10	โรคระบบหายใจ (J00-J99)	1	444.09	1	457.41	1	498.16	1	499.53	1	489.16	1	473.34	1	418.25	3	409.98
11	โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก (K00-K93)	2	263.10	3	282.66	4	288.64	3	312.51	4	333.54	5	333.54	6	326.92	5	323.44
9	โรคระบบไหลเวียนเลือด (I00-I99)	3	255.76	2	283.78	2	306.42	2	345.03	2	398.02	2	425.72	2	414.01	1	438.34
13	โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อเยื่อเสริม (M00-M99)	4	237.92	4	264.16	3	290.73	4	311.12	5	333.39	4	354.91	4	351.66	4	345.13
4	โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม (E00-E90)	5	188.58	5	218.10	5	246.72	5	288.35	3	348.37	3	385.76	3	390.52	2	414.58
1	โรคติดเชื้อและปรสิต (A00-A99,B00-B99)	6	119.16	6	122.60	6	129.35	6	131.94	6	128.55	6	127.53	7	116.71	9	86.97
12	โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (L00-L99)	7	89.10	7	91.68	7	95.53	7	104.29	7	102.92	7	104.93	9	98.64	7	92.26
14	โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ (N00-N99)	8	63.97	8	70.86	8	74.36	8	86.07	8	96.07	8	103.33	8	104.70	10	81.25
7	โรคตาารวมส่วนประกอบของตา (H00-H59)	9	59.86	9	61.86	9	70.42	9	71.85	9	76.70	9	80.67	10	75.62	8	88.88
5	ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม (F00-F99)	10	42.27	10	45.89	10	49.00	10	57.21	10	60.74	10	60.74	12	59.77	12	50.76

ตาราง 2 10 ลำดับแรก อัตราผู้ป่วยนอก ต่อประชากร 1,000 คน ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) พ.ศ. 2557

ลำดับ	กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย	ทั้งประเทศ	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคใต้
1	9	โรคระบบไหลเวียนเลือด(I00-I99)	438.34	594.67	377.60	435.95	385.30
2	4	โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม(E00-E90)	414.58	488.74	416.50	398.98	342.29
3	10	โรคระบบหายใจ(J00-J99)	409.98	418.54	457.60	364.33	367.56
4	13	โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อเยื่อเสริม(M00-M99)	345.13	424.54	392.15	291.89	226.30
5	11	โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก(K00-K93)	323.44	353.67	370.05	273.78	262.68
6	12	โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง(L00-L99)	92.26	98.81	96.05	85.57	86.81
7	7	โรคตาารวมส่วนประกอบของตา(H00-H59)	88.88	85.17	111.44	74.26	66.21
8	1	โรคติดเชื้อและปรสิต(A00 - A99,B00 - B99)	86.97	87.68	97.78	73.48	84.52
9	14	โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ(N00 - N99)	81.25	97.73	85.09	66.66	77.01
10	5	ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม(F00-F99)	50.76	62.84	52.56	42.03	46.58

แหล่งข้อมูล ปี พ.ศ. 2550-2555 รายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (รง.504) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

ปี พ.ศ.2556-2557 ฐานข้อมูลผู้ป่วยนอกรายบุคคลตามรูปแบบ 21 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

หมายเหตุ การจัดลำดับโรค ไม่นำกลุ่มโรคที่ 18 และ21 มาจัดลำดับ (ดูรายชื่อกลุ่มโรคจาก แบบรายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ ในภาคผนวก)

ตาราง 3 จำนวน และอัตราผู้ป่วยนอก อัตราต่อประชากร 1,000 คน ทั้งประเทศ และรายภาค (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) พ.ศ.2557

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย	ภาคเหนือ		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		ภาคกลาง		ภาคใต้		ทั้งประเทศ	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
	รวม	38,927,121	3,288.79	64,638,007	2,963.64	42,366,037	2,575.53	22,194,732	2,420.37	168,125,897	2,836.80
1	โรคติดเชื้อและปรสิต (A00-A99,B00-B99) Certain infectious and parasitic diseases	1,037,818	87.68	2,132,704	97.78	1,208,753	73.48	775,078	84.52	5,154,353	86.97
2	เนื้องอก (รวมมะเร็ง) (C00-C97,D00-D84) Neoplasma	321,918	27.20	580,449	26.61	333,902	20.30	183,527	20.01	1,419,796	23.96
3	โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน (D50-D89) Diseases of the blood and blood forming organs and certain disorders involving the immune mechanism	249,947	21.12	447,202	20.50	261,788	15.91	133,188	14.52	1,092,125	18.43
4	โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม (E00-E90) Endocrine, nutritional and metabolic diseases	5,784,858	488.74	9,084,033	416.50	6,562,969	398.98	3,138,765	342.29	24,570,625	414.58
5	ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม (F00-F99) Mental and behavioural disorders	743,808	62.84	1,146,290	52.56	691,432	42.03	427,099	46.58	3,008,629	50.76
6	โรกระบบประสาท (G00-G99) Diseases of the nervous system	702,731	59.37	1,023,164	46.91	851,238	51.75	355,008	38.71	2,932,141	49.47
7	โรคตาารวมส่วนประกอบของตา (H-H59) Diseases of the eye and adnexa	1,008,047	85.17	2,430,600	111.44	1,221,584	74.26	607,133	66.21	5,267,364	88.88
8	โรคหูและปุ่มกกหู (H60-H95) Disease of the ear and mastoid process	391,433	33.07	434,919	19.94	322,404	19.60	179,905	19.62	1,328,661	22.42
9	โรกระบบไหลเวียนเลือด (I00-I99) Diseases of the circulatory system	7,038,721	594.67	8,235,599	377.60	7,171,103	435.95	3,533,143	385.30	25,978,566	438.34
10	โรกระบบหายใจ (J00-J99) Diseases of the respiratory system	4,953,916	418.54	9,980,511	457.60	5,993,062	364.33	3,370,548	367.56	24,298,037	409.98
11	โรกระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก (K00-K93) Diseases of the digestive system	4,186,092	353.67	8,070,888	370.05	4,503,532	273.78	2,408,729	262.68	19,169,241	323.44
12	โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (L00-L99) Diseases of the skin and subcutaneous tissue	1,169,582	98.81	2,094,814	96.05	1,407,544	85.57	796,061	86.81	5,468,001	92.26
13	โรกระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อเยื่อเสริม (M00-M99) Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue	5,024,961	424.54	8,553,013	392.15	4,801,435	291.89	2,075,203	226.30	20,454,612	345.13
14	โรกระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ (N00-N99) Diseases of the genitourinary system	1,156,742	97.73	1,855,879	85.09	1,096,530	66.66	706,188	77.01	4,815,339	81.25
15	ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด (O00-O99) Complication of pregnancy, childbirth and the puerperium	89,747	7.58	226,906	10.40	175,953	10.70	156,290	17.04	648,896	10.95
16	ภาวะผิดปกติของทารกแรกเกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด (อายุครรภ์ 22 สัปดาห์ขึ้นไป จนถึง 7 วันหลังคลอด) (P00-P96) Certain conditions originating in the perinatal period	27,985	2.36	74,342	3.41	37,057	2.25	14,461	1.58	153,845	2.60

ตาราง 3 จำนวน และอัตราผู้ป่วยนอก อัตราต่อประชากร 1,000 คน ทั้งประเทศ และรายภาค (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) พ.ศ.2557 (ต่อ)

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย	ภาคเหนือ		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		ภาคกลาง		ภาคใต้		ทั้งประเทศ	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
17	รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กำเนิดและโครโมโซมผิดปกติ (Q00-Q99) Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities	33,866	2.86	79,613	3.65	45,313	2.75	34,109	3.72	192,901	3.25
18	อาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นๆ ได้ (R00-R99) Symptoms, signs and abnormal clinical and labooratory findings, not elsewhere classified	4,063,943	343.35	6,394,250	293.18	4,489,426	272.92	2,636,251	287.49	17,583,870	296.69
19	การเป็นพิษและผลที่ตามมา (X00-X49, X60-X69) Poisoning, toxic effect, and their sequelae	16,009	1.35	24,555	1.13	15,675	0.95	7,356	0.80	63,595	1.07
20	อุบัติเหตุจากการขนส่ง และผลที่ตามมา (V01-V99,Y85) Transport accidents and their sequelae	178,687	15.10	381,501	17.49	258,905	15.74	145,726	15.89	964,819	16.28
21	สาเหตุภายนอกอื่น ๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตาย (W00-W99, X00-X19, X20-X29, X30-X39, X50-X59, X70-X84, X91-X99, Y00-Y09, Y20-Y39, Y40-Y84, Y86-Y89) Other external causes of morbidity and mortality (eg: accidents, injuries, intentional self-harm, assault, animals and plants, complications of medical and surgical care and other unspecified causes)	746,310	63.05	1,386,775	63.58	916,432	55.71	510,964	55.72	3,560,481	60.08

แหล่งข้อมูล: ฐานข้อมูลผู้ป่วยนอกรายบุคคลตามรูปแบบ 21 แฟ้ม สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

ข้อมูลการป่วยของผู้ป่วยใน




สถานการณ์การป่วย พ.ศ.2557 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลการป่วยของประชาชนไทย จากข้อมูลผู้ป่วยในที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลและมีสิทธิการรักษาพยาบาลในระบบประกันสุขภาพของประเทศไทย ได้แก่ สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว สำหรับการสรุปผลการรายงานของการวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลผู้ป่วยใน เป็นการจำแนกสาเหตุการป่วยตาม กลุ่มโรค/โรค การจัดลำดับโรคในแต่ละกลุ่มอายุ จำแนกตามเพศ และภูมิภาคต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

สถานการณ์การป่วยผู้ป่วยใน

รูปแบบการเจ็บป่วยของประชาชน พ.ศ.2557 ประมวลผลและวิเคราะห์จากข้อมูลการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมีอัตราการป่วย 25,287.81 ต่อประชากร 100,000 คน และจากการวิเคราะห์ พบว่า เพศหญิง มีอัตราการป่วยสูงกว่าเพศชาย (26,419.62 และ 24,116.63) (ภาพที่ 2) และเมื่อพิจารณาตามภูมิภาคต่าง ๆ ภาคเหนือมีอัตราการป่วยมากเป็นอันดับ 1 รองลงมาเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ กรุงเทพมหานคร และภาคกลาง (26,777.19, 25,996.90, 25,591.77, 24,656.27 และ 23,324.91) ต่อประชากร 100,000 คน ตามลำดับ (ภาพ 3)

ภาพ 2 อัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค)
จำแนกตามเพศ พ.ศ.2557




รวบรวม / วิเคราะห์ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สทส.)

ภาพ 3 อัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค)
จำแนกตามภาค พ.ศ.2557




รวบรวม / วิเคราะห์ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สภส.)

ภาพ 4 อัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค)
พ.ศ.2550-2557



รวบรวม / วิเคราะห์ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สภส.)

จากภาพที่ 4 จะเห็นได้ว่าอัตราผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นทุกปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 จนถึง พ.ศ.2556 อัตราการป่วยผู้ป่วยในมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มาก ระหว่าง ปี พ.ศ.2555 – 2556 เมื่อพิจารณาข้อมูลในปี พ.ศ.2557 พบว่าอัตราผู้ป่วยในลดลง แต่ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าว ไม่สามารถสรุปได้ว่าแนวโน้มการป่วยของผู้ป่วยในลดลง เนื่องจากยังขาดข้อมูลของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขบางแห่ง


พ.ศ. 2557 สาเหตุการป่วยที่พบสูงที่สุด มีสาเหตุมาจากโรคความดันโลหิตสูง รองลงมาได้แก่ เบาหวาน และโลหิตจางจากไขกระดูกฝ่อและโลหิตจางชนิดอื่น สำหรับความแตกต่างระหว่างเพศ พบว่าสาเหตุการป่วยในลำดับแรกๆ มีความคล้ายคลึงกันโดยเพศหญิงมีอัตราการป่วยสูงกว่าเพศชาย (ตาราง 4)

อัตราผู้ป่วยใน 10 ลำดับแรก จำแนกรายภาค พบว่าผู้ป่วยในมีกลุ่มสาเหตุการป่วยด้วย โรคความดันโลหิตสูงเป็นลำดับแรก โดยภาคเหนือมีอัตราป่วยสูงสุด รองลงมาเป็นภาคกลาง (ไม่รวมกทม.) ส่วนโรคเบาหวานเป็นสาเหตุการป่วยลำดับที่สอง ซึ่งพบที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สูงที่สุด โดยภาคใต้มีอัตราการป่วยต่ำที่สุด กลุ่มสาเหตุการป่วยที่เป็นลำดับที่สาม ได้แก่ ภาวะโลหิตจางจาก ไขกระดูกฝ่อและโลหิตจางชนิดอื่น โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราป่วยสูงสุด ลำดับที่สี่ คือภาวะไตวายมีอัตราป่วยของผู้ป่วยในสูงสุดที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและลำดับที่ห้า ได้แก่ โรคติดเชื้อ ที่ลำไส้พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือสูงกว่าภาคอื่นๆ (ตาราง 5)

สำหรับอัตราผู้ป่วยใน 10 ลำดับแรก เปรียบเทียบ พ.ศ. 2550 – 2557 จากตาราง 6 พบว่า โรคที่พบในผู้ป่วยในสูง เป็นลำดับแรก ในปี พ.ศ. 2550-2557 ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง (เช่นเดียวกับอัตราผู้ป่วยในจำแนกรายภาค ปี พ.ศ.2557 ดังตาราง 5) สำหรับโรคเบาหวาน สูงเป็นลำดับที่สอง รองลงมาเป็น ภาวะโลหิตจางจากไขกระดูกฝ่อและโลหิตจางชนิดอื่น ไตวาย โรคติดเชื้อ ที่ลำไส้ และโรคหัวใจรูปแบบอื่น ๆ

เมื่อพิจารณาภาวะการเจ็บป่วยของผู้ป่วยในตามกลุ่มอายุ พบว่า การเจ็บป่วยของประชากร ที่มีอัตราป่วยสูงจะอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป รองลงมาเป็นกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี โดยเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของอัตราป่วยของผู้ป่วยในระหว่างเพศ จะเห็นว่า สัดส่วนของผู้ป่วยเพศชายสูงกว่าผู้ป่วยเพศหญิง ยกเว้นในกลุ่มอายุ 15-59 ปี ซึ่งพบว่าผู้ป่วยในเพศหญิง มากกว่าผู้ป่วยในเพศชาย เนื่องจากสตรีในวัยนี้ส่วนใหญ่ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยมีสาเหตุเนื่องจากการตั้งครรภ์ การแท้ง หรือคลอดบุตร (ภาพ 5)

ภาพ 5 อัตราป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค)
จำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ พ.ศ.2557



รวบรวม / วิเคราะห์ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)

ตาราง 4 10 ลำดับแรกอัตราป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค)
จำแนกตามเพศ พ.ศ.2557

ลำดับ	กลุ่มโรค/รหัสกลุ่มโรค	รวม	ชาย	หญิง
1	(I10-I15) โรคความดันโลหิตสูง	1,561.43	1,343.23	1,772.29
2	(E10-E14) เบาหวาน	1,032.50	807.91	1,249.54
3	(D60-D64) โลหิตจางจากไขกระดูกฝ่อและโลหิตจางชนิดอื่น	819.50	755.87	881.00
4	(N17-N19) ไตวาย	813.95	826.31	802.00
5	(A00-A09) โรคติดเชื้อที่ลำไส้	678.93	647.72	709.10
6	(I30-I52) รูปแบบอื่นของโรคหัวใจ	670.08	630.65	708.18
7	(J09-J18) ไข้หวัดใหญ่และปอดบวม	636.51	723.75	552.20
8	(J40-J47) โรคเรื้อรังของทางเดินหายใจส่วนล่าง	514.63	648.28	385.47
9	(K20-K31) โรคของหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้น	425.43	423.23	427.55
10	(I20-I25) โรคหัวใจขาดเลือด	407.70	450.81	366.03

รวบรวม / วิเคราะห์ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)

ตาราง 5 10 ลำดับแรก อัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร100,000 คน(รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ทั้งประเทศและรายภาค(ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) พ.ศ.2557

ลำดับ	กลุ่มโรค/รหัสกลุ่มโรค	ทั้งประเทศ	ภาคกลางไม่รวม กทม.	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคเหนือ	ภาคใต้
1	(I10-I15) โรคความดันโลหิตสูง	1,561.43	1,644.44	1,426.12	1,738.64	1,415.67
2	(E10-E14) เบาหวาน	1,032.50	1,012.75	1,186.14	962.64	805.25
3	(D60-D64) โลหิตจางจากไขกระดูกฝ่อและโลหิตจางชนิดอื่น	819.50	768.26	933.71	878.60	610.91
4	(N17-N19) ไตวาย	813.95	682.22	1,003.78	900.80	591.79
5	(A00-A09) โรคติดเชื้อที่ลำไส้	678.93	582.97	783.94	688.97	819.57
6	(I30-I52) รูปแบบอื่นของโรคหัวใจ	670.08	658.68	644.16	751.67	604.29
7	(J09-J18) ไข้หวัดใหญ่และปอดบวม	636.51	591.41	724.20	651.64	627.29
8	(J40-J47) โรคเรื้อรังของทางเดินหายใจส่วนล่าง	514.63	450.22	463.34	691.91	675.61
9	(K20-K31) โรคของหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้น	425.43	367.34	460.89	460.79	514.99
10	(I20-I25) โรคหัวใจขาดเลือด	407.70	480.73	301.09	396.97	438.40

รวบรวม / วิเคราะห์ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สภส.)

ตาราง 6 10ลำดับแรก อัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) พ.ศ. 2550-2557


ลำดับ	กลุ่มโรค/รหัสกลุ่มโรค	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557
1	(I10-I15) โรคความดันโลหิตสูง	1,025.67	1,150.26	1,229.59	1,349.39	1,433.61	1,570.63	1,621.72	1,561.43
2	(E10-E14) เบาหวาน	807.03	857.65	891.72	654.18	968.22	1,050.05	1,081.25	1,032.50
3	(D60-D64) โลหิตจางจากไขกระดูกฝ่อ และโลหิตจางชนิดอื่น	539.55	667.91	746.54	828.65	829.43	905.19	895.16	819.50
4	(N17-N19) ไตวาย	424.40	484.62	532.81	606.11	643.22	743.46	806.01	813.95
5	(A00-A09) โรคติดเชื้อที่ลำไส้	799.40	778.80	764.04	796.43	743.69	737.96	751.91	678.93
6	(I30-I52) รูปแบบอื่นของโรคหัวใจ	497.97	544.01	575.55	602.05	654.15	688.24	693.55	670.08
7	(J09-J18) ไข้หวัดใหญ่และปอดบวม	449.33	465.66	552.81	643.87	625.96	662.78	637.75	636.51
8	(J40-J47) โรคเรื้อรังของทางเดินหายใจส่วนล่าง	543.98	545.37	562.21	588.12	591.64	580.04	553.63	514.63
9	(K20-K31) โรคของหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้น	519.88	532.22	505.64	490.88	458.82	474.38	468.21	425.43
10	(I20-I25) โรคหัวใจขาดเลือด	348.05	368.11	382.68	397.24	412.70	427.52	431.91	407.70

รวบรวม / วิเคราะห์ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สทส.)

ภาพ 6 อัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค)
จำแนกตามสาเหตุการป่วยที่สำคัญ พ.ศ.2552 – 2557



รวบรวม / วิเคราะห์ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สภส.)

อัตราผู้ป่วยในจำแนกตามสาเหตุการป่วยที่สำคัญ ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง ความดันโลหิตสูง โรคทางจิตและความผิดปกติของพฤติกรรม โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง(ตับ ปอด เต้านม ปากมดลูก) โรคหัวใจ ซึ่งโรคทั้งหมดจัดอยู่ในกลุ่มโรคเรื้อรังและสาเหตุจากอุบัติเหตุจากรถ จากภาพ 6 พบว่า ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มสาเหตุการป่วย โดยเฉพาะกลุ่มโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและ โรคเบาหวาน มีอัตราการป่วยของผู้ป่วยในที่เพิ่มสูงมากกว่ากลุ่มโรคอื่นๆ ซึ่งโรคเหล่านี้ล้วนจัดอยู่ในกลุ่มโรคที่สามารถป้องกันได้แทบทั้งสิ้น (อัตราการป่วยในปี พ.ศ.2557 ที่ลดลงอาจมีผลมาจากข้อมูลที่ได้รับไม่ครบถ้วน ดังที่กล่าวมาข้างต้น)

สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี

การเจ็บป่วยของผู้ป่วยใน ในกลุ่มเด็กอายุ ต่ำกว่า 1 ปี จะเห็นว่าส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากภาวะมีเลือดออกและความผิดปกติของเลือดของทารกในครรภ์และแรกเกิด รองลงมา ได้แก่ ความผิดปกติของระบบหายใจและระบบหัวใจและหลอดเลือดที่พบเฉพาะในระยะปริกำเนิด ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง และความผิดปกติเกี่ยวกับอายุครรภ์และการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ที่พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (ตาราง 7)

ตาราง 7 10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน กลุ่มอายุต่ำกว่า 1ปี
(รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ พ.ศ.2557

ลำดับ	รหัสกลุ่มโรค/กลุ่มโรค	รวม	ชาย	หญิง
1	(P50-P61) เลือดออกและความผิดปกติของเลือดของทารกในครรภ์และแรกเกิด	24,112.93	25,478.28	22,659.25
2	(P20-P29) ความผิดปกติของระบบหายใจและระบบหัวใจและหลอดเลือดที่พบเฉพาะในระยะปริกำเนิด	10,972.20	12,539.68	9,303.30
3	(P05-P08) ความผิดปกติเกี่ยวกับอายุครรภ์และการเติบโตของทารกในครรภ์	10,213.45	10,004.39	10,436.03
4	(A00-A09) โรคติดเชื้อที่ลำไส้	6,952.23	8,064.73	5,767.76
5	(J09-J18) ไข้หวัดใหญ่และปอดบวม	5,933.35	7,197.81	4,587.09
6	(P35-P39) การติดเชื้อที่พบเฉพาะในระยะปริกำเนิด	4,573.71	4,862.54	4,266.18
7	(P70-P74) ความผิดปกติชั่วคราวของต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิซึมที่พบเฉพาะกับทารกในครรภ์และแรกเกิด	4,536.95	4,746.79	4,313.54
8	(P00-P04) ทารกในครรภ์และแรกเกิดได้รับผลจากปัจจัยทางมารดาและภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ การเจ็บครรภ์ และการคลอด	4,120.25	4,237.91	3,994.99
9	(J20-J22) การติดเชื้อเฉียบพลันแบบอื่นที่ทางเดินหายใจส่วนล่าง	3,935.48	4,880.23	2,929.62
10	(Q38-Q45) รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิดแบบอื่นของระบบย่อยอาหาร	2,653.19	3,056.87	2,223.39

รวบรวม / วิเคราะห์ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สทส.)

สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยในเด็ก กลุ่มอายุ แรกเกิด-4 ปี

การเจ็บป่วยของผู้ป่วยใน ในเด็กกลุ่มอายุแรกเกิด-4 ปี พบว่า กลุ่มโรคที่พบมากที่สุดในระดับต้นๆ มักเกิดจากโรคติดเชื้อ ได้แก่ ภาวะมีเลือดออกและความผิดปกติของเลือดของทารกในครรภ์และแรกเกิด รองลงมา ได้แก่ โรคติดเชื้อที่ลำไส้ ไข้หวัดใหญ่และปอดบวม และการติดเชื้อเฉียบพลันแบบอื่นที่ทางเดินหายใจส่วนล่าง ตามลำดับ ซึ่งทุกสาเหตุพบในเพศชายมากกว่าในเพศหญิง (ตาราง 8)

ตาราง 8 10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน กลุ่มอายุแรกเกิด - 4 ปี (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ พ.ศ.2557

ลำดับ	รหัสกลุ่มโรค/กลุ่มโรค	รวม	ชาย	หญิง
1	(P50-P61) เลือดออกและความผิดปกติของเลือดของทารกในครรภ์และแรกเกิด	4,436.24	4,690.19	4,166.19
2	(A00-A09) โรคติดเชื้อที่ลำไส้	4,005.62	4,494.08	3,486.18
3	(J09-J18) ไข้หวัดใหญ่และปอดบวม	3,338.63	3,817.69	2,829.20
4	(J20-J22) การติดเชื้อเฉียบพลันแบบอื่นที่ทางเดินหายใจส่วนล่าง	2,511.12	2,960.61	2,033.12
5	(J00-J06) การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนเฉียบพลัน	2,183.89	2,497.05	1,850.87
6	(P20-P29) ความผิดปกติของระบบหายใจและระบบหัวใจและหลอดเลือดที่พบเฉพาะในระยะปริกำเนิด	2,018.64	2,308.37	1,710.53
7	(P05-P08) ความผิดปกติเกี่ยวกับอายุครรภ์และการเติบโตของทารกในครรภ์	1,879.05	1,841.66	1,918.80
8	(P35-P39) การติดเชื้อที่พบเฉพาะในระยะปริกำเนิด	841.46	895.12	784.39
9	(P70-P74) ความผิดปกติชั่วคราวของต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิซึมที่พบเฉพาะกับทารกในครรภ์และแรกเกิด	834.70	873.82	793.10
10	(P00-P04) ทารกในครรภ์และแรกเกิดได้รับผลจากปัจจัยทางมารดาและภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ การเจ็บครรภ์ และการคลอด	758.03	780.14	734.53

รวบรวม / วิเคราะห์ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สภส.)

สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยในกลุ่มอายุระหว่าง 5-14 ปี

กลุ่มโรคที่เป็นสาเหตุสำคัญลำดับแรกของผู้ป่วยใน ในกลุ่มอายุนี้นี้ ได้แก่ โรคติดเชื้อที่ลำไส้ โลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงแตก การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนเฉียบพลัน และไข้เด็งกี/ไข้เลือดออกเด็งกีตามลำดับ โดยรูปแบบการป่วยส่วนใหญ่พบในเพศชายสูงกว่าเพศหญิงไม่มากนัก (ตาราง 9)

สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยในกลุ่มอายุระหว่าง 15-24 ปี

สำหรับกลุ่มโรคที่เป็นปัญหาสำคัญในกลุ่มอายุนี้อยู่ในช่วงวัยรุ่น ใน 5 ลำดับแรก ได้แก่ ภาวะแทรกซ้อนของการเจ็บครรภ์และการคลอด, การดูแลมารดาที่มีปัญหาของทารกในครรภ์ และโพรงน้ำคร่ำรวมทั้งปัญหาในการคลอด, การบาดเจ็บที่ศีรษะ และภาวะอื่นทางสูติกรรม มิได้จำแนกไว้ที่ใดตามลำดับ (ตาราง 10)

เมื่อเปรียบเทียบรูปแบบการเจ็บป่วยระหว่างเพศ จะเริ่มพบความแตกต่างของการเจ็บป่วยในเพศชายและเพศหญิง โดยพบว่าในเพศชาย กลุ่มโรคที่ทำให้ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสูงสุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ การบาดเจ็บที่ศีรษะ, โรคติดเชื้อที่ลำไส้ โลหิตจางจากไขกระดูกฝ่อและโลหิตจางชนิดอื่น และโรคของไส้ติ่ง ตามลำดับ

ในส่วนของผู้ป่วยในเพศหญิงที่มีอายุระหว่าง 15 - 24 ปี ซึ่งจัดว่าเป็นช่วงวัยรุ่นและสตรีวัยเจริญพันธุ์ สาเหตุที่พบลำดับแรกๆ ส่วนใหญ่จึงเกี่ยวกับภาวะการตั้งครรภ์และการคลอด ได้แก่ภาวะแทรกซ้อนของการเจ็บครรภ์และการคลอด, การดูแลมารดาที่มีปัญหาของทารกในครรภ์ และโพรงน้ำคร่ำรวมทั้ง ปัญหาในการคลอด, ภาวะอื่นทางสูติกรรม มิได้จำแนกไว้ที่ใด และการบาดเจ็บที่ศีรษะ ตามลำดับ

ตาราง 9 10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน กลุ่มอายุ 5-14 ปี
(รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ พ.ศ.2557

ลำดับ	รหัสกลุ่มโรค/กลุ่มโรค	รวม	ชาย	หญิง
1	(A00-A09) โรคติดเชื้อที่ลำไส้	577.16	612.03	540.18
2	(D55-D59) โลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงแตก	500.25	494.02	506.86
3	(J00-J06) การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนเฉียบพลัน	369.92	396.32	341.92
4	(A90-A91) ไข้เด็งกี่/ไข้เลือดออกเด็งกี่	298.31	294.39	302.48
5	(K20-K31) โรคของหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้น	279.66	271.80	288.01
6	(J09-J18) ไข้หวัดใหญ่และปอดบวม	263.79	283.88	242.48
7	(J20-J22) การติดเชื้อเฉียบพลันแบบอื่นที่ทางเดินหายใจส่วนล่าง	217.12	244.23	188.37
8	(K35-K38) โรคของไส้ติ่ง	195.10	210.28	179.00
9	(S00-S09) การบาดเจ็บที่ศีรษะ	176.87	242.20	107.58
10	(J40-J47) โรคเรื้อรังของทางเดินหายใจส่วนล่าง	169.21	206.43	129.74

รวบรวม / วิเคราะห์ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)

ตาราง 10 10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน กลุ่มอายุ 15-24 ปี
(รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ พ.ศ.2557

ลำดับ	รหัสกลุ่มโรค/กลุ่มโรค	รวม	ชาย	หญิง
1	(O60-O75) ภาวะแทรกซ้อนของการเจ็บครรภ์และการคลอด	1,365.84	0.00	1,365.84
2	(O30-O48) การดูแลมารดาที่มีปัญหาของทารกในครรภ์และโพรงน้ำคร่ำ รวมทั้งปัญหาในการคลอด	1,178.38	0.00	1,178.38
3	(O95-O99) ภาวะอื่นทางสูติกรรม มิได้จำแนกไว้ที่ใด	505.86	0.00	505.86
4	(S00-S09) การบาดเจ็บที่ศีรษะ	375.11	602.10	137.64
5	(O00-O08) การตั้งครรภ์ที่สิ้นสุดด้วยการแท้ง	348.10	0.00	348.10
6	(A00-A09) โรคติดเชื้อที่ลำไส้	244.60	172.96	319.55
7	(D60-D64) โลหิตจางจากไขกระดูกฝ่อและโลหิตจางชนิดอื่น	220.70	158.33	285.95
8	(K35-K38) โรคของไส้ติ่ง	193.68	182.46	205.41
9	(D55-D59) โลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงแตก	180.25	121.92	241.28
10	(A90-A91) ไข้เด็งกี่/ไข้เลือดออกเด็งกี่	173.58	180.92	165.90

รวบรวม / วิเคราะห์ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)

สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยในกลุ่มอายุระหว่าง 15-59 ปี

การเจ็บป่วยของประชากรในช่วงวัย 15 – 59 ปีครอบคลุม 3 กลุ่มวัย วัยรุ่น วัยเจริญพันธุ์ และวัยทำงาน จะเห็นว่า สาเหตุการป่วยใน ลำดับที่สอง และลำดับที่สาม จึงเป็นสาเหตุการป่วยในเพศหญิง สำหรับสาเหตุการป่วยในกลุ่มนี้ที่พบ 5 ลำดับแรก คือ โรคความดันโลหิตสูง การดูแลมารดาที่มีปัญหาของทารกในครรภ์และโพรงน้ำคร่ำรวมทั้งปัญหาในการคลอด ภาวะแทรกซ้อนของการเจ็บครรภ์และการคลอด เบาหวาน และโลหิตจางจาก ไชกระดูกฝ่อและโลหิตจางชนิดอื่น สำหรับเพศชาย สาเหตุการป่วยสำคัญที่พบ ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน การบาดเจ็บที่ศีรษะ โลหิตจางจากไชกระดูกฝ่อและโลหิตจางชนิดอื่น และไตวาย สำหรับเพศหญิง สาเหตุการป่วยที่สำคัญได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง การดูแลมารดาที่มีปัญหาของทารกในครรภ์และโพรงน้ำคร่ำรวมทั้งปัญหาในการคลอด ภาวะแทรกซ้อนของการเจ็บครรภ์และการคลอด เบาหวาน และโลหิตจางจากไชกระดูกฝ่อและโลหิตจางชนิดอื่น (ตาราง 11)

ตาราง 11 10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน
กลุ่มอายุ 15-59 ปี (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ พ.ศ.2557

ลำดับ	รหัสกลุ่มโรค/กลุ่มโรค	รวม	ชาย	หญิง
1	(I10-I15) โรคความดันโลหิตสูง	621.41	561.51	680.09
2	(O30-O48) การดูแลมารดาที่มีปัญหาของทารกในครรภ์และโพรงน้ำคร่ำรวมทั้งปัญหาในการคลอด	591.48	0.00	591.48
3	(O60-O75) ภาวะแทรกซ้อนของการเจ็บครรภ์และการคลอด	578.51	0.00	578.51
4	(E10-E14) เบาหวาน	526.77	459.39	592.79
5	(D60-D64) โลหิตจางจากไชกระดูกฝ่อและโลหิตจางชนิดอื่น	480.97	472.09	489.67
6	(N17-N19) ไตวาย	345.60	387.50	304.56
7	(S00-S09) การบาดเจ็บที่ศีรษะ	282.85	451.79	117.35
8	(A00-A09) โรคติดเชื้อที่ลำไส้	282.44	229.38	334.42
9	(I30-I52) รูปแบบอื่นของโรคหัวใจ	282.10	292.62	271.80
10	(K20-K31) โรคของหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้น	263.41	276.89	250.20

รวบรวม / วิเคราะห์ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สภส.)

สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยในกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป

ผู้ป่วยในที่เป็นผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป พบว่าสาเหตุการป่วยใน 2 ลำดับแรก เป็นสาเหตุการป่วยด้วยโรคเรื้อรังสำคัญ ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง และ เบาหวาน ซึ่งพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย สาเหตุการป่วยที่พบบรองลงมาคือ ไตวาย พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง รูปแบบอื่นของโรคหัวใจ , โลหิตจางจากไขกระดูกฝ่อและโลหิตจางชนิดอื่น พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย และโรคเรื้อรังของทางเดินหายใจส่วนล่าง , โรคหัวใจขาดเลือด พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง ตามลำดับ (ตาราง 12)

ตาราง 12 10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน
กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ พ.ศ.2557

ลำดับ	รหัสกลุ่มโรค/กลุ่มโรค	รวม	ชาย	หญิง
1	(I10-I15) โรคความดันโลหิตสูง	8,150.88	7,585.77	8,602.31
2	(E10-E14) เบาหวาน	4,829.48	3,910.92	5,563.25
3	(N17-N19) ไตวาย	4,130.35	4,424.73	3,895.19
4	(I30-I52) รูปแบบอื่นของโรคหัวใจ	3,357.58	3,329.50	3,380.01
5	(D60-D64) โลหิตจางจากไขกระดูกฝ่อและโลหิตจางชนิดอื่น	3,246.15	3,070.24	3,386.68
6	(J40-J47) โรคเรื้อรังของทางเดินหายใจส่วนล่าง	2,475.19	3,611.90	1,567.13
7	(I20-I25) โรคหัวใจขาดเลือด	2,233.46	2,589.83	1,948.78
8	(J09-J18) ไข้หวัดใหญ่และปอดบวม	1,970.41	2,333.82	1,680.11
9	(H25-H28) ความผิดปกติที่แก้วตา	1,849.67	1,674.22	1,989.83
10	(K20-K31) โรคของหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้น	1,787.15	2,125.85	1,516.59

รวบรวม / วิเคราะห์ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)

ภาพรวมของสถานการณ์ป่วยของผู้ป่วยในจากสาเหตุภายนอก

เมื่อนำข้อมูลจากฐานข้อมูลผู้ป่วยในรายบุคคลของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการและครอบครัว ซึ่งครอบคลุมผู้ป่วยใน ตามสิทธิการรักษานั้น ๆ และเฉพาะโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว มาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลการป่วยจากสาเหตุภายนอก สามารถจำแนกได้มากกว่าระบบรายงาน เช่น สาเหตุภายนอกของการบาดเจ็บ เพศ กลุ่มอายุ ค่าใช้จ่าย วันนอนเฉลี่ย เป็นต้น ทั้งนี้ข้อมูลผู้ป่วยใน พ.ศ.2557 ไม่รวมข้อมูลผู้ป่วยในสิทธิการรักษาประกันสังคม ซึ่งในปีนี้มีผู้ป่วยในบาดเจ็บจากสาเหตุภายนอกลดลงจาก พ.ศ.2556 จาก อัตรา 732.69 เป็น 637.92 เพศชาย อัตรา 979.50 ลดลงเป็น 842.38 เพศหญิง อัตรา 493.96 ลดลงเป็น 443.33 ต่อประชากร 100,000 คน (ภาพ 7)

เปรียบเทียบรายภาค จะพบว่า ภาคเหนือมีอัตราผู้ป่วยผู้ป่วยในจากสาเหตุภายนอกสูงกว่าภาคอื่นๆ โดย พ.ศ. 2557 อัตราผู้ป่วยของผู้ป่วยในรายภาคเรียงตามลำดับดังนี้ ภาคเหนือ 748.81, ภาคใต้ 690.98, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 657.05, ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) 603.28 และกรุงเทพมหานคร 348.50 (ภาพ 8)

ภาพ 7 อัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน จากสาเหตุภายนอก จำแนกตามเพศ พ.ศ.2550-2557




รวบรวม / วิเคราะห์ : สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สภส.)

ภาพ 8 อัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน จากสาเหตุภายนอก จำแนกตามภาคและกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2557




รวบรวม / วิเคราะห์ : สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สภส.)

สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยในจากสาเหตุภายนอก ภาพรวมทั้งประเทศ เมื่อนำมาจัดลำดับ 10 ลำดับแรก พ.ศ.2557 สาเหตุของการป่วย ที่พบสูงที่สุดคือ การพลัดตกหกล้ม, บาดเจ็บจากการถูวัตถุ กลไกที่ไม่มีชีวิต และ ผู้ขับขี่รถยนต์บาดเจ็บในอุบัติเหตุจากการขนส่ง (ภาพ 9) เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มอายุ อย่างหยาบๆ พบว่า อัตราการป่วยสูงสุด ได้แก่ กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นอัตราต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 976.63 รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 15-24 ปี อัตรา 695.09 กลุ่มอายุ แรกเกิด-4 ปี อัตรา 653.75 กลุ่มอายุ 5 - 14 ปี อัตรา 589.82 กลุ่มอายุ 15-59 ปี อัตรา 575.61 และกลุ่มอายุ ต่ำกว่า 1 ปี อัตรา 390.06 ตามลำดับ (ภาพ 10)

ภาพ 9 10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน
จากสาเหตุภายนอก พ.ศ.2557




รวบรวม / วิเคราะห์ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สภส.)

ภาพ 10 อัตราป่วยการของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน จากสาเหตุภายนอก
จำแนกตามกลุ่มอายุ พ.ศ.2557



รวบรวม / วิเคราะห์ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สทส.)

สถานการณ์ป่วยของผู้ป่วยในด้วยสาเหตุภายนอก กลุ่มอายุ แรกเกิด - 14 ปี

สาเหตุภายนอกที่เป็นสาเหตุการป่วยสำคัญในกลุ่มอายุนี้นี้ ได้แก่ การพลัดตกหกล้ม บาดเจ็บจากการถูวัตถุลิ่มที่ไม่มีชีวิต และสัมผัสกับสัตว์หรือพืชมีพิษ เมื่อเปรียบเทียบกับในกลุ่มอายุพบว่า การพลัดตกหกล้ม เป็นสาเหตุที่พบมากที่สุดในทุกกลุ่มอายุและสูงสุดในกลุ่มอายุ 1-4 ปี โดยการบาดเจ็บจากสาเหตุภายนอก ในกลุ่มอายุ ต่ำกว่า 1 ปี ได้แก่ การพลัดตกหกล้ม สาเหตุรองลงมา คือ บาดเจ็บจากการถูวัตถุลิ่มที่ไม่มีชีวิต การบาดเจ็บจากสาเหตุภายนอก ในกลุ่มอายุ 1-4 ปี สูงที่สุด ได้แก่ การพลัดตกหกล้ม เช่นกัน สาเหตุรองลงมา คือ บาดเจ็บจากการถูวัตถุลิ่มที่ไม่มีชีวิต ในกลุ่มอายุ 5-14 ปี ได้แก่ การพลัดตกหกล้ม สาเหตุรองลงมา คือ บาดเจ็บจากการถูวัตถุลิ่มที่ไม่มีชีวิต (ตารางที่ 13)

ตาราง 13 10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน
จากสาเหตุภายนอก กลุ่มอายุแรกเกิด – 14 ปี พ.ศ.2557

ลำดับ	รหัสกลุ่มโรค/กลุ่มโรค	<1 ปี	1-4 ปี	5-14 ปี	แรกเกิด - 14 ปี
1	การพลัดตกหกล้ม (W00-W19)	93.60	193.23	168.92	170.83
2	บาดเจ็บจากการถูกวัตถุกลไกที่ไม่มีชีวิต (W20-W49)	29.35	130.59	97.36	102.03
3	สัมผัสกับสัตว์หรือพืชมีพิษ (X20-X29)	29.20	55.28	64.35	59.92
4	ผู้ใช้รถจักรยานยนต์บาดเจ็บในอุบัติเหตุจากการขนส่ง (V20-V29)	8.69	18.89	61.25	47.11
5	การเป็นพิษโดยอุบัติเหตุ (X40-X49)	40.32	81.55	25.16	40.76
6	บาดเจ็บจากการถูกกระทำจากสิ่งมีชีวิต (W50-W64)	12.96	44.55	41.64	40.71
7	ผู้ใช้จักรยานบาดเจ็บในอุบัติเหตุจากการขนส่ง (V10-V19)	1.28	21.94	30.85	26.79
8	การถูกความร้อนและสารร้อน (X10-X19)	69.38	46.12	4.50	19.17
9	การถูกทำร้าย (X85-Y09)	8.12	5.20	16.36	12.96
10	วิธีการรักษาทางศัลยกรรมและอายุรกรรมที่มีผลทำให้เกิดความผิดปกติของผู้ป่วย (Y83-Y84)	20.23	12.62	11.82	12.53

รวบรวม / วิเคราะห์ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สภส.)

สถานการณ์ป่วยของผู้ป่วยในด้วยสาเหตุภายนอก กลุ่มอายุ 15-59 ปี และ 60 ปี ขึ้นไป

กลุ่มอายุ 15-59 ปี เป็นกลุ่มวัยทำงาน สาเหตุภายนอกที่เป็นสาเหตุการป่วยที่สำคัญในกลุ่มอายุนี้ ได้แก่ บาดเจ็บจากการถูกวัตถุกลไกที่ไม่มีชีวิต และ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์บาดเจ็บในอุบัติเหตุจากการขนส่ง สาเหตุภายนอกในกลุ่มอายุ 15-24ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยรุ่น อุบัติเหตุที่พบสูงที่สุดคือกลุ่มผู้ใช้จักรยานยนต์บาดเจ็บในอุบัติเหตุจากการขนส่ง สาเหตุรองลงมา ได้แก่ การถูกทำร้าย และบาดเจ็บจากการถูกวัตถุกลไกที่ไม่มีชีวิต ตามลำดับ (ตารางที่ 14) และกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไปพบว่า สาเหตุภายนอกที่สำคัญ 3 ลำดับแรก ได้แก่ การพลัดตกหกล้ม บาดเจ็บจากการถูกวัตถุกลไกที่ไม่มีชีวิต และวิธีการรักษาทางศัลยกรรมและอายุรกรรมที่มีผลทำให้เกิดความผิดปกติของผู้ป่วย โดยที่ผู้สูงอายุเพศหญิงมีอัตราผู้ป่วยในด้วยการพลัดตกหกล้มสูงกว่าเพศชายมาก ส่วนเพศชายบาดเจ็บจากการถูกวัตถุกลไกที่ไม่มีชีวิตสูงกว่าในเพศหญิง (ตารางที่ 15)

ตาราง 14 10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน
จากสาเหตุภายนอก กลุ่มอายุ 15-59 ปี พ.ศ.2557

ลำดับ	รหัสกลุ่มโรค/กลุ่มโรค	15-24 ปี	15-59 ปี
1	บาดเจ็บจากการถูกวัตถุกลไกที่ไม่มีชีวิต (W20-W49)	94.00	101.03
2	ผู้ใช้อักรยานยนต์บาดเจ็บในอุบัติเหตุจากการขนส่ง (V20-V29)	179.02	97.25
3	การพลัดตกหกล้ม (W00-W19)	63.73	90.68
4	การถูกทำร้าย (X85-Y09)	120.18	66.00
5	สัมผัสกับสัตว์หรือพืชมีพิษ (X20-X29)	45.24	46.56
6	การทำร้ายตัวเอง (X60-X84)	50.86	29.96
7	บาดเจ็บจากการถูกกระทำจากสิ่งมีชีวิต (W50-W64)	28.14	27.13
8	วิธีการรักษาทางศัลยกรรมและอายุรกรรมที่มีผลทำให้เกิดความผิดปกติของผู้ป่วย (Y83-Y84)	18.14	25.16
9	การเป็นพิษโดยอุบัติเหตุ (X40-X49)	20.85	17.22
10	ยา เครื่องยาและชีววัตถุที่เป็นสาเหตุให้เกิดอาการแทรกซ้อนเมื่อใช้ในการรักษา (Y40-Y59)	10.89	12.08

รวบรวม / วิเคราะห์ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)

ตาราง 15 10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน
จากสาเหตุภายนอก กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป พ.ศ.2557


ลำดับ	รหัสกลุ่มโรค/กลุ่มโรค	รวม	ชาย	หญิง
1	การพลัดตกหกล้ม (W00-W19)	386.11	315.45	442.55
2	บาดเจ็บจากการถูกวัตถุกลไกที่ไม่มีชีวิต (W20-W49)	126.07	196.09	70.14
3	วิธีการรักษาทางศัลยกรรมและอายุรกรรมที่มีผลทำให้เกิดความผิดปกติของผู้ป่วย (Y83-Y84)	81.17	92.49	72.12
4	ผู้ใช้อักรยานยนต์บาดเจ็บในอุบัติเหตุจากการขนส่ง (V20-V29)	62.08	103.45	29.02
5	สัมผัสกับสัตว์หรือพืชมีพิษ (X20-X29)	62.01	69.43	56.08
6	บาดเจ็บจากการถูกกระทำจากสิ่งมีชีวิต (W50-W64)	45.61	47.99	43.71
7	ยา เครื่องยาและชีววัตถุที่เป็นสาเหตุให้เกิดอาการแทรกซ้อนเมื่อใช้ในการรักษา (Y40-Y59)	35.31	32.85	37.28
8	ภัยอันตรายจากปัจจัยอื่นหรือปัจจัยที่มีได้ระบุโดยบังเอิญ (X58-X59)	32.21	35.46	29.62
9	การเป็นพิษโดยอุบัติเหตุ (X40-X49)	24.06	25.30	23.07
10	การถูกทำร้าย (X85-Y09)	16.87	25.94	9.63

รวบรวม / วิเคราะห์ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)

ภาพ 11 สัดส่วนการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล จำแนกตามประเภทโรงพยาบาล และสิทธิการประกันสุขภาพ พ.ศ.2557



รวบรวม / วิเคราะห์ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สทส.)

ภาพ 11 จากการวิเคราะห์พบว่า สัดส่วนการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยในที่มีสิทธิการรักษาพยาบาลหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ส่วนใหญ่เข้ารับการรักษาในระดับโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลศูนย์ ตามลำดับ โดยที่ผู้ป่วยในที่ใช้สิทธิการรักษาพยาบาลสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการและครอบครัว มีสัดส่วนการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรัฐสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และโรงพยาบาลรัฐอื่น มากกว่าผู้ป่วยในที่ใช้สิทธิอื่นๆ

ภาพ 12 อัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค)
เปรียบเทียบ 3 กลุ่มโรค(Global Burden of Disease) พ.ศ.2552-2557



รวบรวม / วิเคราะห์ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สภส.)

ภาพ 12 เมื่อนำข้อมูลการเกิดโรคมาวិเคราะห์โดยการแบ่งเป็น 3 กลุ่มโรคใหญ่ คือ กลุ่มโรคติดต่อ กลุ่มโรคเรื้อรัง และการบาดเจ็บ เปรียบเทียบกัน ตั้งแต่ พ.ศ. 2552- 2557 พบว่า กลุ่มโรคเรื้อรัง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี

ตาราง 16 จำนวนวันนอนเฉลี่ยผู้ป่วยใน จำแนกประเภทโรงพยาบาล และสิทธิการประกันสุขภาพ พ.ศ.2557

ประเภทโรงพยาบาล	รวม	หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	สวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ	อื่นๆ
โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
โรงพยาบาลศูนย์	5.0	4.9	6.0	4.8
โรงพยาบาลทั่วไป	4.6	4.5	5.8	4.3
โรงพยาบาลชุมชน	3.1	3.1	3.6	2.9
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ	6.8	6.8	6.7	6.4
โรงพยาบาลรัฐอื่นๆ	8.4	9.2	8.3	4.9
โรงพยาบาลเอกชน	3.0	3.0	3.6	3.3
รวม	4.3	4.2	5.8	3.9

รวบรวม / วิเคราะห์ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สภส.)

ตาราง 16 จำนวนวันนอนเฉลี่ยของผู้ป่วยใน รวมเฉลี่ย 4.28 วัน ไม่แตกต่างจากปี พ.ศ.2556 และสิทธิการรักษายาบาลสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการและครอบครัว ยังคงมีจำนวนวันเฉลี่ยสูงสุด 5.75 วัน และเฉลี่ยวันนอนผู้ป่วยใน สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 4.15 วัน เปรียบเทียบกับวันนอนเฉลี่ย แยกตามประเภทโรงพยาบาล พบว่า โรงพยาบาลสังกัดภาครัฐอื่นๆ มีวันนอนเฉลี่ยสูงสุด 8.42 วัน รองลงมาคือ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 6.72 วัน โรงพยาบาลศูนย์ 4.97 วัน โรงพยาบาลทั่วไป 4.62 วัน และโรงพยาบาลชุมชน 3.09 วัน ตามลำดับ

ตาราง 17 จำนวนโรคเฉลี่ยที่ป่วยต่อครั้งของการนอนโรงพยาบาล จำแนกตามประเภทโรงพยาบาล และสิทธิการประกันสุขภาพ พ.ศ.2557

ประเภทโรงพยาบาล	รวม	หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	สวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ	อื่นๆ
โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
โรงพยาบาลศูนย์	3	3	4	2
โรงพยาบาลทั่วไป	3	3	3	2
โรงพยาบาลชุมชน	3	3	3	2
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ	4	4	4	4
โรงพยาบาลรัฐอื่นๆ	3	3	4	2
โรงพยาบาลเอกชน	3	3	2	2
รวม	3	3	4	2

จากตาราง 17 จำนวนโรคเฉลี่ยที่ป่วยต่อครั้งการนอนโรงพยาบาล เท่ากับ 2 เมื่อพิจารณาตามประเภทสิทธิการรักษายาบาล สวัสดิการรักษายาบาล ข้าราชการ และ ครอบครัว มีจำนวนโรคที่ป่วยต่อครั้งการนอนโรงพยาบาล เท่ากับ 4 ซึ่งสูงกว่าสิทธิการรักษายาบาลอื่น

รวบรวม / วิเคราะห์ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สภส.)

ตาราง 18 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยผู้ป่วยใน จำแนกตามประเภทโรงพยาบาลและสิทธิการประกันสุขภาพ
พ.ศ.2557

ประเภทโรงพยาบาล	รวม	หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	สวัสดิการรักษายาบาล ข้าราชการ	อื่นๆ
โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
โรงพยาบาลศูนย์	20,826.96	21,370.15	29,347.40	10,509.14
โรงพยาบาลทั่วไป	14,395.17	14,808.87	20,697.19	7,433.43
โรงพยาบาลชุมชน	5,625.30	5,659.87	8,632.85	3,515.38
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ	52,868.01	50,609.67	63,735.39	30,185.90
โรงพยาบาลรัฐอื่นๆ	28,273.78	26,668.34	43,283.99	11,121.54
โรงพยาบาลเอกชน	32,091.76	32,773.11	35,395.31	21,896.54
รวม	14,420.27	13,695.80	28,323.55	7,825.27

รวบรวม / วิเคราะห์ : สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สภส.)

จากตาราง 18 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งการนอนโรงพยาบาลคือ 14,420.27 บาท โดยสิทธิการรักษาพยาบาลสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการและครอบครัว ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ต่อครั้งการนอนโรงพยาบาลคือ 28,323.55 บาท และสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยคือ 13,695.80 บาท และจากการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ตามประเภทของโรงพยาบาล พบว่า โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อค่าการนอนโรงพยาบาล คือ 52,868.01 โรงพยาบาลรัฐอื่นๆ 28,273.78 บาท โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยคือ 20,826.96, 14,395.17, 5,625.30 บาท ตามลำดับ

หมายเหตุ พ.ศ. 2557 ได้รับข้อมูลผู้ป่วยในยังไม่ครบถ้วนในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขบางแห่ง

ตาราง 19 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค)
จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
พ.ศ.2557



ตาราง 19 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2557

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	หน่วยนับ : รายโรค											
			ภาคเหนือ		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.)		ภาคใต้		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพมหานคร		รวมทั้งประเทศ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
รวมทุกกลุ่มโรค		รวม	3,169,430	26,777.19	3,836,818	23,324.91	2,346,756	25,591.77	5,670,010	25,996.90	1,402,761	24,656.27	16,425,775	25,287.81
		ชาย	1,527,603	26,230.24	1,768,409	22,078.98	1,051,339	23,250.19	2,678,797	24,639.13	672,480	24,950.84	7,698,628	24,116.63
		หญิง	1,641,827	27,306.99	2,068,409	24,507.27	1,295,417	27,869.76	2,991,213	27,346.47	730,281	24,391.09	8,727,147	26,419.62
กลุ่มโรคติดเชื้อและปรสิตบางชนิด (A00 - B99)														
001	อหิวาตกโรค (A00) Cholera	รวม	17	0.14	35	0.21	22	0.24	39	0.18	9	0.16	122	0.19
		ชาย	7	0.12	17	0.21	14	0.31	15	0.14	5	0.19	58	0.18
		หญิง	10	0.17	18	0.21	8	0.17	24	0.22	4	0.13	64	0.19
002	ไข้รากสาดน้อยและไข้รากสาดเทียม (A01) Typhoid and paratyphoid fever	รวม	447	3.78	225	1.37	2,787	30.39	528	2.42	38	0.67	4,025	6.20
		ชาย	276	4.74	114	1.42	1,414	31.27	272	2.50	28	1.04	2,104	6.59
		หญิง	171	2.84	111	1.32	1,373	29.54	256	2.34	10	0.33	1,921	5.82
003	โรคบิดจากเชื้อซีเกลลา (A03) Shigellosis	รวม	38	0.32	51	0.31	29	0.32	27	0.12	16	0.28	161	0.25
		ชาย	22	0.38	28	0.35	11	0.24	16	0.15	8	0.30	85	0.27
		หญิง	16	0.27	23	0.27	18	0.39	11	0.10	8	0.27	76	0.23
004	โรคบิดมีตัว (A06) Amoebiasis	รวม	1,062	8.97	487	2.96	984	10.73	523	2.40	33	0.58	3,089	4.76
		ชาย	502	8.62	237	2.96	480	10.62	233	2.14	21	0.78	1,473	4.61
		หญิง	560	9.31	250	2.96	504	10.84	290	2.65	12	0.40	1,616	4.89
005	อาการท้องร่วงกระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ (A09) Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin	รวม	67,714	572.09	83,190	505.73	64,589	704.35	147,263	675.20	13,960	245.37	376,716	579.96
		ชาย	32,011	549.66	38,439	479.92	30,526	675.08	67,649	622.22	6,814	252.82	175,439	549.58
		หญิง	35,703	593.81	44,751	530.23	34,063	732.84	79,614	727.85	7,146	238.67	201,277	609.32
006	โรคลำไส้อักเสบอื่น ๆ (A02, A04-A05,A07-A08) Other intestinal infectious diseases	รวม	12,270	103.66	11,907	72.39	6,743	73.53	22,601	103.63	3,370	59.23	56,891	87.58
		ชาย	6,074	104.30	5,894	73.59	3,442	76.12	10,403	95.69	1,796	66.64	27,609	86.49
		หญิง	6,196	103.05	6,013	71.24	3,301	71.02	12,198	111.52	1,574	52.57	29,282	88.65
007	วัณโรคทางเดินหายใจ (A15-A16) Respiratory tuberculosis	รวม	10,754	90.86	15,303	93.03	6,667	72.70	24,949	114.39	4,169	73.28	61,842	95.21
		ชาย	7,843	134.67	10,712	133.74	4,770	105.49	16,826	154.76	2,931	108.75	43,082	134.96
		หญิง	2,911	48.42	4,591	54.40	1,897	40.81	8,123	74.26	1,238	41.35	18,760	56.79
008	วัณโรคอื่น ๆ (A17-A19) Other Tuberculosis	รวม	2,905	24.54	3,566	21.68	1,574	17.16	6,590	30.22	1,477	25.96	16,112	24.80
		ชาย	1,772	30.43	2,210	27.59	988	21.85	3,894	35.82	889	32.98	9,753	30.55
		หญิง	1,133	18.84	1,356	16.07	586	12.61	2,696	24.65	588	19.64	6,359	19.25

ตาราง 19 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2557 (ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ภาคเหนือ		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.)		ภาคใต้		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพมหานคร		รวมทั้งประเทศ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
009	กาฬโรค (A20) Plaque	รวม	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
010	โรคติดเชื้อบรูเซลลา (A23) Brucellosis	รวม	3	0.03	4	0.02	0	0.00	4	0.02	2	0.04	13	0.02
		ชาย	2	0.03	1	0.01	0	0.00	3	0.03	0	0.00	6	0.02
		หญิง	1	0.02	3	0.04	0	0.00	1	0.01	2	0.07	7	0.02
011	โรคเรื้อน (A30) Leprosy	รวม	76	0.64	94	0.57	43	0.47	198	0.91	13	0.23	424	0.65
		ชาย	48	0.82	63	0.79	26	0.57	137	1.26	9	0.33	283	0.89
		หญิง	28	0.47	31	0.37	17	0.37	61	0.56	4	0.13	141	0.43
012	บาดทะยักในเด็กแรกเกิด (A33) Tetanus neonatorum	รวม	0	0.00	1	0.01	0	0.00	3	0.01	0	0.00	4	0.01
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.02	0	0.00	2	0.01
		หญิง	0	0.00	1	0.01	0	0.00	1	0.01	0	0.00	2	0.01
013	บาดทะยักอื่น ๆ (A34-A35) Other tetanus	รวม	61	0.52	42	0.26	19	0.21	88	0.40	11	0.19	221	0.34
		ชาย	38	0.65	29	0.36	13	0.29	64	0.59	7	0.26	151	0.47
		หญิง	23	0.38	13	0.15	6	0.13	24	0.22	4	0.13	70	0.21
014	โรคคอตีบ (A36) Diphtheria	รวม	17	0.14	11	0.07	32	0.35	14	0.06	3	0.05	77	0.12
		ชาย	8	0.14	8	0.10	17	0.38	7	0.06	1	0.04	41	0.13
		หญิง	9	0.15	3	0.04	15	0.32	7	0.06	2	0.07	36	0.11
015	โรคไอกรน (A37) Whooping cough	รวม	7	0.06	17	0.10	8	0.09	6	0.03	11	0.19	49	0.08
		ชาย	0	0.00	4	0.05	2	0.04	1	0.01	5	0.19	12	0.04
		หญิง	7	0.12	13	0.15	6	0.13	5	0.05	6	0.20	37	0.11
016	การติดเชื้อเมนิงโกคอคคัส (A39) Meningococcal infection	รวม	17	0.14	19	0.12	15	0.16	37	0.17	7	0.12	95	0.15
		ชาย	8	0.14	8	0.10	11	0.24	20	0.18	3	0.11	50	0.16
		หญิง	9	0.15	11	0.13	4	0.09	17	0.16	4	0.13	45	0.14
017	โลหิตเป็นพิษ (A40-A41) Septicemia	รวม	24,784	209.39	28,169	171.25	14,160	154.42	41,245	189.11	9,846	173.06	118,204	181.98
		ชาย	12,881	221.18	13,387	167.14	7,206	159.36	21,619	198.85	4,865	180.50	59,958	187.82
		หญิง	11,903	197.97	14,782	175.14	6,954	149.61	19,626	179.43	4,981	166.36	58,246	176.33
018	โรคจากแบคทีเรียอื่น ๆ (A21-A22, A24-A28, A31-A32, A38, A42-A49) Other bacterial diseases	รวม	6,419	54.23	6,467	39.31	9,215	100.49	28,310	129.80	945	16.61	51,356	79.06
		ชาย	3,668	62.98	3,538	44.17	5,203	115.06	16,654	153.18	509	18.89	29,572	92.64
		หญิง	2,751	45.75	2,929	34.70	4,012	86.31	11,656	106.56	436	14.56	21,784	65.95

ตาราง 19 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2557 (ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ภาคเหนือ		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.)		ภาคใต้		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพมหานคร		หน่วยนับ : รายโรค รวมทั้งประเทศ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
019	ซิฟิลิสแต่กำเนิด (A50) Congenital syphilis	รวม	52	0.44	116	0.71	35	0.38	81	0.37	52	0.91	336	0.52
		ชาย	28	0.48	56	0.70	17	0.38	45	0.41	29	1.08	175	0.55
		หญิง	24	0.40	60	0.71	18	0.39	36	0.33	23	0.77	161	0.49
020	ซิฟิลิสระยะเริ่ม (A51) Early syphilis	รวม	29	0.25	37	0.22	16	0.17	80	0.37	27	0.47	189	0.29
		ชาย	22	0.38	22	0.27	9	0.20	43	0.40	20	0.74	116	0.36
		หญิง	7	0.12	15	0.18	7	0.15	37	0.34	7	0.23	73	0.22
021	ซิฟิลิสอื่น ๆ (A52-A53) Other syphilis	รวม	257	2.17	259	1.57	330	3.60	813	3.73	215	3.78	1,874	2.89
		ชาย	152	2.61	151	1.89	191	4.22	469	4.31	107	3.97	1,070	3.35
		หญิง	105	1.75	108	1.28	139	2.99	344	3.14	108	3.61	804	2.43
022	การติดเชื้อหนองใน (A54) Gonococcal infection	รวม	37	0.31	55	0.33	27	0.29	103	0.47	21	0.37	243	0.37
		ชาย	20	0.34	28	0.35	14	0.31	71	0.65	8	0.30	141	0.44
		หญิง	17	0.28	27	0.32	13	0.28	32	0.29	13	0.43	102	0.31
023	โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จากเชื้อคลามัยเดีย (A55-A56) Sexually transmitted chlamydial diseases	รวม	11	0.09	7	0.04	8	0.09	14	0.06	2	0.04	42	0.06
		ชาย	6	0.10	4	0.05	3	0.07	9	0.08	1	0.04	23	0.07
		หญิง	5	0.08	3	0.04	5	0.11	5	0.05	1	0.03	19	0.06
024	โรคติดเชื้ออื่นๆ ที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นส่วนใหญ่ (A57-A64) Other infections with a predominantly sexual mode of transmission	รวม	412	3.48	665	4.04	191	2.08	803	3.68	320	5.62	2,391	3.68
		ชาย	141	2.42	149	1.86	43	0.95	201	1.85	96	3.56	630	1.97
		หญิง	271	4.51	516	6.11	148	3.18	602	5.50	224	7.48	1,761	5.33
025	โรคไขกลับซ้ำ (A68) Relapsing fever	รวม	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	1	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.01	0	0.00	1	0.00
026	ริดสีดวงตา (A71) Trachoma	รวม	1	0.01	1	0.01	0	0.00	1	0.00	1	0.02	4	0.01
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	1	0.02	1	0.01	0	0.00	1	0.01	1	0.03	4	0.01
027	ไข้รากสาดใหญ่ (A75) Typhus fever	รวม	4,278	36.14	793	4.82	3,682	40.15	6,299	28.88	119	2.09	15,171	23.36
		ชาย	2,415	41.47	455	5.68	2,006	44.36	3,560	32.74	76	2.82	8,512	26.66
		หญิง	1,863	30.99	338	4.00	1,676	36.06	2,739	25.04	43	1.44	6,659	20.16
028	โรคโปลิโอเฉียบพลัน (A80) Acute poliomyelitis	รวม	43	0.36	51	0.31	28	0.31	50	0.23	17	0.30	189	0.29
		ชาย	28	0.48	31	0.39	19	0.42	24	0.22	9	0.33	111	0.35
		หญิง	15	0.25	20	0.24	9	0.19	26	0.24	8	0.27	78	0.24

ตาราง 19 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรค ระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2557 (ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ภาคเหนือ		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.)		ภาคใต้		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพมหานคร		หน่วยนับ : รายโรค รวมทั้งประเทศ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
029	โรคพิษสุนัขบ้า (A82) Rabies	รวม	0	0.00	3	0.02	1	0.01	1	0.00	1	0.02	6	0.01
		ชาย	0	0.00	2	0.02	0	0.00	1	0.01	1	0.04	4	0.01
		หญิง	0	0.00	1	0.01	1	0.02	0	0.00	0	0.00	2	0.01
030	สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส (A83-A86) Viral encephalitis	รวม	126	1.06	139	0.85	96	1.05	247	1.13	62	1.09	670	1.03
		ชาย	64	1.10	61	0.76	52	1.15	146	1.34	24	0.89	347	1.09
		หญิง	62	1.03	78	0.92	44	0.95	101	0.92	38	1.27	323	0.98
031	ไข้เหลือง (A95) Yellow fever	รวม	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
032	*ไข้จากไวรัสที่นำโดยแมลงและไขเลือดออกที่เกิด จากไวรัสอื่น ๆ (A90-A94, A96-A99) Other arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers	รวม	5,827	49.23	13,391	81.41	27,644	301.46	13,281	60.89	2,292	40.29	62,435	96.12
		ชาย	2,977	51.12	6,841	85.41	13,492	298.37	6,793	62.48	1,206	44.75	31,309	98.08
		หญิง	2,850	47.40	6,550	77.61	14,152	304.47	6,488	59.32	1,086	36.27	31,126	94.23
033	เริม (B00) Herpesviral infection	รวม	1,106	9.34	1,128	6.86	418	4.56	1,604	7.35	559	9.83	4,815	7.41
		ชาย	495	8.50	494	6.17	167	3.69	759	6.98	240	8.90	2,155	6.75
		หญิง	611	10.16	634	7.51	251	5.40	845	7.73	319	10.65	2,660	8.05
034	อีสุกอีใสและงูสวัด (B01-B02) Varicella and zoster	รวม	1,995	16.85	2,628	15.98	1,709	18.64	3,796	17.40	774	13.60	10,902	16.78
		ชาย	961	16.50	1,333	16.64	847	18.73	1,863	17.14	353	13.10	5,357	16.78
		หญิง	1,034	17.20	1,295	15.34	862	18.55	1,933	17.67	421	14.06	5,545	16.79
035	หัด (B05) Measles	รวม	33	0.28	65	0.40	242	2.64	71	0.33	16	0.28	427	0.66
		ชาย	18	0.31	34	0.42	135	2.99	34	0.31	6	0.22	227	0.71
		หญิง	15	0.25	31	0.37	107	2.30	37	0.34	10	0.33	200	0.61
036	หัดเยอรมัน (B06) Rubella	รวม	10	0.08	14	0.09	10	0.11	11	0.05	5	0.09	50	0.08
		ชาย	6	0.10	8	0.10	7	0.15	3	0.03	3	0.11	27	0.08
		หญิง	4	0.07	6	0.07	3	0.06	8	0.07	2	0.07	23	0.07
037	ตับอักเสบเฉียบพลันชนิดบี (B16) Acute hepatitis B	รวม	1,073	9.07	1,082	6.58	530	5.78	1,944	8.91	257	4.52	4,886	7.52
		ชาย	684	11.74	693	8.65	319	7.05	1,326	12.20	161	5.97	3,183	9.97
		หญิง	389	6.47	389	4.61	211	4.54	618	5.65	96	3.21	1,703	5.16
038	ตับอักเสบจากไวรัสอื่น ๆ (B15, B17-B19) Other viral hepatitis	รวม	7,057	59.62	6,917	42.05	3,612	39.39	12,160	55.75	5,820	102.30	35,566	54.75
		ชาย	4,721	81.06	4,479	55.92	2,439	53.94	8,515	78.32	4,044	150.04	24,198	75.80
		หญิง	2,336	38.85	2,438	28.89	1,173	25.24	3,645	33.32	1,776	59.32	11,368	34.41

ตาราง 19 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรค ระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2557 (ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ภาคเหนือ		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.)		ภาคใต้		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพมหานคร		หน่วยนับ : รายโรค รวมทั้งประเทศ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
039	ภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากไวรัส (HIV) (B20-B24) Human immunodeficiency virus [HIV] disease	รวม	13,070	110.42	18,820	114.41	8,645	94.28	19,724	90.43	4,773	83.89	65,032	100.12
		ชาย	7,443	127.80	10,465	130.66	4,993	110.42	11,473	105.53	2,909	107.93	37,283	116.79
		หญิง	5,627	93.59	8,355	98.99	3,652	78.57	8,251	75.43	1,864	62.26	27,749	84.00
040	คางทูม (B26) Mumps	รวม	26	0.22	30	0.18	55	0.60	45	0.21	5	0.09	161	0.25
		ชาย	12	0.21	16	0.20	34	0.75	27	0.25	4	0.15	93	0.29
		หญิง	14	0.23	14	0.17	21	0.45	18	0.16	1	0.03	68	0.21
041	โรคจากไวรัสอื่น (A81, A87-A89, B03-B04, B07-B09, B25, B27-B34) Other viral diseases	รวม	8,166	68.99	12,535	76.20	9,303	101.45	14,062	64.47	2,825	49.65	46,891	72.19
		ชาย	4,411	75.74	6,814	85.07	4,774	105.58	7,492	68.91	1,512	56.10	25,003	78.32
		หญิง	3,755	62.45	5,721	67.78	4,529	97.44	6,570	60.06	1,313	43.85	21,888	66.26
042	โรคติดเชื้อรา (B35-B49) Mycoses	รวม	5,374	45.40	6,271	38.12	3,276	35.73	7,999	36.68	2,840	49.92	25,760	39.66
		ชาย	2,998	51.48	3,343	41.74	1,678	37.11	4,568	42.02	1,510	56.03	14,097	44.16
		หญิง	2,376	39.52	2,928	34.69	1,598	34.38	3,431	31.37	1,330	44.42	11,663	35.31
043	มาลาเรีย (B50-B54) Malaria	รวม	768	6.49	705	4.29	2,194	23.93	2,656	12.18	43	0.76	6,366	9.80
		ชาย	470	8.07	494	6.17	1,231	27.22	2,386	21.95	33	1.22	4,614	14.45
		หญิง	298	4.96	211	2.50	963	20.72	270	2.47	10	0.33	1,752	5.30
044	โรคไลชมาเนีย (B55) Leishmaniasis	รวม	6	0.05	1	0.01	12	0.13	1	0.00	0	0.00	20	0.03
		ชาย	5	0.09	0	0.00	10	0.22	1	0.01	0	0.00	16	0.05
		หญิง	1	0.02	1	0.01	2	0.04	0	0.00	0	0.00	4	0.01
045	โรคทริปาโนโซม (B56-B57) Trypanosomiasis	รวม	7	0.06	6	0.04	5	0.05	8	0.04	2	0.04	28	0.04
		ชาย	4	0.07	3	0.04	4	0.09	3	0.03	0	0.00	14	0.04
		หญิง	3	0.05	3	0.04	1	0.02	5	0.05	2	0.07	14	0.04
046	โรคติดเชื้อซิสโตโซม (B65) Schistosomiasis	รวม	3	0.03	5	0.03	4	0.04	14	0.06	2	0.04	28	0.04
		ชาย	3	0.05	3	0.04	4	0.09	4	0.04	2	0.07	16	0.05
		หญิง	0	0.00	2	0.02	0	0.00	10	0.09	0	0.00	12	0.04
047	โรคพยาธิใบไม้อื่น ๆ (B66) Other fluke infections	รวม	178	1.50	17	0.10	2	0.02	486	2.23	7	0.12	690	1.06
		ชาย	94	1.61	10	0.12	2	0.04	267	2.46	5	0.19	378	1.18
		หญิง	84	1.40	7	0.08	0	0.00	219	2.00	2	0.07	312	0.94
048	โรคพยาธิเอคคิโนคอกคัส (B67) Echinococcosis	รวม	4	0.03	2	0.01	2	0.02	9	0.04	2	0.04	19	0.03
		ชาย	2	0.03	0	0.00	1	0.02	4	0.04	1	0.04	8	0.03
		หญิง	2	0.03	2	0.02	1	0.02	5	0.05	1	0.03	11	0.03

ตาราง 19 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรค ระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2557 (ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ภาคเหนือ		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.)		ภาคใต้		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพมหานคร		หน่วยนับ : รายโรค รวมทั้งประเทศ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
049	โรคพยาธิราคันคูลัส (B72) Dracunculiasis	รวม	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
050	โรคพยาธิออนโคเชอร์คา (B73) Onchocerciasis	รวม	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
051	โรคพยาธิฟิลาเรีย (B74) Filariasis	รวม	5	0.04	2	0.01	10	0.11	4	0.02	0	0.00	21	0.03
		ชาย	3	0.05	2	0.02	3	0.07	0	0.00	0	0.00	8	0.03
		หญิง	2	0.03	0	0.00	7	0.15	4	0.04	0	0.00	13	0.04
052	โรคพยาธิปากขอ (B76) Hookworm diseases	รวม	55	0.46	63	0.38	220	2.40	152	0.70	4	0.07	494	0.76
		ชาย	29	0.50	32	0.40	129	2.85	79	0.73	3	0.11	272	0.85
		หญิง	26	0.43	31	0.37	91	1.96	73	0.67	1	0.03	222	0.67
053	โรคพยาธิตัวตืดอื่น ๆ (B68-B71, B75, B77-B83) Other helminthiasis	รวม	2,230	18.84	597	3.63	821	8.95	4,190	19.21	210	3.69	8,048	12.39
		ชาย	1,408	24.18	403	5.03	416	9.20	2,694	24.78	133	4.93	5,054	15.83
		หญิง	822	13.67	194	2.30	405	8.71	1,496	13.68	77	2.57	2,994	9.06
054	ผลตามหลังวัณโรค (B90) Sequelae of tuberculosis	รวม	3,018	25.50	4,671	28.40	3,175	34.62	10,526	48.26	1,527	26.84	22,917	35.28
		ชาย	2,138	36.71	3,164	39.50	2,190	48.43	6,568	60.41	1,078	40.00	15,138	47.42
		หญิง	880	14.64	1,507	17.86	985	21.19	3,958	36.19	449	15.00	7,779	23.55
055	ผลตามหลังโรคโปลิโอ (B91) Sequelae of poliomyelitis	รวม	8	0.07	19	0.12	4	0.04	11	0.05	22	0.39	64	0.10
		ชาย	2	0.03	14	0.17	1	0.02	8	0.07	13	0.48	38	0.12
		หญิง	6	0.10	5	0.06	3	0.06	3	0.03	9	0.30	26	0.08
056	ผลตามหลังโรคเรื้อน (B92) Sequelae of leprosy	รวม	2	0.02	6	0.04	4	0.04	21	0.10	1	0.02	34	0.05
		ชาย	1	0.02	5	0.06	1	0.02	11	0.10	0	0.00	18	0.06
		หญิง	1	0.02	1	0.01	3	0.06	10	0.09	1	0.03	16	0.05
057	โรคติดเชื้อและปรสิตอื่น ๆ (A65-A67, A69-A70, A74, A77-A79, B58-B64, B85-B89, B94, B99) Other infectious and parasitic diseases	รวม	1,871	15.81	2,124	12.91	3,129	34.12	3,377	15.48	682	11.99	11,183	17.22
		ชาย	1,073	18.42	1,163	14.52	1,752	38.75	1,939	17.83	336	12.47	6,263	19.62
		หญิง	798	13.27	961	11.39	1,377	29.62	1,438	13.15	346	11.56	4,920	14.89
โรคเนื้องอกร้ายและเนื้องอกไม่ร้าย (C00-D48)														
058	เนื้องอกร้ายของริมฝีปาก ช่องปากและคอหอย (C00-C14) Malignant neoplasm of lip, oral cavity and pharynx	รวม	2,836	23.96	4,734	28.78	2,256	24.60	5,079	23.29	3,681	64.70	18,586	28.61
		ชาย	1,960	33.65	3,625	45.26	1,693	37.44	3,198	29.41	2,849	105.71	13,325	41.74
		หญิง	876	14.57	1,109	13.14	563	12.11	1,881	17.20	832	27.79	5,261	15.93

ตาราง 19 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2557 (ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ภาคเหนือ		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.)		ภาคใต้		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพมหานคร		หน่วยนับ : รายโรค รวมทั้งประเทศ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
059	เนื้องอกร้ายที่หลอดอาหาร (C15) Malignant neoplasm of oesophagus	รวม	1,035	8.74	2,477	15.06	1,229	13.40	1,132	5.19	1,171	20.58	7,044	10.84
		ชาย	856	14.70	2,105	26.28	996	22.03	963	8.86	1,013	37.59	5,933	18.59
		หญิง	179	2.98	372	4.41	233	5.01	169	1.55	158	5.28	1,111	3.36
060	เนื้องอกร้ายที่กระเพาะอาหาร (C16) Malignant neoplasm of stomach	รวม	2,278	19.25	1,609	9.78	485	5.29	2,347	10.76	1,086	19.09	7,805	12.02
		ชาย	1,264	21.70	897	11.20	321	7.10	1,401	12.89	564	20.93	4,447	13.93
		หญิง	1,014	16.86	712	8.44	164	3.53	946	8.65	522	17.43	3,358	10.17
061	เนื้องอกร้ายของลำไส้ใหญ่ (C18) Malignant neoplasm of colon	รวม	7,698	65.04	9,175	55.78	4,146	45.21	11,496	52.71	6,601	116.03	39,116	60.22
		ชาย	3,889	66.78	4,937	61.64	2,152	47.59	5,550	51.05	3,517	130.49	20,045	62.79
		หญิง	3,809	63.35	4,238	50.21	1,994	42.90	5,946	54.36	3,084	103.00	19,071	57.73
062	เนื้องอกร้ายที่รอยต่อลำไส้ใหญ่เร็กตัม และซิกมอยด์ เร็กตัม ทวารหนักและช่องทวารหนัก (C19-C21) Malignant neoplasm of recto sigmoid junction, rectum, anus and anal canal	รวม	5,629	47.56	4,730	28.75	2,155	23.50	7,973	36.56	5,396	94.85	25,883	39.85
		ชาย	3,409	58.54	2,652	33.11	1,180	26.10	4,378	40.27	3,120	115.76	14,739	46.17
		หญิง	2,220	36.92	2,078	24.62	975	20.98	3,595	32.87	2,276	76.02	11,144	33.74
063	เนื้องอกร้ายที่ตับและท่อน้ำดีในตับ (C22) Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts	รวม	9,698	81.93	6,497	39.50	2,503	27.30	18,542	85.01	5,865	103.09	43,105	66.36
		ชาย	6,714	115.29	4,559	56.92	1,745	38.59	12,122	111.50	4,131	153.27	29,271	91.69
		หญิง	2,984	49.63	1,938	22.96	758	16.31	6,420	58.69	1,734	57.91	13,834	41.88
064	เนื้องอกร้ายที่ตับอ่อน (C25) Malignant neoplasm of pancreas	รวม	932	7.87	1,058	6.43	482	5.26	921	4.22	882	15.50	4,275	6.58
		ชาย	446	7.66	533	6.65	264	5.84	478	4.40	433	16.07	2,154	6.75
		หญิง	486	8.08	525	6.22	218	4.69	443	4.05	449	15.00	2,121	6.42
065	เนื้องอกร้ายที่อวัยวะย่อยอาหารอื่น ๆ (C17, C23- C24, C26) Other malignant neoplasms of digestive organs	รวม	1,132	9.56	825	5.02	467	5.09	2,130	9.77	706	12.41	5,260	8.10
		ชาย	484	8.31	372	4.64	220	4.87	1,188	10.93	319	11.84	2,583	8.09
		หญิง	648	10.78	453	5.37	247	5.31	942	8.61	387	12.93	2,677	8.10
066	เนื้องอกร้ายที่กล่องเสียง (C32) Malignant neoplasm of larynx	รวม	638	5.39	1,132	6.88	506	5.52	825	3.78	779	13.69	3,880	5.97
		ชาย	575	9.87	1,050	13.11	455	10.06	775	7.13	729	27.05	3,584	11.23
		หญิง	63	1.05	82	0.97	51	1.10	50	0.46	50	1.67	296	0.90
067	เนื้องอกร้ายที่หลอดคอ หลอดลม และปอด (C33-C34) Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung	รวม	9,892	83.57	7,343	44.64	3,593	39.18	9,292	42.60	4,202	73.86	34,322	52.84
		ชาย	6,020	103.37	4,723	58.97	2,438	53.92	5,885	54.13	2,551	94.65	21,617	67.72
		หญิง	3,872	64.40	2,620	31.04	1,155	24.85	3,407	31.15	1,651	55.14	12,705	38.46

ตาราง 19 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2557 (ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ภาคเหนือ		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.)		ภาคใต้		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพมหานคร		หน่วยนับ : รายโรค รวมทั้งประเทศ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
068	เนื้องอกร้ายที่อวัยวะหายใจและอวัยวะของอก (C30-C31, C37-C39) Other malignant neoplasm of respiratory and intrathoracic organs	รวม	302	2.55	341	2.07	204	2.22	578	2.65	533	9.37	1,958	3.01
		ชาย	213	3.66	205	2.56	121	2.68	399	3.67	371	13.77	1,309	4.10
		หญิง	89	1.48	136	1.61	83	1.79	179	1.64	162	5.41	649	1.96
069	เนื้องอกร้ายที่กระดูกและกระดูกอ่อนผิวหนัง (C40-C41) Malignant neoplasm of bone and articular cartilage	รวม	381	3.22	363	2.21	297	3.24	1,022	4.69	1,050	18.46	3,113	4.79
		ชาย	207	3.55	204	2.55	159	3.52	535	4.92	655	24.30	1,760	5.51
		หญิง	174	2.89	159	1.88	138	2.97	487	4.45	395	13.19	1,353	4.10
070	เนื้องอกร้ายที่เมลาโนมาของผิวหนัง (C43) Malignant melanoma of skin	รวม	127	1.07	116	0.71	67	0.73	179	0.82	137	2.41	626	0.96
		ชาย	67	1.15	66	0.82	39	0.86	86	0.79	74	2.75	332	1.04
		หญิง	60	1.00	50	0.59	28	0.60	93	0.85	63	2.10	294	0.89
071	เนื้องอกร้ายที่ผิวหนังอื่น ๆ (C44) Other malignant neoplasm of skin	รวม	395	3.34	418	2.54	169	1.84	612	2.81	363	6.38	1,957	3.01
		ชาย	206	3.54	216	2.70	101	2.23	292	2.69	188	6.98	1,003	3.14
		หญิง	189	3.14	202	2.39	68	1.46	320	2.93	175	5.84	954	2.89
072	เนื้องอกร้ายที่เมโสทีเรียลและเนื้อเยื่ออ่อน (C45-C49) Malignant neoplasm of mesothelial and soft tissue	รวม	661	5.58	539	3.28	397	4.33	1,099	5.04	1,206	21.20	3,902	6.01
		ชาย	243	4.17	234	2.92	169	3.74	557	5.12	458	16.99	1,661	5.20
		หญิง	418	6.95	305	3.61	228	4.91	542	4.96	748	24.98	2,241	6.78
073	เนื้องอกร้ายที่เต้านม (C50) Malignant neoplasm of breast	รวม	8,608	72.73	8,315	50.55	3,412	37.21	9,979	45.75	5,156	90.63	35,470	54.61
		ชาย	75	1.29	59	0.74	26	0.57	101	0.93	24	0.89	285	0.89
		หญิง	8,533	141.92	8,256	97.82	3,386	72.85	9,878	90.31	5,132	171.41	35,185	106.52
074	เนื้องอกร้ายที่ปากมดลูก (C53) Malignant neoplasm of cervix uteri	รวม	4,168	69.32	4,759	56.39	1,917	41.24	5,299	48.44	3,715	124.08	19,858	60.12
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	4,168	69.32	4,759	56.39	1,917	41.24	5,299	48.44	3,715	124.08	19,858	60.12
075	เนื้องอกร้ายอื่นๆ ที่มีโครงสร้างของมดลูก (C54-C55) Malignant neoplasm of other and unspecified parts of uterus	รวม	1,174	19.53	1,189	14.09	622	13.38	1,632	14.92	2,001	66.83	6,618	20.03
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	1,174	19.53	1,189	14.09	622	13.38	1,632	14.92	2,001	66.83	6,618	20.03
076	เนื้องอกร้ายของอวัยวะสืบพันธุ์หญิง (C51-C52, C56-C58) Other malignant neoplasm of female genital organs	รวม	2,354	39.15	2,381	28.21	1,103	23.73	4,800	43.88	4,260	142.28	14,898	45.10
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	2,354	39.15	2,381	28.21	1,103	23.73	4,800	43.88	4,260	142.28	14,898	45.10
077	เนื้องอกร้ายที่ต่อมลูกหมาก (C61) Malignant neoplasm of prostate	รวม	1,587	27.25	1,741	21.74	946	20.92	1,664	15.31	1,600	59.36	7,538	23.61
		ชาย	1,587	27.25	1,741	21.74	946	20.92	1,664	15.31	1,600	59.36	7,538	23.61
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

ตาราง 19 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2557 (ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ภาคเหนือ		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.)		ภาคใต้		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพมหานคร		หน่วยนับ : รายโรค	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
078	เนื้องอกร้ายของอวัยวะสืบพันธุ์ชาย (C60, C62-C63)	รวม	403	6.92	288	3.60	210	4.64	665	6.12	193	7.16	1,759	5.51
	Other malignant neoplasms of male	ชาย	403	6.92	288	3.60	210	4.64	665	6.12	193	7.16	1,759	5.51
	genital organs	หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
079	เนื้องอกร้ายที่กระเพาะปัสสาวะ (C67)	รวม	1,810	15.29	1,688	10.26	1,326	14.46	2,227	10.21	1,587	27.89	8,638	13.30
	Malignant neoplasm of bladder	ชาย	1,355	23.27	1,335	16.67	1,138	25.17	1,761	16.20	1,174	43.56	6,763	21.19
		หญิง	455	7.57	353	4.18	188	4.04	466	4.26	413	13.79	1,875	5.68
080	เนื้องอกร้ายอื่นๆ ที่ท่อปัสสาวะ (C64-C66, C68)	รวม	633	5.35	459	2.79	294	3.21	740	3.39	648	11.39	2,774	4.27
	Other malignant neoplasm of urinary tract	ชาย	434	7.45	264	3.30	190	4.20	487	4.48	391	14.51	1,766	5.53
		หญิง	199	3.31	195	2.31	104	2.24	253	2.31	257	8.58	1,008	3.05
081	เนื้องอกร้ายของตาและส่วนประกอบ (C69)	รวม	65	0.55	31	0.19	94	1.03	110	0.50	329	5.78	629	0.97
	Malignant neoplasm of eye and adnexa	ชาย	43	0.74	24	0.30	49	1.08	54	0.50	147	5.45	317	0.99
		หญิง	22	0.37	7	0.08	45	0.97	56	0.51	182	6.08	312	0.94
082	เนื้องอกร้ายของสมอง (C71)	รวม	646	5.46	668	4.06	535	5.83	1,062	4.87	872	15.33	3,783	5.82
	Malignant neoplasm of brain	ชาย	338	5.80	358	4.47	290	6.41	506	4.65	455	16.88	1,947	6.10
		หญิง	308	5.12	310	3.67	245	5.27	556	5.08	417	13.93	1,836	5.56
083	เนื้องอกร้ายที่ส่วนอื่น ๆ ของระบบประสาทส่วนกลาง (C70,C72)	รวม	63	0.53	88	0.53	58	0.63	117	0.54	79	1.39	405	0.62
	Malignant neoplasm of other parts of central nervous system	ชาย	23	0.39	46	0.57	27	0.60	63	0.58	32	1.19	191	0.60
		หญิง	40	0.67	42	0.50	31	0.67	54	0.49	47	1.57	214	0.65
084	เนื้องอกอื่น ๆ และที่ไม่ทราบสาเหตุ เนื้องอกทุติยภูมิ ที่มีได้ระบุรายละเอียดและเกิดขึ้นหลายแห่ง (C73-C80, C97)	รวม	25,241	213.25	23,118	140.54	10,112	110.27	35,002	160.48	28,591	502.54	122,064	187.92
	Malignant neoplasm of other, ill-defined, secondary, unspecified and multiple sites	ชาย	11,850	203.47	11,025	137.65	5,091	112.59	17,044	156.77	12,591	467.16	57,601	180.44
		หญิง	13,391	222.72	12,093	143.28	5,021	108.02	17,958	164.18	16,000	534.39	64,463	195.15
085	โรคฮอดกินส์ (C81)	รวม	190	1.61	294	1.79	160	1.74	464	2.13	310	5.45	1,418	2.18
	Hodgkin's disease	ชาย	135	2.32	203	2.53	89	1.97	307	2.82	176	6.53	910	2.85
		หญิง	55	0.91	91	1.08	71	1.53	157	1.44	134	4.48	508	1.54
086	เนื้องอกร้ายลิมโฟมาที่ไม่ใช่โรคฮอดกินส์ (C82-C85)	รวม	2,915	24.63	2,806	17.06	1,813	19.77	4,938	22.64	2,578	45.31	15,050	23.17
	Non-Hodgkin's lymphoma	ชาย	1,689	29.00	1,550	19.35	1,015	22.45	2,919	26.85	1,302	48.31	8,475	26.55
		หญิง	1,226	20.39	1,256	14.88	798	17.17	2,019	18.46	1,276	42.62	6,575	19.90

ตาราง 19 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรค ระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2557 (ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ภาคเหนือ		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.)		ภาคใต้		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพมหานคร		หน่วยนับ : รายโรค รวมทั้งประเทศ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
087	ลิวคีเมีย (C91-C95) Leukaemia	รวม	3,030	25.60	3,649	22.18	2,509	27.36	6,584	30.19	2,673	46.98	18,445	28.40
		ชาย	1,720	29.53	2,164	27.02	1,419	31.38	3,681	33.86	1,595	59.18	10,579	33.14
		หญิง	1,310	21.79	1,485	17.59	1,090	23.45	2,903	26.54	1,078	36.00	7,866	23.81
088	เนื้องอกร้ายอื่นๆ ของลิมโฟยด์อื่นๆ ระบบสร้างเม็ด เลือดและเนื้อเยื่อ (C88-C90, C96) Other malignant neoplasm of lymphoid, haematopoietic and related tissue	รวม	692	5.85	966	5.87	522	5.69	1,595	7.31	876	15.40	4,651	7.16
		ชาย	359	6.16	429	5.36	296	6.55	742	6.82	466	17.29	2,292	7.18
		หญิง	333	5.54	537	6.36	226	4.86	853	7.80	410	13.69	2,359	7.14
089	มะเร็งจำกัดเฉพาะที่ของปากมดลูก (D06) Carcinoma in situ of cervix uteri	รวม	240	3.99	417	4.94	153	3.29	467	4.27	151	5.04	1,428	4.32
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	240	3.99	417	4.94	153	3.29	467	4.27	151	5.04	1,428	4.32
090	เนื้องอกไม่ร้ายของผิวหนัง (D22-D23) Benign neoplasm of skin	รวม	123	1.04	148	0.90	85	0.93	252	1.16	182	3.20	790	1.22
		ชาย	58	1.00	57	0.71	40	0.88	90	0.83	69	2.56	314	0.98
		หญิง	65	1.08	91	1.08	45	0.97	162	1.48	113	3.77	476	1.44
091	เนื้องอกไม่ร้ายของเต้านม (D24) Benign neoplasm of breast	รวม	231	1.95	222	1.35	186	2.03	368	1.69	208	3.66	1,215	1.87
		ชาย	0	0.00	4	0.05	0	0.00	3	0.03	1	0.04	8	0.03
		หญิง	231	3.84	218	2.58	186	4.00	365	3.34	207	6.91	1,207	3.65
092	ไลโอไมโอมาที่มดลูก Leiomyoma of uterus (D25)	รวม	3,282	54.59	3,851	45.63	2,427	52.21	8,730	79.81	3,371	112.59	21,661	65.57
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	3,282	54.59	3,851	45.63	2,427	52.21	8,730	79.81	3,371	112.59	21,661	65.57
093	เนื้องอกไม่ร้ายที่รังไข่ Benign neoplasm of ovary (D27)	รวม	423	7.04	287	3.40	365	7.85	759	6.94	493	16.47	2,327	7.04
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	423	7.04	287	3.40	365	7.85	759	6.94	493	16.47	2,327	7.04
094	เนื้องอกไม่ร้ายที่ระบบปัสสาวะ (D30) Benign neoplasm of urinary organs	รวม	21	0.18	28	0.17	17	0.19	54	0.25	18	0.32	138	0.21
		ชาย	14	0.24	14	0.17	10	0.22	31	0.29	9	0.33	78	0.24
		หญิง	7	0.12	14	0.17	7	0.15	23	0.21	9	0.30	60	0.18
095	เนื้องอกไม่ร้ายของสมองและส่วนอื่นของระบบ ประสาทส่วนกลาง (D33) Benign neoplasm of brain and other parts of central nervous system	รวม	285	2.41	263	1.60	147	1.60	302	1.38	294	5.17	1,291	1.99
		ชาย	122	2.09	121	1.51	52	1.15	144	1.32	134	4.97	573	1.79
		หญิง	163	2.71	142	1.68	95	2.04	158	1.44	160	5.34	718	2.17

ตาราง 19 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรค ระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2557 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค														
รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ภาคเหนือ		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.)		ภาคใต้		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพมหานคร		รวมทั้งประเทศ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
096	เนื้องอกไม่ร้ายจำกัดเฉพาะที่อื่น ๆและเนื้องอกบางชนิดที่ไม่ทราบพฤติกรรม (D00-D05, D07-D21, D26,D28-D29 D31-D32,D34-D48) Other in situ and benign neoplasms and neoplasms of uncertain and unknown behaviour	รวม	8,937	75.50	8,971	54.54	5,166	56.34	14,662	67.23	7,129	125.31	44,865	69.07
		ชาย	4,044	69.44	3,959	49.43	2,133	47.17	6,378	58.66	2,863	106.23	19,377	60.70
		หญิง	4,893	81.38	5,012	59.38	3,033	65.25	8,284	75.73	4,266	142.48	25,488	77.16
โรคเลือดอวัยวะที่สร้างเลือดและความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน (D50-D89)														
097	โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก (D50) Iron deficiency anaemia	รวม	17,443	147.37	22,429	136.35	19,278	210.23	34,233	156.96	5,920	104.06	99,303	152.88
		ชาย	7,937	136.29	8,998	112.34	7,822	172.98	14,107	129.75	2,417	89.68	41,281	129.32
		หญิง	9,506	158.10	13,431	159.14	11,456	246.47	20,126	184.00	3,503	117.00	58,022	175.65
098	โลหิตจางอื่น ๆ (D51-D64) Other anaemia	รวม	137,096	1,158.27	155,208	943.55	67,769	739.03	257,871	1,182.33	51,572	906.48	669,516	1,030.73
		ชาย	64,742	1,111.67	69,933	873.13	29,534	653.14	115,811	1,065.21	23,169	859.63	303,189	949.77
		หญิง	72,354	1,203.40	85,275	1,010.37	38,235	822.59	142,060	1,298.75	28,403	948.65	366,327	1,108.98
099	ภาวะเลือดออกอื่น ๆ โรคเลือดและอวัยวะที่สร้างเลือด (D65-D77) Haemorrhagic conditions and other diseases of blood and blood forming organs	รวม	27,131	229.22	27,233	165.56	15,740	171.65	53,979	247.49	13,299	233.76	137,382	211.50
		ชาย	15,822	271.68	14,935	186.47	8,837	195.43	31,832	292.79	7,309	271.18	78,735	246.64
		หญิง	11,309	188.09	12,298	145.71	6,903	148.51	22,147	202.47	5,990	200.06	58,647	177.54
100	ความผิดปกติที่เกี่ยวกับกลไกของภูมิคุ้มกัน (D80-D89) Certain disorders involving the immune mechanism	รวม	162	1.37	294	1.79	163	1.78	307	1.41	458	8.05	1,384	2.13
		ชาย	108	1.85	198	2.47	111	2.45	225	2.07	274	10.17	916	2.87
		หญิง	54	0.90	96	1.14	52	1.12	82	0.75	184	6.15	468	1.42
โรคต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิซึม														
101	การขาดไอโอดีนที่มีความสัมพันธ์กับต่อมธัยรอยด์ (E00-E02) Iodine deficiency related thyroid disorders	รวม	162	1.37	169	1.03	62	0.68	203	0.93	113	1.99	709	1.09
		ชาย	59	1.01	57	0.71	25	0.55	66	0.61	43	1.60	250	0.78
		หญิง	103	1.71	112	1.33	37	0.80	137	1.25	70	2.34	459	1.39
102	โรคพิษธัยรอยด์ (E05) Thyrotoxicosis	รวม	5,703	48.18	6,082	36.97	3,003	32.75	11,297	51.80	1,985	34.89	28,070	43.21
		ชาย	1,347	23.13	1,584	19.78	857	18.95	2,890	26.58	567	21.04	7,245	22.70
		หญิง	4,356	72.45	4,498	53.29	2,146	46.17	8,407	76.86	1,418	47.36	20,825	63.04
103	ความผิดปกติของต่อมธัยรอยด์อื่น ๆ (E03-E04, E06-E07) Other disorders of thyroid	รวม	4,978	42.06	6,383	38.80	3,541	38.62	8,546	39.18	4,036	70.94	27,484	42.31
		ชาย	1,113	19.11	1,429	17.84	755	16.70	1,724	15.86	1,131	41.96	6,152	19.27
		หญิง	3,865	64.28	4,954	58.70	2,786	59.94	6,822	62.37	2,905	97.03	21,332	64.58

ตาราง 19 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2557 (ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ภาคเหนือ		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.)		ภาคใต้		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพมหานคร		หน่วยนับ : รายโรค	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	รวมทั้งประเทศ	จำนวน
104	เบาหวาน (E10-E14) Diabetes mellitus	รวม	113,941	962.64	166,592	1,012.75	73,841	805.25	258,702	1,186.14	57,588	1,012.22	670,664	1,032.50
		ชาย	44,483	763.81	61,882	772.61	28,306	625.98	97,892	900.39	25,343	940.29	257,906	807.91
		หญิง	69,458	1,155.23	104,710	1,240.64	45,535	979.65	160,810	1,470.17	32,245	1,076.97	412,758	1,249.54
105	ทุพโภชนาการ (E40-E46) Malnutrition	รวม	2,994	25.30	4,309	26.20	3,774	41.16	7,309	33.51	3,861	67.86	22,247	34.25
		ชาย	1,715	29.45	2,500	31.21	2,152	47.59	4,222	38.83	2,022	75.02	12,611	39.51
		หญิง	1,279	21.27	1,809	21.43	1,622	34.90	3,087	28.22	1,839	61.42	9,636	29.17
106	การขาดวิตามินเอ (E50) Vitamin A deficiency	รวม	9	0.08	22	0.13	7	0.08	15	0.07	23	0.40	76	0.12
		ชาย	2	0.03	7	0.09	3	0.07	5	0.05	15	0.56	32	0.10
		หญิง	7	0.12	15	0.18	4	0.09	10	0.09	8	0.27	44	0.13
107	การขาดวิตามินอื่น ๆ (E51-E56) Other vitamin deficiencies	รวม	169	1.43	192	1.17	88	0.96	347	1.59	852	14.98	1,648	2.54
		ชาย	99	1.70	123	1.54	49	1.08	223	2.05	368	13.65	862	2.70
		หญิง	70	1.16	69	0.82	39	0.84	124	1.13	484	16.17	786	2.38
108	ผลที่ตามมาของภาวะทุพโภชนาการและภาวะพร่อง โภชนาการอื่น ๆ Sequelae of malnutrition and other nutritional deficiencies (E64)	รวม	12	0.10	15	0.09	13	0.14	26	0.12	12	0.21	78	0.12
		ชาย	9	0.15	5	0.06	6	0.13	14	0.13	6	0.22	40	0.13
		หญิง	3	0.05	10	0.12	7	0.15	12	0.11	6	0.20	38	0.12
109	โรคอ้วน (E66) Obesity	รวม	1,124	9.50	2,107	12.81	1,836	20.02	2,491	11.42	1,950	34.28	9,508	14.64
		ชาย	461	7.92	786	9.81	534	11.81	905	8.32	833	30.91	3,519	11.02
		หญิง	663	11.03	1,321	15.65	1,302	28.01	1,586	14.50	1,117	37.31	5,989	18.13
110	การขาดปริมาณของเหลวในร่างกาย (E86) Volume depletion	รวม	23,344	197.22	28,938	175.92	29,794	324.91	47,168	216.26	5,778	101.56	135,022	207.87
		ชาย	12,020	206.39	14,998	187.25	14,633	323.61	23,367	214.93	3,163	117.36	68,181	213.58
		หญิง	11,324	188.34	13,940	165.17	15,161	326.18	23,801	217.60	2,615	87.34	66,841	202.35
111	ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะ บอลิกอื่น ๆ (E15-E35, E58-E63, E65, E67- E85, E87-E90) Other Endocrine, nutritional and metabolic disorders	รวม	359,042	3,033.40	451,404	2,744.19	214,725	2,341.61	607,687	2,786.23	155,638	2,735.64	1,788,496	2,753.43
		ชาย	169,894	2,917.22	205,206	2,562.04	99,937	2,210.09	292,162	2,687.26	74,689	2,771.17	841,888	2,637.29
		หญิง	189,148	3,145.92	246,198	2,917.04	114,788	2,469.56	315,525	2,884.61	80,949	2,703.66	946,608	2,865.66
โรคทางจิตเวชและความผิดปกติของพฤติกรรม														
112	สมองเสื่อม (F00-F03) Dementia	รวม	1,508	12.74	2,235	13.59	662	7.22	2,111	9.68	1,826	32.10	8,342	12.84
		ชาย	655	11.25	954	11.91	317	7.01	889	8.18	764	28.35	3,579	11.21
		หญิง	853	14.19	1,281	15.18	345	7.42	1,222	11.17	1,062	35.47	4,763	14.42

ตาราง 19 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2557 (ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ภาคเหนือ		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.)		ภาคใต้		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพมหานคร		หน่วยนับ : รายโรค รวมทั้งประเทศ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
113	ความผิดปกติของพฤติกรรมและจิตประสาทที่เกิดจากการเสพยาแอลกอฮอล์ (F10) Mental and behavioral disorders due to use of alcohol	รวม	25,623	216.48	17,971	109.25	5,925	64.61	40,581	186.06	3,550	62.40	93,650	144.18
		ชาย	22,925	393.64	15,477	193.23	5,543	122.58	36,208	333.04	3,143	116.61	83,296	260.93
		หญิง	2,698	44.87	2,494	29.55	382	8.22	4,373	39.98	407	13.59	10,354	31.34
114	ความผิดปกติทางพฤติกรรมและจิตประสาทที่เกิดจากการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทอื่น ๆ (F11-F19) Mental and behavioral disorders due to other psychoactive substance use	รวม	3,145	26.57	5,791	35.20	3,307	36.06	5,448	24.98	2,484	43.66	20,175	31.06
		ชาย	2,601	44.66	4,856	60.63	3,083	68.18	4,985	45.85	2,041	75.73	17,566	55.03
		หญิง	544	9.05	935	11.08	224	4.82	463	4.23	443	14.80	2,609	7.90
115	จิตเภท พฤติกรรมแบบจิตเภทและความหลงผิด (F20-F29) Schizophrenia, schizotypal and delusional disorders	รวม	8,696	73.47	10,040	61.04	5,523	60.23	22,307	102.28	4,509	79.25	51,075	78.63
		ชาย	5,115	87.83	5,851	73.05	3,717	82.20	14,823	136.34	2,682	99.51	32,188	100.83
		หญิง	3,581	59.56	4,189	49.63	1,806	38.85	7,484	68.42	1,827	61.02	18,887	57.18
116	ความผิดปกติทางอารมณ์ (F30-F39) Mood (affective) disorders	รวม	7,886	66.63	5,723	34.79	4,341	47.34	8,900	40.81	2,152	37.83	29,002	44.65
		ชาย	2,778	47.70	1,942	24.25	1,426	31.54	2,812	25.86	914	33.91	9,872	30.92
		หญิง	5,108	84.96	3,781	44.80	2,915	62.71	6,088	55.66	1,238	41.35	19,130	57.91
117	โรคประสาท อาการทางกายที่เกิดจากจิตใจและความเครียด (F40-F48) Neurotic, stress related and somatoform disorders	รวม	5,643	47.68	5,045	30.67	3,866	42.16	9,377	42.99	1,205	21.18	25,136	38.70
		ชาย	1,735	29.79	1,681	20.99	1,116	24.68	2,322	21.36	475	17.62	7,329	22.96
		หญิง	3,908	65.00	3,364	39.86	2,750	59.16	7,055	64.50	730	24.38	17,807	53.91
118	ภาวะปัญญาอ่อน (F70-F79) Mental retardation	รวม	738	6.24	1,134	6.89	531	5.79	1,385	6.35	1,170	20.57	4,958	7.63
		ชาย	377	6.47	619	7.73	295	6.52	750	6.90	667	24.75	2,708	8.48
		หญิง	361	6.00	515	6.10	236	5.08	635	5.81	503	16.80	2,250	6.81
119	ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมอื่น ๆ (F04-F09, F50-F69, F80-F99) Other mental and behavioral disorders	รวม	8,016	67.72	8,888	54.03	3,231	35.23	10,817	49.60	4,628	81.35	35,580	54.78
		ชาย	4,907	84.26	5,302	66.20	1,841	40.71	5,765	53.03	2,826	104.85	20,641	64.66
		หญิง	3,109	51.71	3,586	42.49	1,390	29.90	5,052	46.19	1,802	60.19	14,939	45.22
โรคระบบประสาท (G00-G99)														
120	การอักเสบของระบบประสาทส่วนกลาง (G00-G09) Inflammatory diseases of the central nervous system	รวม	5,274	44.56	4,697	28.55	2,013	21.95	10,994	50.41	1,728	30.37	24,706	38.04
		ชาย	3,198	54.91	2,845	35.52	1,120	24.77	6,891	63.38	1,023	37.96	15,077	47.23
		หญิง	2,076	34.53	1,852	21.94	893	19.21	4,103	37.51	705	23.55	9,629	29.15
121	โรคพาคินสัน (G20) Parkinson's disease	รวม	2,256	19.06	3,427	20.83	1,346	14.68	3,568	16.36	2,125	37.35	12,722	19.59
		ชาย	1,099	18.87	1,595	19.91	592	13.09	1,633	15.02	1,079	40.03	5,998	18.79
		หญิง	1,157	19.24	1,832	21.71	754	16.22	1,935	17.69	1,046	34.94	6,724	20.36

ตาราง 19 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2557 (ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ภาคเหนือ		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.)		ภาคใต้		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพมหานคร		หน่วยนับ : รายโรค	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	รวมทั้งประเทศ	จำนวน
122	โรคแอลไซเมอร์ (G30) Alzheimer;s disease	รวม	800	6.76	1,179	7.17	473	5.16	971	4.45	1,065	18.72	4,488	6.91
		ชาย	322	5.53	443	5.53	190	4.20	395	3.63	410	15.21	1,760	5.51
		หญิง	478	7.95	736	8.72	283	6.09	576	5.27	655	21.88	2,728	8.26
123	มัลติเปิ้ล สเคลอโรสิส (G35) Multiple sclerosis	รวม	133	1.12	64	0.39	56	0.61	169	0.77	51	0.90	473	0.73
		ชาย	25	0.43	9	0.11	5	0.11	25	0.23	14	0.52	78	0.24
		หญิง	108	1.80	55	0.65	51	1.10	144	1.32	37	1.24	395	1.20
124	ลมบ้าหมู (G40-G41) Epilepsy	รวม	14,645	123.73	15,378	93.49	9,067	98.88	22,667	103.93	5,733	100.77	67,490	103.90
		ชาย	9,140	156.94	9,588	119.71	5,584	123.49	14,087	129.57	3,314	122.96	41,713	130.67
		หญิง	5,505	91.56	5,790	68.60	3,483	74.93	8,580	78.44	2,419	80.79	25,777	78.03
125	โรคไมเกรนและกลุ่มอาการปวดศีรษะอื่นๆ (G43-G44) Migraine and other headache syndromes	รวม	2,978	25.16	3,614	21.97	2,813	30.68	6,368	29.20	606	10.65	16,379	25.22
		ชาย	928	15.93	1,036	12.93	832	18.40	2,145	19.73	140	5.19	5,081	15.92
		หญิง	2,050	34.10	2,578	30.55	1,981	42.62	4,223	38.61	466	15.56	11,298	34.20
126	โรคเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยชั่วคราวและกลุ่มอาการต่อเนื่อง (G45) Transient cerebral ischaemic attacks and related syndromes	รวม	1,644	13.89	2,278	13.85	1,331	14.51	2,872	13.17	809	14.22	8,934	13.75
		ชาย	904	15.52	1,235	15.42	782	17.29	1,617	14.87	459	17.03	4,997	15.65
		หญิง	740	12.31	1,043	12.36	549	11.81	1,255	11.47	350	11.69	3,937	11.92
127	ความผิดปกติของเส้นประสาท รากประสาทและปมประสาท (G50-G59) Nerve, nerve root and plexus disorders	รวม	1,762	14.89	1,760	10.70	1,317	14.36	3,399	15.58	1,463	25.72	9,701	14.93
		ชาย	798	13.70	776	9.69	528	11.68	1,584	14.57	697	25.86	4,383	13.73
		หญิง	964	16.03	984	11.66	789	16.97	1,815	16.59	766	25.58	5,318	16.10
128	สมองพิการและกลุ่มอาการอัมพาตอื่น ๆ (G80-G83) Cerebral palsy and other paralytic syndromes	รวม	6,407	54.13	7,431	45.17	5,079	55.39	14,250	65.34	4,324	76.00	37,491	57.72
		ชาย	4,006	68.79	4,605	57.49	3,170	70.10	8,949	82.31	2,471	91.68	23,201	72.68
		หญิง	2,401	39.93	2,826	33.48	1,909	41.07	5,301	48.46	1,853	61.89	14,290	43.26
129	โรคของระบบประสาทอื่น ๆ (G10-G13, G21-G26, G31-G32, G36-G37, G46-G47, G60-G73, G90-G99) Other diseases of the nervous system	รวม	14,359	121.31	14,636	88.98	8,758	95.51	29,323	134.45	10,575	185.88	77,651	119.55
		ชาย	8,131	139.62	7,552	94.29	4,789	105.91	16,563	152.34	5,709	211.82	42,744	133.90
		หญิง	6,228	103.58	7,084	83.93	3,969	85.39	12,760	116.66	4,866	162.52	34,907	105.67
โรคของตาและส่วนประกอบของตา (H00-H59)														
130	การอักเสบของหนังตา (H00-H01) Inflammation of eyelid	รวม	496	4.19	463	2.81	428	4.67	917	4.20	179	3.15	2,483	3.82
		ชาย	229	3.93	223	2.78	207	4.58	462	4.25	81	3.01	1,202	3.77
		หญิง	267	4.44	240	2.84	221	4.75	455	4.16	98	3.27	1,281	3.88

ตาราง 19 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2557 (ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ภาคเหนือ		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.)		ภาคใต้		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพมหานคร		หน่วยนับ : รายโรค รวมทั้งประเทศ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
131	เยื่อตาอักเสบและความผิดปกติของเยื่อตาอื่น ๆ (H10-H13) Conjunctivitis and other disorders of conjunctiva	รวม	3,811	32.20	6,049	36.77	2,618	28.55	7,987	36.62	949	16.68	21,414	32.97
		ชาย	1,732	29.74	2,747	34.30	1,140	25.21	3,193	29.37	484	17.96	9,296	29.12
		หญิง	2,079	34.58	3,302	39.12	1,478	31.80	4,794	43.83	465	15.53	12,118	36.68
132	กระจกตาอักเสบและความผิดปกติของตาขาว และกระจกตาอื่น ๆ (H15-H19) Keratitis and other disorders of sclera and cornea	รวม	1,462	12.35	1,904	11.57	963	10.50	3,143	14.41	1,037	18.23	8,509	13.10
		ชาย	829	14.23	1,077	13.45	610	13.49	1,846	16.98	556	20.63	4,918	15.41
		หญิง	633	10.53	827	9.80	353	7.59	1,297	11.86	481	16.07	3,591	10.87
133	ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ (H25-H28) Cataract and other disorders of sclera and cornea	รวม	37,573	317.44	58,961	358.44	19,448	212.08	64,522	295.83	19,515	343.01	200,019	307.93
		ชาย	16,427	282.07	23,218	289.88	8,341	184.46	26,740	245.95	8,307	308.21	83,033	260.11
		หญิง	21,146	351.70	35,743	423.50	11,107	238.96	37,782	345.41	11,208	374.34	116,986	354.15
134	จอประสาทตาหลุดออกและรอยฉีกของจอประสาทตา (H33) Retinal detachments and breaks	รวม	686	5.80	1,552	9.43	634	6.91	1,266	5.80	1,539	27.05	5,677	8.74
		ชาย	417	7.16	863	10.77	348	7.70	722	6.64	889	32.98	3,239	10.15
		หญิง	269	4.47	689	8.16	286	6.15	544	4.97	650	21.71	2,438	7.38
135	ต้อหิน (H40-H42) Glaucoma	รวม	3,024	25.55	3,619	22.00	1,890	20.61	4,842	22.20	2,836	49.85	16,211	24.96
		ชาย	1,404	24.11	1,693	21.14	931	20.59	2,070	19.04	1,401	51.98	7,499	23.49
		หญิง	1,620	26.94	1,926	22.82	959	20.63	2,772	25.34	1,435	47.93	8,712	26.37
136	ตาเหล่ (H49-H50) Strabismus	รวม	277	2.34	333	2.02	340	3.71	599	2.75	753	13.24	2,302	3.54
		ชาย	127	2.18	162	2.02	154	3.41	292	2.69	362	13.43	1,097	3.44
		หญิง	150	2.49	171	2.03	186	4.00	307	2.81	391	13.06	1,205	3.65
137	ความผิดปกติของสายตาและการเพ่งมอง (H52) Disorders of refraction and accommodation	รวม	126	1.06	293	1.78	146	1.59	287	1.32	232	4.08	1,084	1.67
		ชาย	56	0.96	134	1.67	61	1.35	150	1.38	116	4.30	517	1.62
		หญิง	70	1.16	159	1.88	85	1.83	137	1.25	116	3.87	567	1.72
138	ตาบอดและสายตาเลือนราง (H54) Blindness and low vision	รวม	34,444	291.00	53,756	326.80	15,205	165.81	60,595	277.83	15,570	273.67	179,570	276.45
		ชาย	14,911	256.03	21,049	262.80	6,503	143.81	25,064	230.53	6,619	245.58	74,146	232.27
		หญิง	19,533	324.87	32,707	387.52	8,702	187.22	35,531	324.83	8,951	298.96	105,424	319.15
139	โรคของตาและส่วนประกอบของตาอื่น ๆ (H02-H06, H20-H22, H30-H32, H34-H36, H43-H48, H51, H53, H55-H59) Other diseases of the eye and adnexa	รวม	4,989	42.15	7,636	46.42	4,491	48.98	10,142	46.50	7,972	140.12	35,230	54.24
		ชาย	2,363	40.57	3,575	44.63	2,062	45.60	4,645	42.72	3,834	142.25	16,479	51.62
		หญิง	2,626	43.68	4,061	48.12	2,429	52.26	5,497	50.26	4,138	138.21	18,751	56.76

ตาราง 19 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2557 (ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ภาคเหนือ		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.)		ภาคใต้		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพมหานคร		หน่วยนับ : รายโรค รวมทั้งประเทศ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
โรคของหูและปมกกหู (H60-H95)														
140	หูชั้นกลางอักเสบและความผิดปกติของหูชั้นกลาง และปมกกหูอื่น ๆ (H65-H75) Otitis media and other disorders of middle ear and mastoid	รวม	1,395	11.79	1,344	8.17	1,551	16.91	1,972	9.04	1,218	21.41	7,480	11.52
		ชาย	728	12.50	722	9.01	793	17.54	970	8.92	639	23.71	3,852	12.07
		หญิง	667	11.09	622	7.37	758	16.31	1,002	9.16	579	19.34	3,628	10.98
141	การสูญเสียการได้ยิน (H90-H91) Hearing loss	รวม	566	4.78	592	3.60	244	2.66	835	3.83	696	12.23	2,933	4.52
		ชาย	357	6.13	309	3.86	128	2.83	447	4.11	395	14.66	1,636	5.12
		หญิง	209	3.48	283	3.35	116	2.50	388	3.55	301	10.05	1,297	3.93
142	โรคของหูและปมกกหูอื่น ๆ (H60-H62, H80-H83, H92-H95) Other diseases of the ear and mastoid process	รวม	4,391	37.10	6,617	40.23	5,601	61.08	8,417	38.59	1,324	23.27	26,350	40.57
		ชาย	1,401	24.06	1,940	24.22	1,658	36.67	2,657	24.44	482	17.88	8,138	25.49
		หญิง	2,990	49.73	4,677	55.41	3,943	84.83	5,760	52.66	842	28.12	18,212	55.13
โรกระบบไหลเวียนโลหิต (I00-I99)														
143	ไข้รูมาติกเฉียบพลัน (I00-I02) Acute rheumatic fever	รวม	73	0.62	71	0.43	147	1.60	237	1.09	39	0.69	567	0.87
		ชาย	35	0.60	33	0.41	79	1.75	116	1.07	22	0.82	285	0.89
		หญิง	38	0.63	38	0.45	68	1.46	121	1.11	17	0.57	282	0.85
144	โรคหัวใจรูมาติกเรื้อรัง (I05-I09) Chronic rheumatic heart disease	รวม	5,267	44.50	4,092	24.88	2,129	23.22	9,265	42.48	2,461	43.26	23,214	35.74
		ชาย	1,986	34.10	1,595	19.91	709	15.68	3,823	35.16	913	33.87	9,026	28.27
		หญิง	3,281	54.57	2,497	29.59	1,420	30.55	5,442	49.75	1,548	51.70	14,188	42.95
145	ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุ (I10) Essential (primary) hypertension	รวม	203,992	1,723.44	268,363	1,631.44	127,145	1,386.54	307,901	1,411.72	95,720	1,682.47	1,003,121	1,544.32
		ชาย	88,051	1,511.91	109,295	1,364.57	54,720	1,210.12	127,937	1,176.74	43,758	1,623.54	423,761	1,327.47
		หญิง	115,941	1,928.34	159,068	1,884.70	72,425	1,558.16	179,964	1,645.28	51,962	1,735.51	579,360	1,753.89
146	โรคความดันโลหิตสูงอื่น ๆ (I11-I15) Other hypertensive diseases	รวม	1,799	15.20	2,139	13.00	2,671	29.13	3,141	14.40	1,360	23.90	11,110	17.10
		ชาย	816	14.01	906	11.31	1,335	29.52	1,330	12.23	645	23.93	5,032	15.76
		หญิง	983	16.35	1,233	14.61	1,336	28.74	1,811	16.56	715	23.88	6,078	18.40
147	กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (I21-I22) Acute myocardial infarction	รวม	11,980	101.21	18,223	110.78	10,899	118.86	17,544	80.44	6,293	110.61	64,939	99.97
		ชาย	6,142	105.46	9,915	123.79	6,978	154.32	9,994	91.92	3,704	137.43	36,733	115.07
		หญิง	5,838	97.10	8,308	98.44	3,921	84.36	7,550	69.02	2,589	86.47	28,206	85.39
148	โรคหัวใจขาดเลือดอื่น ๆ (I20, I23-I25) Other ischaemic heart diseases	รวม	35,006	295.75	60,854	369.95	29,302	319.54	48,125	220.65	26,594	467.44	199,881	307.72
		ชาย	16,941	290.89	30,523	381.09	18,347	405.74	26,110	240.16	15,255	566.00	107,176	335.74
		หญิง	18,065	300.46	30,331	359.37	10,955	235.69	22,015	201.27	11,339	378.72	92,705	280.65

ตาราง 19 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2557 (ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ภาคเหนือ		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.)		ภาคใต้		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพมหานคร		หน่วยนับ : รายโรค รวมทั้งประเทศ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
149	ก่อนเลือดอุดตันในหลอดเลือดใหญ่ของปอด (I26) Pulmonary embolism	รวม	677	5.72	791	4.81	477	5.20	980	4.49	837	14.71	3,762	5.79
		ชาย	261	4.48	265	3.31	168	3.72	365	3.36	302	11.21	1,361	4.26
		หญิง	416	6.92	526	6.23	309	6.65	615	5.62	535	17.87	2,401	7.27
150	ความผิดปกติของการนำกระแสไฟฟ้าหัวใจและหัวใจ เต้นผิดจังหวะ (I44-I49) Conduction disorders and cardiac arrhythmias	รวม	38,065	321.60	42,061	255.70	18,585	202.67	67,415	309.10	18,142	318.88	184,268	283.68
		ชาย	17,754	304.85	19,327	241.30	8,941	197.73	32,551	299.40	8,737	324.17	87,310	273.51
		หญิง	20,311	337.81	22,734	269.36	9,644	207.48	34,864	318.74	9,405	314.12	96,958	293.52
151	หัวใจล้มเหลว (I50) Heart failure	รวม	35,519	300.09	47,564	289.15	27,295	297.66	43,787	200.76	13,067	229.68	167,232	257.46
		ชาย	14,802	254.16	19,677	245.67	12,122	268.08	19,930	183.31	6,109	226.66	72,640	227.55
		หญิง	20,717	344.57	27,887	330.42	15,173	326.43	23,857	218.11	6,958	232.39	94,592	286.36
152	โรคหัวใจอื่น ๆ (I27-I43, I51-I52) Other heart diseases	รวม	18,441	155.80	20,501	124.63	10,654	116.18	31,813	145.86	12,506	219.82	93,915	144.58
		ชาย	8,982	154.23	9,801	122.37	4,887	108.08	15,668	144.11	6,184	229.44	45,522	142.60
		หญิง	9,459	157.32	10,700	126.78	5,767	124.07	16,145	147.60	6,322	211.15	48,393	146.50
153	เลือดออกในสมอง (I60-I62) Intracranial haemorrhage	รวม	9,975	84.27	11,655	70.85	5,246	57.21	12,105	55.50	4,127	72.54	43,108	66.37
		ชาย	6,009	103.18	6,823	85.19	3,075	68.00	7,423	68.28	2,364	87.71	25,694	80.49
		หญิง	3,966	65.96	4,832	57.25	2,171	46.71	4,682	42.80	1,763	58.88	17,414	52.72
154	เนื้อสมองตาย (I63) Cerebral infraction	รวม	15,320	129.43	22,018	133.85	10,165	110.85	25,403	116.47	7,130	125.32	80,036	123.22
		ชาย	8,128	139.56	12,062	150.60	5,759	127.36	13,857	127.45	3,882	144.03	43,688	136.86
		หญิง	7,192	119.62	9,956	117.96	4,406	94.79	11,546	105.56	3,248	108.48	36,348	110.04
155	เป็นลมหมดสติที่ไม่จัดกลุ่มว่าเป็นจากเลือดออกใน สมองหรือเนื้อสมองตายจากการขาดเลือด (I64) Stroke, not specified as haemorrhage or infarction	รวม	3,237	27.35	3,425	20.82	2,685	29.28	7,802	35.77	662	11.64	17,811	27.42
		ชาย	1,790	30.74	1,801	22.49	1,482	32.77	4,242	39.02	351	13.02	9,666	30.28
		หญิง	1,447	24.07	1,624	19.24	1,203	25.88	3,560	32.55	311	10.39	8,145	24.66
156	โรคหลอดเลือดในสมองอื่น ๆ (I65-I69) Other cerebrovascular diseases	รวม	17,675	149.33	24,435	148.55	12,073	131.66	22,856	104.79	10,842	190.57	87,881	135.29
		ชาย	9,473	162.66	13,131	163.94	6,870	151.93	12,728	117.07	5,768	214.01	47,970	150.27
		หญิง	8,202	136.42	11,304	133.93	5,203	111.94	10,128	92.59	5,074	169.47	39,911	120.82
157	อะเทโรสเคลอโรสิส (I70) Atherosclerosis	รวม	228	1.93	301	1.83	156	1.70	267	1.22	891	15.66	1,843	2.84
		ชาย	120	2.06	156	1.95	90	1.99	143	1.32	445	16.51	954	2.99
		หญิง	108	1.80	145	1.72	66	1.42	124	1.13	446	14.90	889	2.69
158	โรคหลอดเลือดส่วนปลายอื่น ๆ (I73) Other peripheral vascular diseases	รวม	230	1.94	473	2.88	271	2.96	317	1.45	333	5.85	1,624	2.50
		ชาย	125	2.15	255	3.18	178	3.94	163	1.50	176	6.53	897	2.81
		หญิง	105	1.75	218	2.58	93	2.00	154	1.41	157	5.24	727	2.20

ตาราง 19 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2557 (ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ภาคเหนือ		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.)		ภาคใต้		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพมหานคร		หน่วยนับ : รายโรค รวมทั้งประเทศ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
159	ลิ่มเลือดและก้อนเลือดอุดตันที่หลอดเลือดแดง (I74) Aterial embolism and thrombosis	รวม	1,013	8.56	1,331	8.09	695	7.58	1,559	7.15	751	13.20	5,349	8.23
		ชาย	550	9.44	696	8.69	432	9.55	873	8.03	389	14.43	2,940	9.21
		หญิง	463	7.70	635	7.52	263	5.66	686	6.27	362	12.09	2,409	7.29
160	โรคของหลอดเลือดแดง หลอดเลือดแดงย่อย และ แคปิลลารีอื่น ๆ (I71-I72, I77-I79) Other disease of arteries, arterioles and capillaries	รวม	2,401	20.29	2,604	15.83	1,851	20.19	3,751	17.20	2,214	38.92	12,821	19.74
		ชาย	1,255	21.55	1,429	17.84	1,162	25.70	2,109	19.40	1,378	51.13	7,333	22.97
		หญิง	1,146	19.06	1,175	13.92	689	14.82	1,642	15.01	836	27.92	5,488	16.61
161	หลอดเลือดดำอักเสบ หลอดเลือดดำอักเสบมีลิ่มเลือด ก่อนเลือดและลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ (I80-I82) Phlebitis, thrombophlebitis, venous embolism and thrombosis	รวม	3,660	30.92	3,826	23.26	2,174	23.71	5,899	27.05	2,536	44.58	18,095	27.86
		ชาย	1,559	26.77	1,457	18.19	895	19.79	2,530	23.27	995	36.92	7,436	23.29
		หญิง	2,101	34.94	2,369	28.07	1,279	27.52	3,369	30.80	1,541	51.47	10,659	32.27
162	หลอดเลือดดำขอดของระยางส่วนล่าง (I83) Varicose veins of lower extremities	รวม	194	1.64	402	2.44	202	2.20	214	0.98	332	5.84	1,344	2.07
		ชาย	87	1.49	157	1.96	79	1.75	97	0.89	117	4.34	537	1.68
		หญิง	107	1.78	245	2.90	123	2.65	117	1.07	215	7.18	807	2.44
163	ริดสีดวงทวาร (I84) Haemorrhoids	รวม	3,929	33.19	3,960	24.07	2,375	25.90	5,171	23.71	1,587	27.89	17,022	26.21
		ชาย	2,424	41.62	2,262	28.24	1,350	29.86	2,910	26.77	837	31.05	9,783	30.65
		หญิง	1,505	25.03	1,698	20.12	1,025	22.05	2,261	20.67	750	25.05	7,239	21.91
164	โรคอื่น ๆ ของระบบไหลเวียนโลหิต (I85-I99) Other diseases of the circulatory system	รวม	11,287	95.36	9,979	60.66	3,996	43.58	11,608	53.22	3,250	57.13	40,120	61.77
		ชาย	6,770	116.25	5,853	73.08	2,357	52.12	7,068	65.01	1,950	72.35	23,998	75.18
		หญิง	4,517	75.13	4,126	48.89	1,639	35.26	4,540	41.51	1,300	43.42	16,122	48.81
โรกระบบหายใจ (J00-J99)														
165	คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบ เฉียบพลัน (J02-J03) Acute pharyngitis and acute tonsillitis	รวม	17,437	147.32	23,384	142.16	15,475	168.76	25,163	115.37	2,876	50.55	84,335	129.84
		ชาย	9,300	159.69	12,435	155.25	7,960	176.03	12,838	118.08	1,566	58.10	44,099	138.14
		หญิง	8,137	135.34	10,949	129.73	7,515	161.68	12,325	112.68	1,310	43.75	40,236	121.81
166	กล่องเสียงและหลอดลมใหญ่อักเสบเฉียบพลัน (J04) Acute laryngitis and tracheitis	รวม	160	1.35	207	1.26	97	1.06	289	1.33	101	1.78	854	1.31
		ชาย	70	1.20	116	1.45	58	1.28	174	1.60	47	1.74	465	1.46
		หญิง	90	1.50	91	1.08	39	0.84	115	1.05	54	1.80	389	1.18
167	การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลัน อื่น ๆ (J00-J01, J05-J06) Other acute upper respiratory infections	รวม	13,440	113.55	18,666	113.47	14,464	157.73	25,879	118.65	4,478	78.71	76,927	118.43
		ชาย	7,252	124.52	10,446	130.42	7,285	161.11	13,744	126.42	2,451	90.94	41,178	128.99
		หญิง	6,188	102.92	8,220	97.39	7,179	154.45	12,135	110.94	2,027	67.70	35,749	108.22

ตาราง 19 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรค ระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2557 (ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ภาคเหนือ		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.)		ภาคใต้		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพมหานคร		รวมทั้งประเทศ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
168	ไข้หวัดใหญ่ (J10-J11) Influenza	รวม	6,831	57.71	6,392	38.86	3,333	36.35	7,454	34.18	2,229	39.18	26,239	40.40
		ชาย	3,659	62.83	3,461	43.21	1,687	37.31	3,725	34.26	1,150	42.67	13,682	42.86
		หญิง	3,172	52.76	2,931	34.73	1,646	35.41	3,729	34.09	1,079	36.04	12,557	38.01
169	ปอดบวม (J12-J18) Pneumonia	รวม	70,299	593.93	90,891	552.55	54,189	590.94	150,497	690.03	21,333	374.97	387,209	596.12
		ชาย	39,766	682.82	50,556	631.20	30,913	683.64	84,089	773.44	12,034	446.49	217,358	680.89
		หญิง	30,533	507.83	40,335	477.90	23,276	500.76	66,408	607.12	9,299	310.58	169,851	514.19
170	หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบ เฉียบพลัน (J20-J21) Acute bronchitis and acute bronchiolitis	รวม	28,702	242.49	35,524	215.96	28,542	311.26	60,642	278.04	5,788	101.74	159,198	245.09
		ชาย	15,996	274.66	19,344	241.51	15,842	350.34	33,675	309.74	3,184	118.14	88,041	275.80
		หญิง	12,706	211.33	16,180	191.71	12,700	273.23	26,967	246.54	2,604	86.97	71,157	215.41
171	ไซนัสอักเสบเรื้อรัง (J32) Chronic sinusitis	รวม	1,054	8.90	1,186	7.21	453	4.94	1,585	7.27	745	13.09	5,023	7.73
		ชาย	544	9.34	645	8.05	260	5.75	810	7.45	374	13.88	2,633	8.25
		หญิง	510	8.48	541	6.41	193	4.15	775	7.09	371	12.39	2,390	7.24
172	โรคอื่นของจมูกและไซนัส (J30-J31, J33-J34) Other diseases of nose and nasal sinuses	รวม	1,996	16.86	3,230	19.64	1,520	16.58	2,694	12.35	2,108	37.05	11,548	17.78
		ชาย	1,124	19.30	1,740	21.72	839	18.55	1,439	13.24	1,212	44.97	6,354	19.90
		หญิง	872	14.50	1,490	17.65	681	14.65	1,255	11.47	896	29.93	5,194	15.72
173	โรคเรื้อรังของต่อมทอนซิลและต่อมน้ำเหลืองในคอ (J35) Chronic diseases of tonsils and adenoids	รวม	1,272	10.75	1,772	10.77	1,296	14.13	2,249	10.31	1,336	23.48	7,925	12.20
		ชาย	713	12.24	1,036	12.93	664	14.68	1,166	10.72	829	30.76	4,408	13.81
		หญิง	559	9.30	736	8.72	632	13.60	1,083	9.90	507	16.93	3,517	10.65
174	โรคอื่น ๆ ของระบบหายใจส่วนบน (J36-J39) Other diseases of upper respiratory tract	รวม	1,152	9.73	1,212	7.37	983	10.72	1,985	9.10	1,257	22.09	6,589	10.14
		ชาย	637	10.94	707	8.83	601	13.29	1,126	10.36	698	25.90	3,769	11.81
		หญิง	515	8.57	505	5.98	382	8.22	859	7.85	559	18.67	2,820	8.54
175	โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิด อุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น (J40-J44) Bronchitis, emphysema and other chronic obstructive pulmonary diseases	รวม	66,886	565.09	47,758	290.33	42,471	463.15	60,515	277.46	8,373	147.17	226,003	347.94
		ชาย	41,708	716.16	36,759	458.94	31,586	698.52	47,792	439.58	6,359	235.94	164,204	514.38
		หญิง	25,178	418.76	10,999	130.32	10,885	234.18	12,723	116.32	2,014	67.27	61,799	187.08
176	โรคหืด (J45-J46) Asthma	รวม	12,855	108.61	24,088	146.44	17,904	195.25	34,718	159.18	6,080	106.87	95,645	147.25
		ชาย	4,985	85.60	9,065	113.18	6,655	147.17	13,420	123.43	2,446	90.75	36,571	114.56
		หญิง	7,870	130.89	15,023	178.00	11,249	242.01	21,298	194.71	3,634	121.37	59,074	178.83
177	โรคหลอดลมเล็กโป่งพอง (J47) Bronchioectasis	รวม	2,156	18.22	2,212	13.45	1,578	17.21	5,822	26.69	862	15.15	12,630	19.44
		ชาย	1,098	18.85	1,060	13.23	718	15.88	2,835	26.08	462	17.14	6,173	19.34
		หญิง	1,058	17.60	1,152	13.65	860	18.50	2,987	27.31	400	13.36	6,457	19.55

ตาราง 19 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรค ระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2557 (ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ภาคเหนือ		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.)		ภาคใต้		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพมหานคร		หน่วยนับ : รายโรค	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	รวมทั้งประเทศ	จำนวน
178	โรคฝุ่นสะสมในปอด (J60-J65) Pneumoconiosis	รวม	38	0.32	42	0.26	19	0.21	106	0.49	11	0.19	216	0.33
		ชาย	23	0.39	23	0.29	14	0.31	94	0.86	5	0.19	159	0.50
		หญิง	15	0.25	19	0.23	5	0.11	12	0.11	6	0.20	57	0.17
179	โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินหายใจ (J22, J66-J99) Other diseases of the respiratory system	รวม	56,789	479.79	60,061	365.12	36,521	398.27	100,722	461.81	20,330	357.34	274,423	422.48
		ชาย	33,209	570.23	34,285	428.06	21,503	475.54	60,677	558.10	11,182	414.88	160,856	503.90
		หญิง	23,580	392.18	25,776	305.40	15,018	323.10	40,045	366.10	9,148	305.54	113,567	343.80
โรกระบบย่อยอาหาร (K00-K93)														
180	ฟันผุ (K02) Dental caries	รวม	1,223	10.33	1,553	9.44	1,087	11.85	1,896	8.69	1,242	21.83	7,001	10.78
		ชาย	704	12.09	881	11.00	637	14.09	947	8.71	716	26.57	3,885	12.17
		หญิง	519	8.63	672	7.96	450	9.68	949	8.68	526	17.57	3,116	9.43
181	ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง (K00-K01, K03-K08) Other disorders of teeth and supporting structures	รวม	3,734	31.55	2,720	16.54	2,032	22.16	5,830	26.73	1,648	28.97	15,964	24.58
		ชาย	2,079	35.70	1,518	18.95	1,157	25.59	3,176	29.21	996	36.95	8,926	27.96
		หญิง	1,655	27.53	1,202	14.24	875	18.82	2,654	24.26	652	21.78	7,038	21.31
182	โรคอื่น ๆ ของช่องปาก คอมน้ำลายและขากรรไกร (K09-K14) Other diseases of the oral cavity, salivary glands and jaws	รวม	3,482	29.42	3,531	21.47	2,161	23.57	7,588	34.79	1,261	22.16	18,023	27.75
		ชาย	1,779	30.55	1,842	23.00	1,166	25.79	3,668	33.74	681	25.27	9,136	28.62
		หญิง	1,703	28.32	1,689	20.01	995	21.41	3,920	35.84	580	19.37	8,887	26.90
183	แผลเยื่อของกระเพาะอาหารดูโอเดนิ้ม (K25-K27) Gastric and duodenal ulcer	รวม	10,131	85.59	10,985	66.78	3,915	42.69	12,317	56.47	3,165	55.63	40,513	62.37
		ชาย	6,454	110.82	6,668	83.25	2,185	48.32	8,304	76.38	1,936	71.83	25,547	80.03
		หญิง	3,677	61.16	4,317	51.15	1,730	37.22	4,013	36.69	1,229	41.05	14,966	45.31
184	กระเพาะอาหารอักเสบและดูโอเดนิ้มอักเสบ (K29) Gastritis and duodenitis	รวม	15,116	127.71	20,480	124.50	12,594	137.34	27,306	125.20	4,992	87.74	80,488	123.91
		ชาย	8,274	142.07	10,655	133.03	6,192	136.94	15,032	138.26	2,639	97.91	42,792	134.05
		หญิง	6,842	113.80	9,825	116.41	6,402	137.73	12,274	112.21	2,353	78.59	37,696	114.12
185	โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนิ้ม (K20-K23, K28, K30-K31) Other diseases of oesophagus, stomach and duodenum	รวม	29,293	247.48	28,961	176.06	30,715	334.95	60,899	279.22	5,469	96.13	155,337	239.14
		ชาย	12,507	214.76	12,349	154.18	12,848	284.13	26,401	242.83	2,662	98.77	66,767	209.15
		หญิง	16,786	279.19	16,612	196.83	17,867	384.39	34,498	315.39	2,807	93.75	88,570	268.13
186	โรคของไส้ติ่ง (K35-K38) Diseases of appEndix	รวม	17,627	148.92	17,847	108.50	10,908	118.95	31,755	145.60	5,099	89.62	83,236	128.14
		ชาย	8,429	144.73	8,879	110.86	5,332	117.92	14,394	132.39	2,672	99.14	39,706	124.38
		หญิง	9,198	152.98	8,968	106.26	5,576	119.96	17,361	158.72	2,427	81.06	43,530	131.78

ตาราง 19 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2557 (ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ภาคเหนือ		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.)		ภาคใต้		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพมหานคร		หน่วยนับ : รายโรค รวมทั้งประเทศ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
187	ไส้เลื่อนที่บริเวณขาหนีบ (K40) Inguinal hernia	รวม	6,660	56.27	6,460	39.27	4,304	46.94	9,148	41.94	2,596	45.63	29,168	44.90
		ชาย	6,317	108.47	6,100	76.16	4,019	88.88	8,637	79.44	2,423	89.90	27,496	86.13
		หญิง	343	5.70	360	4.27	285	6.13	511	4.67	173	5.78	1,672	5.06
188	ไส้เลื่อนอื่น ๆ (K41-K46) Other hernia	รวม	1,019	8.61	1,240	7.54	675	7.36	1,084	4.97	856	15.05	4,874	7.50
		ชาย	415	7.13	554	6.92	303	6.70	569	5.23	385	14.28	2,226	6.97
		หญิง	604	10.05	686	8.13	372	8.00	515	4.71	471	15.73	2,648	8.02
189	โรคโครนและลำไส้ใหญ่อักเสบแผลเปื่อย (K50-K51) Crohn's disease and ulcerative colitis	รวม	201	1.70	194	1.18	100	1.09	248	1.14	169	2.97	912	1.40
		ชาย	89	1.53	100	1.25	59	1.30	131	1.20	101	3.75	480	1.50
		หญิง	112	1.86	94	1.11	41	0.88	117	1.07	68	2.27	432	1.31
190	ลำไส้ไม่ทำงานและลำไส้เกิดอุดตันแบบไม่มีไส้เลื่อน (K56) Paralytic ileus and intestinal obstruction without hernia	รวม	6,769	57.19	6,914	42.03	4,141	45.16	13,380	61.35	2,700	47.46	33,904	52.20
		ชาย	4,021	69.04	3,978	49.67	2,627	58.10	7,920	72.85	1,359	50.42	19,905	62.35
		หญิง	2,748	45.70	2,936	34.79	1,514	32.57	5,460	49.92	1,341	44.79	13,999	42.38
191	โรคตึงเนื้อของลำไส้ (K57) Diverticular disease of intestine	รวม	1,172	9.90	1,474	8.96	533	5.81	1,325	6.08	895	15.73	5,399	8.31
		ชาย	575	9.87	677	8.45	288	6.37	687	6.32	459	17.03	2,686	8.41
		หญิง	597	9.93	797	9.44	245	5.27	638	5.83	436	14.56	2,713	8.21
192	โรคอื่น ๆ ของลำไส้และเยื่อช่องท้อง (K52-K55, K58-K67) Other diseases of intestine and peritoneum	รวม	18,010	152.16	22,204	134.98	13,568	147.96	29,781	136.55	8,765	154.06	92,328	142.14
		ชาย	9,970	171.19	11,757	146.79	7,406	163.78	16,287	149.81	4,709	174.72	50,129	157.03
		หญิง	8,040	133.72	10,447	123.78	6,162	132.57	13,494	123.37	4,056	135.47	42,199	127.75
193	โรคตับเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ (K70) Alcoholic liver disease	รวม	11,079	93.60	12,946	78.70	3,349	36.52	18,214	83.51	3,539	62.20	49,127	75.63
		ชาย	8,903	152.87	9,509	118.72	2,928	64.75	14,588	134.18	2,889	107.19	38,817	121.60
		หญิง	2,176	36.19	3,437	40.72	421	9.06	3,626	33.15	650	21.71	10,310	31.21
194	โรคอื่น ๆ ของตับ (K71-K77) Other disease of liver	รวม	24,788	209.42	27,717	168.50	12,214	133.20	44,152	202.44	11,101	195.12	119,972	184.70
		ชาย	16,082	276.14	16,335	203.95	7,626	168.65	28,475	261.91	6,615	245.43	75,133	235.36
		หญิง	8,706	144.80	11,382	134.86	4,588	98.71	15,677	143.32	4,486	149.83	44,839	135.74
195	โรคนิ่วในระบบน้ำดีและถุงน้ำดีอักเสบ (K80-K81) Cholelithiasis and cholecystitis	รวม	10,274	86.80	11,448	69.60	4,502	49.10	22,372	102.58	5,443	95.67	54,039	83.19
		ชาย	4,094	70.30	4,485	56.00	1,608	35.56	9,207	84.68	2,295	85.15	21,689	67.94
		หญิง	6,180	102.79	6,963	82.50	2,894	62.26	13,165	120.36	3,148	105.14	32,350	97.93
196	ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันและโรคอื่น ๆ ของตับอ่อน (K85-K86) Acute pancreatitis and other disease of the pancreas	รวม	3,457	29.21	4,199	25.53	1,644	17.93	4,965	22.76	1,749	30.74	16,014	24.65
		ชาย	2,648	45.47	3,051	38.09	1,152	25.48	3,845	35.37	1,192	44.23	11,888	37.24
		หญิง	809	13.46	1,148	13.60	492	10.58	1,120	10.24	557	18.60	4,126	12.49

ตาราง 19 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2557 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค														
รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ภาคเหนือ		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.)		ภาคใต้		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพมหานคร		รวมทั้งประเทศ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
197	โรคอื่น ๆ ของระบบย่อยอาหาร (K82-K83, K87-K93) Other diseases of the digestive system	รวม	26,284	222.06	28,290	171.98	11,431	124.66	38,334	175.76	8,735	153.53	113,074	174.08
		ชาย	17,032	292.45	16,921	211.26	6,905	152.70	24,828	228.36	4,968	184.33	70,654	221.33
		หญิง	9,252	153.88	11,369	134.70	4,526	97.37	13,506	123.48	3,767	125.82	42,420	128.42
โรคของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (L00-L99)														
198	โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (L00-L08) Infection of the skin and subcutaneous tissue	รวม	22,703	191.81	28,925	175.84	21,070	229.77	51,433	235.82	5,648	99.27	129,779	199.80
		ชาย	13,020	223.56	15,419	192.51	11,835	261.73	29,660	272.81	2,950	109.45	72,884	228.32
		หญิง	9,683	161.05	13,506	160.02	9,235	198.68	21,773	199.05	2,698	90.11	56,895	172.24
199	โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (L10-L99) Other diseases of the skin and subcutaneous tissue	รวม	20,179	170.48	25,704	156.26	12,380	135.01	29,854	136.88	10,227	179.76	98,344	151.40
		ชาย	10,928	187.64	13,264	165.60	6,530	144.41	16,354	150.42	5,143	190.82	52,219	163.58
		หญิง	9,251	153.86	12,440	147.39	5,850	125.86	13,500	123.42	5,084	169.80	46,125	139.63
โรคระบบกล้ามเนื้อโครงร่างและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (M00-M99)														
200	ข้ออักเสบรูมาตอยและข้ออักเสบหลายข้อ (M05-M14) Rheumatoid arthritis and other inflammatory polyarthropathies	รวม	31,807	268.72	24,970	151.80	12,066	131.58	44,974	206.21	7,834	137.70	121,651	187.28
		ชาย	20,373	349.82	15,984	199.56	8,349	184.64	28,726	264.22	4,932	182.99	78,364	245.48
		หญิง	11,434	190.17	8,986	106.47	3,717	79.97	16,248	148.54	2,902	96.93	43,287	131.04
201	โรคข้อเสื่อม (M15-M19) Arthrosis	รวม	7,413	62.63	8,817	53.60	2,265	24.70	4,407	20.21	4,973	87.41	27,875	42.91
		ชาย	1,834	31.49	1,742	21.75	500	11.06	1,210	11.13	958	35.54	6,244	19.56
		หญิง	5,579	92.79	7,075	83.83	1,765	37.97	3,197	29.23	4,015	134.10	21,631	65.48
202	ความพิการของแขนขา (M20-M21) Acquired deformities of limbs	รวม	208	1.76	265	1.61	165	1.80	390	1.79	556	9.77	1,584	2.44
		ชาย	96	1.65	120	1.50	97	2.15	205	1.89	229	8.50	747	2.34
		หญิง	112	1.86	145	1.72	68	1.46	185	1.69	327	10.92	837	2.53
203	ความผิดปกติอื่น ๆ ของข้อ (M00-M03, M22-M25) Other disorders of joints	รวม	3,960	33.46	3,857	23.45	1,899	20.71	6,690	30.67	2,153	37.84	18,559	28.57
		ชาย	2,287	39.27	2,234	27.89	1,240	27.42	4,023	37.00	1,411	52.35	11,195	35.07
		หญิง	1,673	27.83	1,623	19.23	659	14.18	2,667	24.38	742	24.78	7,364	22.29
204	ความผิดปกติของระบบเนื้อเยื่อประสาน (M30-M36) Systemic connective tissue disorders	รวม	4,395	37.13	4,132	25.12	1,972	21.51	7,433	34.08	2,605	45.79	20,537	31.62
		ชาย	918	15.76	759	9.48	291	6.44	1,414	13.01	527	19.55	3,909	12.25
		หญิง	3,477	57.83	3,373	39.96	1,681	36.17	6,019	55.03	2,078	69.40	16,628	50.34
205	กระดูกสันหลังและหมอนรองกระดูกสันหลังอื่น ๆ ผิดปกติ (M50-M51) Cervical and other intervertebral disc disorders	รวม	1,876	15.85	1,396	8.49	909	9.91	2,652	12.16	887	15.59	7,720	11.89
		ชาย	858	14.73	692	8.64	493	10.90	1,418	13.04	463	17.18	3,924	12.29
		หญิง	1,018	16.93	704	8.34	416	8.95	1,234	11.28	424	14.16	3,796	11.49

ตาราง 19 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2557 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค														
รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ภาคเหนือ		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.)		ภาคใต้		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพมหานคร		รวมทั้งประเทศ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
206	พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ (M40-M49, M53-M54) Other dorsopathies	รวม	14,996	126.69	10,507	63.87	5,569	60.73	16,694	76.54	5,305	93.25	53,071	81.70
		ชาย	5,885	101.05	4,054	50.62	2,382	52.68	7,238	66.57	2,132	79.10	21,691	67.95
		หญิง	9,111	151.53	6,453	76.46	3,187	68.57	9,456	86.45	3,173	105.98	31,380	95.00
207	เนื้อเยื่อผิดปกติ (M60-M79) Soft tissue disorders	รวม	15,097	127.55	13,132	79.83	10,728	116.99	31,822	145.90	3,966	69.71	74,745	115.07
		ชาย	7,326	125.79	6,608	82.50	5,214	115.31	16,294	149.87	1,976	73.31	37,418	117.22
		หญิง	7,771	129.25	6,524	77.30	5,514	118.63	15,528	141.96	1,990	66.47	37,327	113.00
208	ความผิดปกติของความหนาแน่นของเนื้อกระดูก และ โครงสร้าง (M80-M85) Disorders of bone density and structure	รวม	3,392	28.66	2,571	15.63	1,423	15.52	4,008	18.38	1,842	32.38	13,236	20.38
		ชาย	943	16.19	792	9.89	516	11.41	1,282	11.79	596	22.11	4,129	12.93
		หญิง	2,449	40.73	1,779	21.08	907	19.51	2,726	24.92	1,246	41.62	9,107	27.57
209	กระดูกอักเสบ (M86) Osteomyelitis	รวม	1,728	14.60	2,031	12.35	945	10.31	3,290	15.08	685	12.04	8,679	13.36
		ชาย	1,106	18.99	1,241	15.49	576	12.74	2,000	18.40	435	16.14	5,358	16.78
		หญิง	622	10.35	790	9.36	369	7.94	1,290	11.79	250	8.35	3,321	10.05
210	โรคอื่น ๆ ของระบบกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อประสาน (M87-M99) Other diseases of the musculoskeletal system and connective tissue	รวม	2,242	18.94	2,544	15.47	1,596	17.40	3,397	15.58	1,363	23.96	11,142	17.15
		ชาย	1,105	18.97	1,170	14.61	796	17.60	1,799	16.55	666	24.71	5,536	17.34
		หญิง	1,137	18.91	1,374	16.28	800	17.21	1,598	14.61	697	23.28	5,606	16.97
โรคของระบบสืบพันธุ์และปัสสาวะ (N00-N99)														
211	กลุ่มอาการไตอักเสบเฉียบพลันและชนิดกำเริบเร็ว (N00-N01) Acute and rapidly progressive nephritic syndromes	รวม	455	3.84	637	3.87	933	10.17	1,265	5.80	214	3.76	3,504	5.39
		ชาย	250	4.29	371	4.63	550	12.16	735	6.76	129	4.79	2,035	6.37
		หญิง	205	3.41	266	3.15	383	8.24	530	4.85	85	2.84	1,469	4.45
212	โรคของหน่วยไตอื่น ๆ (N02-N08) Other glomerular diseases	รวม	5,255	44.40	5,554	33.76	5,117	55.80	14,598	66.93	4,016	70.59	34,540	53.18
		ชาย	2,139	36.73	2,223	27.75	2,251	49.78	5,487	50.47	1,704	63.22	13,804	43.24
		หญิง	3,116	51.83	3,331	39.47	2,866	61.66	9,111	83.30	2,312	77.22	20,736	62.77
213	โรคของท่อและเนื้อเยื่อระหว่างท่อในไต (N10-N16) Renal tubulo-interstitial diseases	รวม	20,432	172.62	19,861	120.74	12,283	133.95	34,150	156.58	6,024	105.88	92,750	142.79
		ชาย	7,907	135.77	6,007	75.00	3,764	83.24	13,054	120.07	2,078	77.10	32,810	102.78
		หญิง	12,525	208.32	13,854	164.15	8,519	183.28	21,096	192.87	3,946	131.79	59,940	181.46
214	ไตวาย (N17-N19) Renal failure	รวม	106,621	900.80	112,222	682.22	54,267	591.79	218,927	1,003.78	36,665	644.46	528,702	813.95
		ชาย	55,251	948.71	54,969	686.30	28,735	635.47	105,565	970.97	19,259	714.56	263,779	826.31
		หญิง	51,370	854.39	57,253	678.35	25,532	549.30	113,362	1,036.39	17,406	581.35	264,923	802.00

ตาราง 19 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2557 (ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ภาคเหนือ		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.)		ภาคใต้		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพมหานคร		รวมทั้งประเทศ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
215	นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ (N20-N23) Urolithiasis	รวม	15,108	127.64	6,244	37.96	6,634	72.34	23,272	106.70	2,036	35.79	53,294	82.05
		ชาย	9,979	171.35	3,565	44.51	3,798	83.99	14,515	133.51	1,140	42.30	32,997	103.37
		หญิง	5,129	85.31	2,679	31.74	2,836	61.01	8,757	80.06	896	29.93	20,297	61.44
216	กระเพาะปัสสาวะอักเสบ (N30) Cystitis	รวม	5,693	48.10	5,420	32.95	3,404	37.12	7,527	34.51	1,028	18.07	23,072	35.52
		ชาย	1,776	30.50	1,499	18.72	860	19.02	2,469	22.71	258	9.57	6,862	21.50
		หญิง	3,917	65.15	3,921	46.46	2,544	54.73	5,058	46.24	770	25.72	16,210	49.07
217	โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะ (N25-N29, N31-N39) Other diseases of the urinary system	รวม	42,352	357.81	50,063	304.34	21,247	231.70	54,968	252.03	17,244	303.10	185,874	286.16
		ชาย	17,796	305.57	18,465	230.54	8,290	183.33	23,358	214.84	6,824	253.19	74,733	234.11
		หญิง	24,556	408.42	31,598	374.38	12,957	278.76	31,610	288.99	10,420	348.02	111,141	336.46
218	ต่อมลูกหมากโตจากการเพิ่มจำนวนเซลล์ (N40) Hyperplasia of prostate	รวม	12,955	222.45	14,802	184.81	8,491	187.78	14,418	132.61	6,890	255.64	57,556	180.30
		ชาย	12,955	222.45	14,802	184.81	8,491	187.78	14,418	132.61	6,890	255.64	57,556	180.30
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
219	ความผิดปกติอื่น ๆ ของต่อมลูกหมาก (N41-N42) Other disorders of prostate	รวม	147	2.52	143	1.79	48	1.06	200	1.84	182	6.75	720	2.26
		ชาย	147	2.52	143	1.79	48	1.06	200	1.84	182	6.75	720	2.26
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
220	ถุงน้ำและถุงที่มีอสุจิที่อักเสบ (N43) Hydrocele and spermatocele	รวม	641	11.01	628	7.84	466	10.31	1,014	9.33	257	9.54	3,006	9.42
		ชาย	641	11.01	628	7.84	466	10.31	1,014	9.33	257	9.54	3,006	9.42
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
221	หนังหุ้มปลายองคชาตยาวเกินไป ปลายตีบรูเปิดไม่ได้หรือเปิดลำบาก (N47) Redundant prepuce, phimosis and paraphimosis	รวม	953	16.36	1,134	14.16	470	10.39	1,551	14.27	389	14.43	4,497	14.09
		ชาย	953	16.36	1,134	14.16	470	10.39	1,551	14.27	389	14.43	4,497	14.09
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
222	โรคอื่น ๆ ของอวัยวะสืบพันธุ์ชาย (N44-N46, N48-N51) Other disease of male genital organs	รวม	1,682	28.88	1,986	24.80	1,371	30.32	3,618	33.28	572	21.22	9,229	28.91
		ชาย	1,682	28.88	1,986	24.80	1,371	30.32	3,618	33.28	572	21.22	9,229	28.91
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
223	ความผิดปกติของเต้านม (N60-N64) Disorders of breast	รวม	1,465	12.38	1,372	8.34	1,353	14.75	2,559	11.73	670	11.78	7,419	11.42
		ชาย	93	1.60	98	1.22	96	2.12	179	1.65	45	1.67	511	1.60
		หญิง	1,372	22.82	1,274	15.09	1,257	27.04	2,380	21.76	625	20.87	6,908	20.91
224	ปีกมดลูกและรังไข่อักเสบ (N70) Salpingitis and oophoritis	รวม	349	5.80	492	5.83	237	5.10	758	6.93	299	9.99	2,135	6.46
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	349	5.80	492	5.83	237	5.10	758	6.93	299	9.99	2,135	6.46

ตาราง 19 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2557 (ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ภาคเหนือ		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.)		ภาคใต้		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพมหานคร		หน่วยนับ : รายโรค รวมทั้งประเทศ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
225	ปากมดลูกอักเสบ (N72) Inflammatory disease of cervix uteri	รวม	115	1.91	102	1.21	106	2.28	180	1.65	205	6.85	708	2.14
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	115	1.91	102	1.21	106	2.28	180	1.65	205	6.85	708	2.14
226	การอักเสบอื่น ๆ ของอวัยวะในอุ้งเชิงกรานสตรี (N71, N73-N77) Other inflammatory diseases of female pelvic organs	รวม	2,992	49.76	3,832	45.40	2,686	57.79	5,893	53.88	1,573	52.54	16,976	51.39
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	2,992	49.76	3,832	45.40	2,686	57.79	5,893	53.88	1,573	52.54	16,976	51.39
227	เยื่อบุมดลูกอักเสบ (N80) Endometriosis	รวม	1,549	25.76	1,629	19.30	1,367	29.41	3,449	31.53	2,288	76.42	10,282	31.13
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	1,549	25.76	1,629	19.30	1,367	29.41	3,449	31.53	2,288	76.42	10,282	31.13
228	การหย่อนตัวของอวัยวะสืบพันธุ์สตรี (N81) Female genital prolapse	รวม	964	16.03	808	9.57	478	10.28	1,715	15.68	561	18.74	4,526	13.70
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	964	16.03	808	9.57	478	10.28	1,715	15.68	561	18.74	4,526	13.70
229	ความผิดปกติอื่นที่ไม่ใช่การอักเสบของรังไข่ท่อนำไข่และเอ็นยึดมดลูก (N83) Noninflammatory disorder of ovary, fallopian tube and broad ligament	รวม	1,245	20.71	1,638	19.41	1,075	23.13	2,524	23.08	866	28.92	7,348	22.24
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	1,245	20.71	1,638	19.41	1,075	23.13	2,524	23.08	866	28.92	7,348	22.24
230	ความผิดปกติของระดู (N91-N92) Disorder of menstruation	รวม	1,391	23.14	1,893	22.43	1,695	36.47	3,041	27.80	471	15.73	8,491	25.70
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	1,391	23.14	1,893	22.43	1,695	36.47	3,041	27.80	471	15.73	8,491	25.70
231	การหมดประจำเดือนและความผิดปกติอื่นในระยะหมดประจำเดือน (N95) Menopausal and other perimenopausal disorders	รวม	708	11.78	779	9.23	645	13.88	1,112	10.17	234	7.82	3,478	10.53
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	708	11.78	779	9.23	645	13.88	1,112	10.17	234	7.82	3,478	10.53
232	ภาวะมีบุตรยากในสตรี (N97) Female infertility	รวม	45	0.75	16	0.19	47	1.01	73	0.67	53	1.77	234	0.71
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	45	0.75	16	0.19	47	1.01	73	0.67	53	1.77	234	0.71
233	ความผิดปกติอื่น ๆ ของท่อนำไข่และอวัยวะสืบพันธุ์ (N82, N84-N90, N93-N94, N96, N98-N99) Other disorders of genitourinary tract	รวม	4,104	68.26	3,952	46.82	3,443	74.07	6,943	63.47	1,992	66.53	20,434	61.86
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	4,104	68.26	3,952	46.82	3,443	74.07	6,943	63.47	1,992	66.53	20,434	61.86

ตาราง 19 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2557 (ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ภาคเหนือ		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.)		ภาคใต้		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพมหานคร		หน่วยนับ : รายโรค รวมทั้งประเทศ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
การตั้งครรภ์ การคลอดและระยะหลังคลอด (O00-O99)														
234	แท้งเอง (O03) Spontaneous abortion	รวม	1,635	27.19	3,117	36.93	3,347	72.01	4,592	41.98	1,034	34.54	13,725	41.55
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	1,635	27.19	3,117	36.93	3,347	72.01	4,592	41.98	1,034	34.54	13,725	41.55
235	การทำแท้งโดยเหตุผลทางการแพทย์ (O04) Medical abortion	รวม	295	4.91	212	2.51	164	3.53	773	7.07	92	3.07	1,536	4.65
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	295	4.91	212	2.51	164	3.53	773	7.07	92	3.07	1,536	4.65
236	การตั้งครรภ์อื่น ๆ ที่สิ้นสุดโดยการแท้ง (O00-O02, O05-O08) Other pregnancies with abortive outcome	รวม	4,438	73.81	5,471	64.82	6,775	145.76	8,241	75.34	1,539	51.40	26,464	80.11
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	4,438	73.81	5,471	64.82	6,775	145.76	8,241	75.34	1,539	51.40	26,464	80.11
237	การบวม การมีโปรตีนในปัสสาวะ และความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ระยะคลอด และระยะหลังคลอด (O10-O16) Oedema, proteinuria and hypertensive disorders in pregnancy, childbirth and the puerperium	รวม	2,746	45.67	4,676	55.40	4,791	103.07	6,413	58.63	1,215	40.58	19,841	60.06
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	2,746	45.67	4,676	55.40	4,791	103.07	6,413	58.63	1,215	40.58	19,841	60.06
238	รกเกาะต่ำ รกลอกตัวก่อนกำหนด และตกเลือดก่อนคลอด (O44-O46) Placenta praevia, premature separation of placenta and antepartum haemorrhage	รวม	841	13.99	1,154	13.67	1,361	29.28	1,828	16.71	270	9.02	5,454	16.51
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	841	13.99	1,154	13.67	1,361	29.28	1,828	16.71	270	9.02	5,454	16.51
239	การดูแล มารดาอื่นๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ์ และถุงน้ำคร่ำ และปัญหาที่อาจจะเกิดได้ในระยะคลอด (O30-O43, O47-O48) Other maternal care related to fetus and amniotic cavity and possible delivery problems	รวม	20,552	341.82	26,665	315.94	31,123	669.58	40,615	371.31	7,745	258.68	126,700	383.56
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	20,552	341.82	26,665	315.94	31,123	669.58	40,615	371.31	7,745	258.68	126,700	383.56
240	การคลอดติดขัด (O64-O66) Obstructed labour	รวม	3,973	66.08	4,855	57.52	5,160	111.01	10,926	99.89	1,395	46.59	26,309	79.65
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	3,973	66.08	4,855	57.52	5,160	111.01	10,926	99.89	1,395	46.59	26,309	79.65
241	ตกเลือดหลังคลอด (O72) Postpartum haemorrhage	รวม	1,690	28.11	2,073	24.56	2,281	49.07	3,196	29.22	405	13.53	9,645	29.20
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	1,690	28.11	2,073	24.56	2,281	49.07	3,196	29.22	405	13.53	9,645	29.20

ตาราง 19 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรค ระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2557 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค														
รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ภาคเหนือ		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.)		ภาคใต้		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพมหานคร		รวมทั้งประเทศ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
242	ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆของการตั้งครรภ์ และการคลอด (O20-O29, O60-O63, O67-O71, O73-O75, O81-O84) Other complications of pregnancy and delivery	รวม	39,137	650.93	53,950	639.22	65,579	1,410.87	83,208	760.71	15,613	521.47	257,487	779.49
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	39,137	650.93	53,950	639.22	65,579	1,410.87	83,208	760.71	15,613	521.47	257,487	779.49
243	การคลอดของครรภ์เดียว (O80) Single spontaneous delivery	รวม	34,833	579.35	48,621	576.08	52,396	1,127.25	80,654	737.36	9,423	314.72	225,927	683.95
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	34,833	579.35	48,621	576.08	52,396	1,127.25	80,654	737.36	9,423	314.72	225,927	683.95
244	ภาวะแทรกซ้อนที่ส่วนใหญ่พบในระยะหลังคลอด และภาวะทางสูติกรรมอื่น ๆ ที่มีได้ระบุรายละเอียด (O85-O99) Complications predominantly related to the puerperium and other obstetric conditions, not Elsewhere classified	รวม	7,463	124.13	10,691	126.67	14,978	322.24	18,009	164.64	4,472	149.36	55,613	168.36
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	7,463	124.13	10,691	126.67	14,978	322.24	18,009	164.64	4,472	149.36	55,613	168.36
ภาวะบางอย่างที่เกิดในระยะปริกำเนิด (P00-P96)														
245	ทารกในครรภ์และแรกเกิดที่ได้รับผลจากปัจจัยทาง มารดา และโรคแทรกในระยะตั้งครรภ์ เจ็บครรภ์ และคลอด (P00-P04) Fetus and newborn affected by maternal factors and by complications of pregnancy, labor and delivery	รวม	2,770	23.40	3,498	21.27	6,426	70.08	13,884	63.66	2,344	41.20	28,922	44.53
		ชาย	1,434	24.62	1,787	22.31	3,516	77.76	7,390	67.97	1,213	45.01	15,340	48.05
		หญิง	1,336	22.22	1,711	20.27	2,910	62.61	6,494	59.37	1,131	37.77	13,582	41.12
246	ทารกในครรภ์โตช้าทารกในครรภ์ขาดสารอาหาร และความผิดปกติเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ระยะสั้นและ น้ำหนักแรกเกิดน้อย (P05-P07) Slow fetal growth, fetal malnutrition and disorders related to short gestation and low birth weight	รวม	8,913	75.30	16,275	98.94	11,162	121.72	19,724	90.43	7,650	134.46	63,724	98.10
		ชาย	4,291	73.68	7,978	99.61	5,572	123.22	9,705	89.26	3,854	142.99	31,400	98.36
		หญิง	4,622	76.87	8,297	98.31	5,590	120.26	10,019	91.60	3,796	126.78	32,324	97.85
247	บาดเจ็บจากการคลอด (P10-P15) Birth trauma	รวม	1,036	8.75	1,940	11.79	891	9.72	2,447	11.22	1,508	26.51	7,822	12.04
		ชาย	605	10.39	1,122	14.01	524	11.59	1,434	13.19	896	33.24	4,581	14.35
		หญิง	431	7.17	818	9.69	367	7.90	1,013	9.26	612	20.44	3,241	9.81
248	ขาดออกซิเจนขณะอยู่ในโพรงมดลูก และภาวะ แอสฟิกเซียเมื่อแรกเกิด (P20-P21) Intrauterine hypoxia and birth asphyxia	รวม	1,584	13.38	3,087	18.77	1,828	19.93	5,011	22.98	2,220	39.02	13,730	21.14
		ชาย	856	14.70	1,712	21.37	1,049	23.20	2,793	25.69	1,231	45.67	7,641	23.94
		หญิง	728	12.11	1,375	16.29	779	16.76	2,218	20.28	989	33.03	6,089	18.43

ตาราง 19 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2557 (ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ภาคเหนือ		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.)		ภาคใต้		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพมหานคร		หน่วยนับ : รายโรค	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
249	ภาวะหายใจผิดปกติอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด (P22-P28) Other respiratory disorders originating in the perinatal period	รวม	6,828	57.69	16,055	97.60	11,395	124.26	18,827	86.32	6,892	121.14	59,997	92.37
		ชาย	3,949	67.81	9,452	118.01	6,933	153.32	11,479	105.58	4,037	149.78	35,850	112.30
		หญิง	2,879	47.88	6,603	78.23	4,462	96.00	7,348	67.18	2,855	95.36	24,147	73.10
250	การติดเชื้อแต่กำเนิดและโรคปรสิต (P35-P37) Congenital infectious and parasitic diseases	รวม	3,180	26.87	7,141	43.41	4,452	48.55	9,416	43.17	2,662	46.79	26,851	41.34
		ชาย	1,753	30.10	3,846	48.02	2,443	54.03	5,128	47.17	1,457	54.06	14,627	45.82
		หญิง	1,427	23.73	3,295	39.04	2,009	43.22	4,288	39.20	1,205	40.25	12,224	37.01
251	การติดเชื้อเฉพาะอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด (P38-P39) Other infections specific to the perinatal period	รวม	833	7.04	1,627	9.89	915	9.98	1,458	6.68	421	7.40	5,254	8.09
		ชาย	457	7.85	959	11.97	492	10.88	846	7.78	220	8.16	2,974	9.32
		หญิง	376	6.25	668	7.91	423	9.10	612	5.60	201	6.71	2,280	6.90
252	โรคเม็ดเลือดแดงของทารกในครรภ์และแรกเกิด (P55) Haemolytic disease of fetus and newborn	รวม	724	6.12	2,178	13.24	1,014	11.06	2,541	11.65	800	14.06	7,257	11.17
		ชาย	359	6.16	1,110	13.86	515	11.39	1,304	11.99	405	15.03	3,693	11.57
		หญิง	365	6.07	1,068	12.65	499	10.74	1,237	11.31	395	13.19	3,564	10.79
253	ภาวะอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด (P08, P29, P50-P54, P56-P96) Other conditions originating in the perinatal period	รวม	34,608	292.39	56,357	342.61	31,912	348.01	85,211	390.69	24,591	432.23	232,679	358.21
		ชาย	18,901	324.55	30,857	385.26	17,760	392.76	46,452	427.26	13,526	501.85	127,496	399.39
		หญิง	15,707	261.24	25,500	302.13	14,152	304.47	38,759	354.35	11,065	369.57	105,183	318.42
ความผิดปกติ ความพิการแต่กำเนิด และโครโมโซมผิดปกติ (Q00-Q99)														
254	กระดูกสันหลังแยก (Q05) Spina blfida	รวม	102	0.86	70	0.43	66	0.72	139	0.64	189	3.32	566	0.87
		ชาย	54	0.93	35	0.44	29	0.64	67	0.62	85	3.15	270	0.85
		หญิง	48	0.80	35	0.41	37	0.80	72	0.66	104	3.47	296	0.90
255	ความผิดปกติอื่น ๆ แต่กำเนิดของระบบประสาท (Q00-Q04, Q06-Q07) Other congenital malformations of the nervous system	รวม	455	3.84	656	3.99	399	4.35	751	3.44	733	12.88	2,994	4.61
		ชาย	262	4.50	326	4.07	208	4.60	407	3.74	396	14.69	1,599	5.01
		หญิง	193	3.21	330	3.91	191	4.11	344	3.14	337	11.26	1,395	4.22
256	ความผิดปกติแต่กำเนิดของระบบไหลเวียนโลหิต (Q20-Q28) Congenital malformation of the circulatory system	รวม	4,328	36.57	5,055	30.73	3,727	40.64	7,506	34.41	8,165	143.52	28,781	44.31
		ชาย	2,170	37.26	2,522	31.49	1,814	40.12	3,676	33.81	4,262	158.13	14,444	45.25
		หญิง	2,158	35.89	2,533	30.01	1,913	41.16	3,830	35.01	3,903	130.36	14,337	43.40
257	ปากแหว่งและเพดานโหว่ (Q35-Q37) Cleft lip and cleft palate	รวม	541	4.57	845	5.14	782	8.53	1,548	7.10	625	10.99	4,341	6.68
		ชาย	305	5.24	423	5.28	383	8.47	865	7.96	323	11.98	2,299	7.20
		หญิง	236	3.93	422	5.00	399	8.58	683	6.24	302	10.09	2,042	6.18

ตาราง 19 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2557 (ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ภาคเหนือ		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.)		ภาคใต้		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพมหานคร		หน่วยนับ : รายโรค รวมทั้งประเทศ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
258	ลำไส้เล็กไม่มี ตันและติบ (Q41)	รวม	35	0.30	69	0.42	57	0.62	87	0.40	84	1.48	332	0.51
	Absence, atresia and stenosis of small intestine	ชาย	13	0.22	36	0.45	18	0.40	43	0.40	39	1.45	149	0.47
		หญิง	22	0.37	33	0.39	39	0.84	44	0.40	45	1.50	183	0.55
259	ความผิดปกติแต่กำเนิดอื่น ๆ ของระบบย่อยอาหาร (Q38-Q40, Q42-Q45)	รวม	2,409	20.35	5,901	35.87	2,003	21.84	4,465	20.47	6,673	117.29	21,451	33.02
	Other congenital malformations of the digestive system	ชาย	1,485	25.50	3,558	44.42	1,195	26.43	2,741	25.21	3,823	141.84	12,802	40.10
		หญิง	924	15.37	2,343	27.76	808	17.38	1,724	15.76	2,850	95.19	8,649	26.18
260	อัณฑะไม่ลงถุง (Q53)	รวม	299	5.13	478	5.97	329	7.28	574	5.28	474	17.59	2,154	6.75
	Undescended testicle	ชาย	299	5.13	478	5.97	329	7.28	574	5.28	474	17.59	2,154	6.75
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
261	ความผิดปกติอื่น ๆ ของระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ (Q50-Q52, Q54-Q64)	รวม	639	5.40	617	3.75	590	6.43	1,027	4.71	1,449	25.47	4,322	6.65
	Other malformations of the genitourinary system	ชาย	385	6.61	361	4.51	380	8.40	667	6.13	1,004	37.25	2,797	8.76
		หญิง	254	4.22	256	3.03	210	4.52	360	3.29	445	14.86	1,525	4.62
262	ความพิการแต่กำเนิดของสะโพก (Q65)	รวม	28	0.24	27	0.16	16	0.17	84	0.39	111	1.95	266	0.41
	Congenital deformities of hip	ชาย	4	0.07	14	0.17	8	0.18	28	0.26	40	1.48	94	0.29
		หญิง	24	0.40	13	0.15	8	0.17	56	0.51	71	2.37	172	0.52
263	ความพิการแต่กำเนิดของเท้า (Q66)	รวม	272	2.30	500	3.04	479	5.22	698	3.20	476	8.37	2,425	3.73
	Congenital deformities of feet	ชาย	134	2.30	256	3.20	261	5.77	357	3.28	265	9.83	1,273	3.99
		หญิง	138	2.30	244	2.89	218	4.69	341	3.12	211	7.05	1,152	3.49
264	ความผิดปกติและความพิการแต่กำเนิดอื่น ๆ ของระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง (Q67-Q79)	รวม	691	5.84	884	5.37	662	7.22	1,420	6.51	1,461	25.68	5,118	7.88
	Other congenital malformations and deformations of the musculoskeletal system	ชาย	385	6.61	535	6.68	362	8.01	774	7.12	805	29.87	2,861	8.96
		หญิง	306	5.09	349	4.14	300	6.45	646	5.91	656	21.91	2,257	6.83
265	ความผิดปกติแต่กำเนิดอื่น ๆ	รวม	1,163	9.83	1,383	8.41	1,123	12.25	2,278	10.44	2,980	52.38	8,927	13.74
	Other congenital malformations	ชาย	608	10.44	720	8.99	590	13.05	1,201	11.05	1,588	58.92	4,707	14.75
	(Q10-Q18, Q30-Q34, Q80-Q89)	หญิง	555	9.23	663	7.86	533	11.47	1,077	9.85	1,392	46.49	4,220	12.78
266	ความผิดปกติของโครโมโซมที่มีได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น (Q90-Q99)	รวม	902	7.62	1,123	6.83	790	8.62	1,715	7.86	949	16.68	5,479	8.44
	Chromosomal abnormalities, not Elsewhere classified	ชาย	508	8.72	580	7.24	429	9.49	888	8.17	496	18.40	2,901	9.09
		หญิง	394	6.55	543	6.43	361	7.77	827	7.56	453	15.13	2,578	7.80

ตาราง 19 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2557 (ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	หน่วยนับ : รายโรค											
			ภาคเหนือ		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.)		ภาคใต้		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพมหานคร		รวมทั้งประเทศ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจทั้งคลินิกและตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ไม่ได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น (R00-R99)														
267	ปวดท้องและปวดอุ้งเชิงกราน (R10) Abdominal and pelvic pain	รวม	6,900	58.30	5,476	33.29	4,976	54.26	8,235	37.76	899	15.80	26,486	40.78
		ชาย	2,864	49.18	2,131	26.61	1,849	40.89	3,277	30.14	295	10.95	10,416	32.63
		หญิง	4,036	67.13	3,345	39.63	3,127	67.27	4,958	45.33	604	20.17	16,070	48.65
268	ไข้ไม่ทราบสาเหตุ (R50) Fever of unknown origin	รวม	14,532	122.77	11,487	69.83	9,143	99.71	24,390	111.83	3,846	67.60	63,398	97.60
		ชาย	7,914	135.89	5,958	74.39	4,676	103.41	12,694	116.76	1,980	73.46	33,222	104.07
		หญิง	6,618	110.07	5,529	65.51	4,467	96.10	11,696	106.93	1,866	62.32	30,176	91.35
269	ชราภาพ (R54) Senility	รวม	1,140	9.63	1,023	6.22	240	2.62	1,015	4.65	100	1.76	3,518	5.42
		ชาย	484	8.31	360	4.49	96	2.12	460	4.23	37	1.37	1,437	4.50
		หญิง	656	10.91	663	7.86	144	3.10	555	5.07	63	2.10	2,081	6.30
270	อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจทางคลินิกและตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ไม่ได้มีรหัสระบุไว้ (R00-R09, R11-R49, R51-R53, R55-R99) Other symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not Elsewhere classified	รวม	123,849	1,046.35	136,756	831.37	99,018	1,079.81	243,563	1,116.73	38,691	680.07	641,877	988.18
		ชาย	64,619	1,109.56	68,622	856.76	48,037	1,062.33	126,447	1,163.04	20,313	753.67	328,038	1,027.61
		หญิง	59,230	985.12	68,134	807.28	50,981	1,096.81	117,116	1,070.71	18,378	613.82	313,839	950.08
การบาดเจ็บ การเป็นพิษและผลติดตามจากเหตุภายนอก (S00-T98)														
271	กระดูกแตกหักบริเวณกะโหลกศีรษะและกระดูกหน้า (S02) Fracture of skull and facial bones	รวม	5,833	49.28	7,704	46.83	4,599	50.15	9,374	42.98	2,162	38.00	29,672	45.68
		ชาย	4,750	81.56	6,205	77.47	3,507	77.56	7,695	70.78	1,841	68.31	23,998	75.18
		หญิง	1,083	18.01	1,499	17.76	1,092	23.49	1,679	15.35	321	10.72	5,674	17.18
272	กระดูกคอ กระดูกซี่โครง หรือกระดูกเชิงกรานหัก (S12, S22, S32, T08) Fracture of neck, thorax and pelvis	รวม	6,644	56.13	6,298	38.29	3,656	39.87	7,111	32.60	1,839	32.32	25,548	39.33
		ชาย	4,529	77.77	4,273	53.35	2,416	53.43	4,878	44.87	1,226	45.49	17,322	54.26
		หญิง	2,115	35.18	2,025	23.99	1,240	26.68	2,233	20.41	613	20.47	8,226	24.90
273	กระดูกต้นขา แตก หัก ร้าว (S72) Fracture of femur	รวม	8,002	67.61	8,517	51.78	3,911	42.65	7,756	35.56	2,887	50.74	31,073	47.84
		ชาย	3,284	56.39	3,828	47.79	1,985	43.90	3,695	33.99	1,181	43.82	13,973	43.77
		หญิง	4,718	78.47	4,689	55.56	1,926	41.44	4,061	37.13	1,706	56.98	17,100	51.77
274	กระดูกแตกหักของแขนขาอื่น ๆ (S42, S52, S62, S82, S92, T10, T12) Fracture of other limb bones	รวม	24,424	206.35	25,450	154.72	15,024	163.84	36,476	167.24	6,475	113.81	107,849	166.04
		ชาย	16,458	282.60	17,473	218.15	10,313	228.07	25,588	235.35	4,671	173.31	74,503	233.39
		หญิง	7,966	132.49	7,977	94.51	4,711	101.35	10,888	99.54	1,804	60.25	33,346	100.95
275	กระดูกแตกหักหลายบริเวณในร่างกาย (T02) Fracture involving multiple body regions	รวม	7	0.06	12	0.07	61	0.67	42	0.19	1	0.02	123	0.19
		ชาย	5	0.09	9	0.11	45	1.00	35	0.32	1	0.04	95	0.30
		หญิง	2	0.03	3	0.04	16	0.34	7	0.06	0	0.00	28	0.08

ตาราง 19 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2557 (ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ภาคเหนือ		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.)		ภาคใต้		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพมหานคร		หน่วยนับ : รายโรค รวมทั้งประเทศ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
283	แผลถูกความร้อนและถูกสารกัดกร่อน (T20-T32) Burns and corrosions	รวม	3,853	32.55	4,851	29.49	3,019	32.92	7,788	35.71	1,202	21.13	20,713	31.89
		ชาย	2,679	46.00	3,155	39.39	1,958	43.30	5,178	47.63	756	28.05	13,726	43.00
		หญิง	1,174	19.53	1,696	20.09	1,061	22.83	2,610	23.86	446	14.90	6,987	21.15
284	การเป็นพิษจากยา เครื่องยาและชีววัตถุ (T36-T50) Poisoning by drugs and biological substances	รวม	5,900	49.85	7,214	43.86	3,806	41.51	10,137	46.48	1,498	26.33	28,555	43.96
		ชาย	2,515	43.18	2,841	35.47	1,613	35.67	4,563	41.97	659	24.45	12,191	38.19
		หญิง	3,385	56.30	4,373	51.81	2,193	47.18	5,574	50.96	839	28.02	16,364	49.54
285	การเป็นพิษจากสารที่โดยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ใช้ เป็นยา (T51-T65) Toxic effects of substances chiefly nonmedicinal as to source	รวม	8,864	74.89	12,048	73.24	9,409	102.61	13,979	64.09	879	15.45	45,179	69.55
		ชาย	5,347	91.81	6,902	86.17	5,594	123.71	8,072	74.24	445	16.51	26,360	82.58
		หญิง	3,517	58.50	5,146	60.97	3,815	82.08	5,907	54.00	434	14.50	18,819	56.97
286	กลุ่มอาการจากการทารุณ (T74) Maltreatment syndromes	รวม	62	0.52	64	0.39	57	0.62	161	0.74	50	0.88	394	0.61
		ชาย	8	0.14	23	0.29	14	0.31	15	0.14	13	0.48	73	0.23
		หญิง	54	0.90	41	0.49	43	0.93	146	1.33	37	1.24	321	0.97
287	อื่น ๆ และที่มีได้ระบุผลของสาเหตุภายนอก (T33-T35, T66-T73, T75-T78) Other and unspecified effects of external causes	รวม	5,035	42.54	7,320	44.50	4,646	50.67	9,465	43.40	802	14.10	27,268	41.98
		ชาย	2,888	49.59	4,199	52.43	2,597	57.43	5,454	50.16	457	16.96	15,595	48.85
		หญิง	2,147	35.71	3,121	36.98	2,049	44.08	4,011	36.67	345	11.52	11,673	35.34
288	ภาวะแทรกซ้อนระยะแรกของการบาดเจ็บบางชนิด และภาวะแทรกซ้อนของการรักษาทางศัลยกรรม และอายุรกรรมที่มีได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น (T79-T88) Certain early complications of trauma and complications of surgical and medical care, note Elsewhere classified	รวม	20,287	171.40	21,587	131.23	12,589	137.29	36,811	168.78	13,066	229.66	104,340	160.63
		ชาย	12,031	206.58	12,086	150.90	7,456	164.89	21,662	199.24	6,811	252.71	60,046	188.10
		หญิง	8,256	137.31	9,501	112.57	5,133	110.43	15,149	138.50	6,255	208.91	44,294	134.09
289	ผลระยะล่าของการบาดเจ็บ การเป็นพิษและผลที่ตาม มาจากสาเหตุภายนอกอื่น ๆ (T90-T98) Sequela of injuries, of poisoning and of other consequences of external causes	รวม	414	3.50	485	2.95	215	2.34	411	1.88	268	4.71	1,793	2.76
		ชาย	309	5.31	333	4.16	153	3.38	304	2.80	188	6.98	1,287	4.03
		หญิง	105	1.75	152	1.80	62	1.33	107	0.98	80	2.67	506	1.53
ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อสถานะสุขภาพและการเข้ารับบริการสุขภาพ (Z00-Z99)														
290	บุคคลขอรับบริการเพื่อการตรวจและชันสูตร (Z00-Z13) Persons encountering health services for examination and investigation	รวม	13,069	110.41	8,087	49.16	10,733	117.05	5,227	23.97	3,185	55.98	40,301	62.04
		ชาย	5,387	92.50	3,619	45.18	3,741	82.73	2,321	21.35	1,540	57.14	16,608	52.03
		หญิง	7,682	127.77	4,468	52.94	6,992	150.43	2,906	26.57	1,645	54.94	23,693	71.73

ตาราง 19 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2557 (ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ภาคเหนือ		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.)		ภาคใต้		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพมหานคร		รวมทั้งประเทศ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
291	การติดเชื้อไวรัสโดยไม่มีอาการ (Z21)	รวม	327	2.76	659	4.01	409	4.46	420	1.93	283	4.97	2,098	3.23
	Asymptomatic human immunodeficiency	ชาย	145	2.49	296	3.70	210	4.64	177	1.63	150	5.57	978	3.06
	virus (HIV) infection status	หญิง	182	3.03	363	4.30	199	4.28	243	2.22	133	4.44	1,120	3.39
292	บุคคลที่มีอาการที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพที่	รวม	14,578	123.16	20,862	126.82	29,926	326.35	40,601	186.15	5,347	93.98	111,314	171.37
	เกี่ยวข้องกับโรคติดต่อ (Z20, Z22-Z29)	ชาย	7,383	126.77	10,468	130.70	15,629	345.63	20,758	190.93	2,737	101.55	56,975	178.48
	Other persons with potential health hazards	หญิง	7,195	119.67	10,394	123.15	14,297	307.59	19,843	181.41	2,610	87.17	54,339	164.50
293	การรับบริการคุมกำเนิด (Z30)	รวม	8,039	67.92	11,122	67.61	5,459	59.53	16,336	74.90	3,651	64.17	44,607	68.67
	Contraceptive management	ชาย	9	0.15	9	0.11	8	0.18	14	0.13	5	0.19	45	0.14
		หญิง	8,030	133.56	11,113	131.67	5,451	117.27	16,322	149.22	3,646	121.77	44,562	134.90
294	การตรวจคัดกรองก่อนการคลอด และการให้คำแนะนำ	รวม	1,384	23.02	2,400	28.44	3,141	67.58	6,863	62.74	1,702	56.85	15,490	46.89
	เกี่ยวกับการตั้งครรภ์อื่น ๆ (Z34-Z36)	ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	Antenatal screening and other supervision	หญิง	1,384	23.02	2,400	28.44	3,141	67.58	6,863	62.74	1,702	56.85	15,490	46.89
295	การเกิดของทารกตามสถานที่เกิด (Z38)	รวม	77,623	655.80	138,964	844.79	104,208	1,136.41	176,982	811.46	42,557	748.02	540,334	831.85
	Liveborn infants according to place of birth	ชาย	39,996	686.77	71,799	896.43	54,214	1,198.93	91,025	837.23	22,100	819.97	279,134	874.41
		หญิง	37,627	625.82	67,165	795.80	49,994	1,075.58	85,957	785.84	20,457	683.26	261,200	790.73
296	การดูแลและการตรวจหลังคลอด (Z39)	รวม	294	4.89	325	3.85	424	9.12	718	6.56	35	1.17	1,796	5.44
	Postpartum care and examination	ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	294	4.89	325	3.85	424	9.12	718	6.56	35	1.17	1,796	5.44
297	บุคคลขอรับบริการสุขภาพ เพื่อหัตถการหรือการ	รวม	53,532	452.27	49,669	301.95	22,876	249.47	70,310	322.37	42,186	741.50	238,573	367.29
	บริการสุขภาพที่ระบุเฉพาะ (Z40-Z54, Z40-Z54)	ชาย	26,276	451.18	25,440	317.62	12,531	277.12	34,532	317.62	19,766	733.37	118,545	371.35
	Persons encountering health services	หญิง	27,256	453.32	24,229	287.07	10,345	222.56	35,778	327.09	22,420	748.82	120,028	363.36
298	บุคคลขอรับบริการสุขภาพด้วยเหตุผลอื่น (Z31-Z33,	รวม	68,135	575.64	91,688	557.39	88,127	961.04	143,049	655.88	37,305	655.71	428,304	659.38
	Z37, Z55-Z99)	ชาย	8,155	140.03	8,875	110.81	3,097	68.49	13,154	120.99	10,398	385.79	43,679	136.83
	Persons encountering health services for	หญิง	59,980	997.59	82,813	981.20	85,030	1,829.35	129,895	1,187.53	26,907	898.68	384,625	1,164.37
	other reasons													

*ไม่รวมไวรัสที่นำโดยแมลงและไขเลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่น ๆ (A90-A94, A96-A99) โรคในกลุ่มนี้ของประเทศไทย คือ โรคไขเลือดออก

รวมรวม / วิเคราะห์ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน สวัสดิการรักษายานบาลข้าราชการและครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สภส.)

ตาราง 20 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก)
จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
พ.ศ.2557



ตาราง 20 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2557

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ภาคเหนือ		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.)		ภาคใต้		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพมหานคร		หน่วยนับ : ราย	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
	รวมทุกกลุ่มโรค	รวม	1,144,168	9,666.60	1,335,376	8,118.06	918,186	10,012.97	2,072,833	9,503.90	400,145	7,033.33	5,870,708	9,038.07
		ชาย	554,598	9,522.92	625,220	7,806.01	414,407	9,164.54	983,765	9,048.51	191,228	7,095.08	2,769,218	8,674.82
		หญิง	589,570	9,805.77	710,156	8,414.19	503,779	10,838.36	1,089,068	9,956.55	208,917	6,977.74	3,101,490	9,389.12
กลุ่มโรคติดเชื้อและปรสิตบางชนิด (A00 - B99)														
001	อหิวาตกโรค (A00) Cholera	รวม	12	0.10	27	0.16	16	0.17	26	0.12	6	0.11	87	0.13
		ชาย	4	0.07	12	0.15	9	0.20	10	0.09	4	0.15	39	0.12
		หญิง	8	0.13	15	0.18	7	0.15	16	0.15	2	0.07	48	0.15
002	ไข้รากสาดน้อยและไข้รากสาดเทียม (A01) Typhoid and paratyphoid fever	รวม	364	3.08	179	1.09	2,224	24.25	464	2.13	32	0.56	3,263	5.02
		ชาย	225	3.86	86	1.07	1,144	25.30	244	2.24	24	0.89	1,723	5.40
		หญิง	139	2.31	93	1.10	1,080	23.24	220	2.01	8	0.27	1,540	4.66
003	โรคบิดจากเชื้อซีเกลลา (A03) Shigellosis	รวม	30	0.25	33	0.20	18	0.20	18	0.08	7	0.12	106	0.16
		ชาย	18	0.31	20	0.25	8	0.18	10	0.09	3	0.11	59	0.18
		หญิง	12	0.20	13	0.15	10	0.22	8	0.07	4	0.13	47	0.14
004	โรคบิดมีตัว (A06) Amoebiasis	รวม	823	6.95	341	2.07	750	8.18	333	1.53	16	0.28	2,263	3.48
		ชาย	399	6.85	161	2.01	354	7.83	139	1.28	10	0.37	1,063	3.33
		หญิง	424	7.05	180	2.13	396	8.52	194	1.77	6	0.20	1,200	3.63
005	อาการท้องร่วงกระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ (A09) Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin	รวม	53,862	455.06	64,560	392.48	50,203	547.47	117,771	539.98	9,301	163.48	295,697	455.23
		ชาย	25,134	431.57	29,393	366.98	23,404	517.58	52,931	486.85	4,472	165.92	135,334	423.95
		หญิง	28,728	477.81	35,167	416.67	26,799	576.56	64,840	592.78	4,829	161.29	160,363	485.47
006	โรคลำไส้อักเสบอื่น ๆ (A02, A04-A05,A07-A08) Other intestinal infectious diseases	รวม	10,639	89.88	9,882	60.07	5,605	61.12	19,718	90.41	2,259	39.71	48,103	74.06
		ชาย	5,230	89.80	4,864	60.73	2,837	62.74	8,927	82.11	1,229	45.60	23,087	72.32
		หญิง	5,409	89.96	5,018	59.46	2,768	59.55	10,791	98.65	1,030	34.40	25,016	75.73
007	วัณโรคทางเดินหายใจ (A15-A16) Respiratory tuberculosis	รวม	5,652	47.75	7,148	43.45	3,431	37.42	14,149	64.87	1,418	24.92	31,798	48.95
		ชาย	4,171	71.62	5,029	62.79	2,501	55.31	9,524	87.60	1,007	37.36	22,232	69.64
		หญิง	1,481	24.63	2,119	25.11	930	20.01	4,625	42.28	411	13.73	9,566	28.96
008	วัณโรคอื่น ๆ (A17-A19) Other Tuberculosis	รวม	1,288	10.88	1,217	7.40	614	6.70	3,219	14.76	470	8.26	6,808	10.48
		ชาย	785	13.48	741	9.25	378	8.36	1,831	16.84	256	9.50	3,991	12.50
		หญิง	503	8.37	476	5.64	236	5.08	1,388	12.69	214	7.15	2,817	8.53

ตาราง 20 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2557(ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ภาคเหนือ		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.)		ภาคใต้		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพมหานคร		หน่วยนับ : ราย รวมทั้งประเทศ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
009	กาฬโรค (A20) Plaque	รวม	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
010	โรคติดเชื้อบรูเซลลา (A23) Brucellosis	รวม	0	0.00	3	0.02	0	0.00	1	0.00	2	0.04	6	0.01
		ชาย	0	0.00	1	0.01	0	0.00	1	0.01	0	0.00	2	0.01
		หญิง	0	0.00	2	0.02	0	0.00	0	0.00	2	0.07	4	0.01
011	โรคเรื้อน (A30) Leprosy	รวม	8	0.07	13	0.08	14	0.15	26	0.12	3	0.05	64	0.10
		ชาย	6	0.10	8	0.10	10	0.22	14	0.13	2	0.07	40	0.13
		หญิง	2	0.03	5	0.06	4	0.09	12	0.11	1	0.03	24	0.07
012	บาดทะยักในเด็กแรกเกิด (A33) Tetanus neonatorum	รวม	0	0.00	1	0.01	0	0.00	3	0.01	0	0.00	4	0.01
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.02	0	0.00	2	0.01
		หญิง	0	0.00	1	0.01	0	0.00	1	0.01	0	0.00	2	0.01
013	บาดทะยักอื่น ๆ (A34-A35) Other tetanus	รวม	52	0.44	35	0.21	13	0.14	68	0.31	8	0.14	176	0.27
		ชาย	32	0.55	24	0.30	10	0.22	50	0.46	4	0.15	120	0.38
		หญิง	20	0.33	11	0.13	3	0.06	18	0.16	4	0.13	56	0.17
014	โรคคอตีบ (A36) Diphtheria	รวม	14	0.12	7	0.04	29	0.32	10	0.05	0	0.00	60	0.09
		ชาย	6	0.10	5	0.06	16	0.35	5	0.05	0	0.00	32	0.10
		หญิง	8	0.13	2	0.02	13	0.28	5	0.05	0	0.00	28	0.08
015	โรคไอกรน (A37) Whooping cough	รวม	3	0.03	10	0.06	5	0.05	4	0.02	8	0.14	30	0.05
		ชาย	0	0.00	3	0.04	2	0.04	1	0.01	4	0.15	10	0.03
		หญิง	3	0.05	7	0.08	3	0.06	3	0.03	4	0.13	20	0.06
016	การติดเชื้อเมนิงโกคอคคัส (A39) Meningococcal infection	รวม	15	0.13	16	0.10	13	0.14	32	0.15	6	0.11	82	0.13
		ชาย	7	0.12	7	0.09	9	0.20	19	0.17	2	0.07	44	0.14
		หญิง	8	0.13	9	0.11	4	0.09	13	0.12	4	0.13	38	0.12
017	โลหิตเป็นพิษ (A40-A41) Septicemia	รวม	7,489	63.27	7,822	47.55	3,649	39.79	13,072	59.93	2,198	38.63	34,230	52.70
		ชาย	3,929	67.46	3,525	44.01	1,797	39.74	6,682	61.46	1,043	38.70	16,976	53.18
		หญิง	3,560	59.21	4,297	50.91	1,852	39.84	6,390	58.42	1,155	38.58	17,254	52.23
018	โรคจากแบคทีเรียอื่น ๆ (A21-A22, A24-A28, A31-A32, A38, A42-A49) Other bacterial diseases	รวม	4,066	34.35	3,527	21.44	6,917	75.43	21,112	96.80	496	8.72	36,118	55.60
		ชาย	2,307	39.61	1,931	24.11	3,991	88.26	12,470	114.70	268	9.94	20,967	65.68
		หญิง	1,759	29.26	1,596	18.91	2,926	62.95	8,642	79.01	228	7.62	15,151	45.87

ตาราง 20 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2557(ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ภาคเหนือ		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.)		ภาคใต้		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพมหานคร		หน่วยนับ : ราย รวมทั้งประเทศ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
019	ซิฟิลิสแต่กำเนิด (A50) Congenital syphilis	รวม	47	0.40	87	0.53	29	0.32	61	0.28	21	0.37	245	0.38
		ชาย	26	0.45	47	0.59	16	0.35	34	0.31	11	0.41	134	0.42
		หญิง	21	0.35	40	0.47	13	0.28	27	0.25	10	0.33	111	0.34
020	ซิฟิลิสระยะเริ่ม (A51) Early syphilis	รวม	9	0.08	11	0.07	7	0.08	23	0.11	7	0.12	57	0.09
		ชาย	9	0.15	9	0.11	4	0.09	15	0.14	5	0.19	42	0.13
		หญิง	0	0.00	2	0.02	3	0.06	8	0.07	2	0.07	15	0.05
021	ซิฟิลิสอื่น ๆ (A52-A53) Other syphilis	รวม	76	0.64	78	0.47	132	1.44	196	0.90	30	0.53	512	0.79
		ชาย	48	0.82	55	0.69	78	1.72	128	1.18	22	0.82	331	1.04
		หญิง	28	0.47	23	0.27	54	1.16	68	0.62	8	0.27	181	0.55
022	การติดเชื้อหนองใน (A54) Gonococcal infection	รวม	28	0.24	35	0.21	20	0.22	69	0.32	14	0.25	166	0.26
		ชาย	16	0.27	17	0.21	10	0.22	43	0.40	6	0.22	92	0.29
		หญิง	12	0.20	18	0.21	10	0.22	26	0.24	8	0.27	74	0.22
023	โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จากเชื้อคลามัยเดีย (A55-A56) Sexually transmitted chlamydial diseases	รวม	5	0.04	4	0.02	6	0.07	12	0.06	1	0.02	28	0.04
		ชาย	2	0.03	2	0.02	3	0.07	8	0.07	0	0.00	15	0.05
		หญิง	3	0.05	2	0.02	3	0.06	4	0.04	1	0.03	13	0.04
024	โรคติดเชื้ออื่นๆ ที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นส่วนใหญ่ (A57-A64) Other infections with a predominantly sexual mode of transmission	รวม	142	1.20	182	1.11	63	0.69	280	1.28	57	1.00	724	1.11
		ชาย	76	1.30	67	0.84	19	0.42	108	0.99	31	1.15	301	0.94
		หญิง	66	1.10	115	1.36	44	0.95	172	1.57	26	0.87	423	1.28
025	โรคไขกลับซ้ำ (A68) Relapsing fever	รวม	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
026	ริดสีดวงตา (A71) Trachoma	รวม	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
027	ไข้รากสาดใหญ่ (A75) Typhus fever	รวม	3,714	31.38	670	4.07	3,258	35.53	5,358	24.57	104	1.83	13,104	20.17
		ชาย	2,112	36.26	388	4.84	1,788	39.54	2,997	27.57	67	2.49	7,352	23.03
		หญิง	1,602	26.64	282	3.34	1,470	31.63	2,361	21.58	37	1.24	5,752	17.41
028	โรคโปลิโอเฉียบพลัน (A80) Acute poliomyelitis	รวม	2	0.02	2	0.01	3	0.03	3	0.01	0	0.00	10	0.02
		ชาย	1	0.02	1	0.01	2	0.04	1	0.01	0	0.00	5	0.02
		หญิง	1	0.02	1	0.01	1	0.02	2	0.02	0	0.00	5	0.02

ตาราง 20 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2557(ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ภาคเหนือ		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.)		ภาคใต้		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพมหานคร		รวมทั้งประเทศ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
029	โรคพิษสุนัขบ้า (A82) Rabies	รวม	0	0.00	3	0.02	1	0.01	0	0.00	1	0.02	5	0.01
		ชาย	0	0.00	2	0.02	0	0.00	0	0.00	1	0.04	3	0.01
		หญิง	0	0.00	1	0.01	1	0.02	0	0.00	0	0.00	2	0.01
030	สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส (A83-A86) Viral encephalitis	รวม	104	0.88	116	0.71	79	0.86	207	0.95	50	0.88	556	0.86
		ชาย	53	0.91	49	0.61	43	0.95	116	1.07	19	0.70	280	0.88
		หญิง	51	0.85	67	0.79	36	0.77	91	0.83	31	1.04	276	0.84
031	ไข้เหลือง (A95) Yellow fever	รวม	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
032	*ไข้จากไวรัสที่นำโดยแมลงและไขเลือดออกที่เกิด จากไวรัสอื่น ๆ (A90-A94, A96-A99) Other arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers	รวม	5,674	47.94	13,095	79.61	26,632	290.43	12,868	59.00	2,223	39.07	60,492	93.13
		ชาย	2,905	49.88	6,688	83.50	13,055	288.71	6,587	60.59	1,173	43.52	30,408	95.26
		หญิง	2,769	46.05	6,407	75.91	13,577	292.10	6,281	57.42	1,050	35.07	30,084	91.07
033	เริม (B00) Herpesviral infection	รวม	390	3.29	475	2.89	184	2.01	580	2.66	103	1.81	1,732	2.67
		ชาย	186	3.19	215	2.68	79	1.75	289	2.66	54	2.00	823	2.58
		หญิง	204	3.39	260	3.08	105	2.26	291	2.66	49	1.64	909	2.75
034	อีสุกอีใสและงูสวัด (B01-B02) Varicella and zoster	รวม	1,083	9.15	1,519	9.23	1,050	11.45	2,092	9.59	312	5.48	6,056	9.32
		ชาย	524	9.00	808	10.09	542	11.99	1,075	9.89	145	5.38	3,094	9.69
		หญิง	559	9.30	711	8.42	508	10.93	1,017	9.30	167	5.58	2,962	8.97
035	หัด (B05) Measles	รวม	26	0.22	50	0.30	192	2.09	53	0.24	15	0.26	336	0.52
		ชาย	16	0.27	26	0.32	109	2.41	23	0.21	5	0.19	179	0.56
		หญิง	10	0.17	24	0.28	83	1.79	30	0.27	10	0.33	157	0.48
036	หัดเยอรมัน (B06) Rubella	รวม	6	0.05	11	0.07	9	0.10	4	0.02	3	0.05	33	0.05
		ชาย	3	0.05	5	0.06	7	0.15	1	0.01	2	0.07	18	0.06
		หญิง	3	0.05	6	0.07	2	0.04	3	0.03	1	0.03	15	0.05
037	ตับอักเสบเฉียบพลันชนิดบี (B16) Acute hepatitis B	รวม	211	1.78	205	1.25	123	1.34	359	1.65	45	0.79	943	1.45
		ชาย	136	2.34	129	1.61	81	1.79	225	2.07	26	0.96	597	1.87
		หญิง	75	1.25	76	0.90	42	0.90	134	1.23	19	0.63	346	1.05
038	ตับอักเสบจากไวรัสอื่น ๆ (B15, B17-B19) Other viral hepatitis	รวม	936	7.91	919	5.59	542	5.91	1,745	8.00	245	4.31	4,387	6.75
		ชาย	527	9.05	529	6.60	336	7.43	1,097	10.09	154	5.71	2,643	8.28
		หญิง	409	6.80	390	4.62	206	4.43	648	5.92	91	3.04	1,744	5.28

ตาราง 20 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2557(ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ภาคเหนือ		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.)		ภาคใต้		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพมหานคร		รวมทั้งประเทศ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
039	ภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากไวรัส (HIV) (B20-B24) Human immunodeficiency virus [HIV] disease	รวม	5,264	44.47	8,124	49.39	3,863	42.13	9,660	44.29	2,204	38.74	29,115	44.82
		ชาย	3,262	56.01	4,751	59.32	2,330	51.53	6,043	55.58	1,412	52.39	17,798	55.75
		หญิง	2,002	33.30	3,373	39.96	1,533	32.98	3,617	33.07	792	26.45	11,317	34.26
040	คางทูม (B26) Mumps	รวม	21	0.18	18	0.11	42	0.46	38	0.17	2	0.04	121	0.19
		ชาย	10	0.17	8	0.10	24	0.53	22	0.20	1	0.04	65	0.20
		หญิง	11	0.18	10	0.12	18	0.39	16	0.15	1	0.03	56	0.17
041	โรคจากไวรัสอื่น (A81, A87-A89, B03-B04, B07-B09, B25, B27-B34) Other viral diseases	รวม	6,475	54.70	10,032	60.99	7,549	82.32	10,800	49.52	2,014	35.40	36,870	56.76
		ชาย	3,520	60.44	5,425	67.73	3,851	85.16	5,750	52.89	1,068	39.63	19,614	61.44
		หญิง	2,955	49.15	4,607	54.59	3,698	79.56	5,050	46.17	946	31.60	17,256	52.24
042	โรคติดเชื้อรา (B35-B49) Mycoses	รวม	424	3.58	421	2.56	214	2.33	775	3.55	203	3.57	2,037	3.14
		ชาย	238	4.09	228	2.85	108	2.39	463	4.26	110	4.08	1,147	3.59
		หญิง	186	3.09	193	2.29	106	2.28	312	2.85	93	3.11	890	2.69
043	มาลาเรีย (B50-B54) Malaria	รวม	700	5.91	662	4.02	2,033	22.17	2,517	11.54	40	0.70	5,952	9.16
		ชาย	434	7.45	469	5.86	1,181	26.12	2,270	20.88	31	1.15	4,385	13.74
		หญิง	266	4.42	193	2.29	852	18.33	247	2.26	9	0.30	1,567	4.74
044	โรคไลชมาเนีย (B55) Leishmaniasis	รวม	6	0.05	0	0.00	3	0.03	0	0.00	0	0.00	9	0.01
		ชาย	5	0.09	0	0.00	3	0.07	0	0.00	0	0.00	8	0.03
		หญิง	1	0.02	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.00
045	โรคทริปาโนโซม (B56-B57) Trypanosomiasis	รวม	2	0.02	3	0.02	3	0.03	5	0.02	2	0.04	15	0.02
		ชาย	2	0.03	1	0.01	2	0.04	2	0.02	0	0.00	7	0.02
		หญิง	0	0.00	2	0.02	1	0.02	3	0.03	2	0.07	8	0.02
046	โรคติดเชื้อซิสโตโซม (B65) Schistosomiasis	รวม	1	0.01	1	0.01	3	0.03	3	0.01	0	0.00	8	0.01
		ชาย	1	0.02	0	0.00	3	0.07	1	0.01	0	0.00	5	0.02
		หญิง	0	0.00	1	0.01	0	0.00	2	0.02	0	0.00	3	0.01
047	โรคพยาธิใบไม้อื่น ๆ (B66) Other fluke infections	รวม	21	0.18	1	0.01	0	0.00	30	0.14	2	0.04	54	0.08
		ชาย	9	0.15	1	0.01	0	0.00	17	0.16	2	0.07	29	0.09
		หญิง	12	0.20	0	0.00	0	0.00	13	0.12	0	0.00	25	0.08
048	โรคพยาธิเอคคิโนคอกคัส (B67) Echinococcosis	รวม	1	0.01	0	0.00	1	0.01	1	0.00	0	0.00	3	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00	1	0.02	1	0.01	0	0.00	2	0.01
		หญิง	1	0.02	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.00

ตาราง 20 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2557(ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ภาคเหนือ		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.)		ภาคใต้		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพมหานคร		หน่วยนับ : ราย รวมทั้งประเทศ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
049	โรคพยาธิราคันคูลัส (B72) Dracunculiasis	รวม	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
050	โรคพยาธิออนโคเชอร์คา (B73) Onchocerciasis	รวม	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
051	โรคพยาธิฟิลาเรีย (B74) Filariasis	รวม	1	0.01	2	0.01	3	0.03	2	0.01	0	0.00	8	0.01
		ชาย	1	0.02	2	0.02	1	0.02	0	0.00	0	0.00	4	0.01
		หญิง	0	0.00	0	0.00	2	0.04	2	0.02	0	0.00	4	0.01
052	โรคพยาธิปากขอ (B76) Hookworm diseases	รวม	7	0.06	11	0.07	31	0.34	17	0.08	0	0.00	66	0.10
		ชาย	5	0.09	5	0.06	16	0.35	6	0.06	0	0.00	32	0.10
		หญิง	2	0.03	6	0.07	15	0.32	11	0.10	0	0.00	34	0.10
053	โรคพยาธิตัวตืดอื่น ๆ (B68-B71, B75, B77-B83) Other helminthiasis	รวม	488	4.12	116	0.71	175	1.91	1,501	6.88	39	0.69	2,319	3.57
		ชาย	286	4.91	74	0.92	82	1.81	964	8.87	25	0.93	1,431	4.48
		หญิง	202	3.36	42	0.50	93	2.00	537	4.91	14	0.47	888	2.69
054	ผลตามหลังวัณโรค (B90) Sequelae of tuberculosis	รวม	63	0.53	64	0.39	74	0.81	146	0.67	5	0.09	352	0.54
		ชาย	50	0.86	46	0.57	53	1.17	78	0.72	4	0.15	231	0.72
		หญิง	13	0.22	18	0.21	21	0.45	68	0.62	1	0.03	121	0.37
055	ผลตามหลังโรคโปลิโอ (B91) Sequelae of poliomyelitis	รวม	1	0.01	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	1	0.02	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.00
056	ผลตามหลังโรคเรื้อน (B92) Sequelae of leprosy	รวม	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
057	โรคติดเชื้อและปรสิตอื่น ๆ (A65-A67, A69-A70, A74, A77-A79, B58-B64, B85-B89, B94, B99) Other infectious and parasitic diseases	รวม	557	4.71	407	2.47	1,608	17.54	750	3.44	106	1.86	3,428	5.28
		ชาย	314	5.39	227	2.83	919	20.32	426	3.92	54	2.00	1,940	6.08
		หญิง	243	4.04	180	2.13	689	14.82	324	2.96	52	1.74	1,488	4.50
โรคเนื้องอกร้ายและเนื้องอกไม่ร้าย (C00-D48)														
058	เนื้องอกร้ายของริมฝีปาก ช่องปากและคอหอย (C00-C14) Malignant neoplasm of lip, oral cavity and pharynx	รวม	2,154	18.20	3,586	21.80	1,770	19.30	4,131	18.94	3,097	54.44	14,738	22.69
		ชาย	1,496	25.69	2,750	34.33	1,349	29.83	2,623	24.13	2,403	89.16	10,621	33.27
		หญิง	658	10.94	836	9.91	421	9.06	1,508	13.79	694	23.18	4,117	12.46

ตาราง 20 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2557(ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ภาคเหนือ		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.)		ภาคใต้		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพมหานคร		รวมทั้งประเทศ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
059	เนื้องอกร้ายที่หลอดอาหาร (C15) Malignant neoplasm of oesophagus	รวม	812	6.86	1,974	12.00	980	10.69	953	4.37	1,002	17.61	5,721	8.81
		ชาย	676	11.61	1,681	20.99	777	17.18	816	7.51	877	32.54	4,827	15.12
		หญิง	136	2.26	293	3.47	203	4.37	137	1.25	125	4.17	894	2.71
060	เนื้องอกร้ายที่กระเพาะอาหาร (C16) Malignant neoplasm of stomach	รวม	1,958	16.54	1,305	7.93	401	4.37	2,066	9.47	879	15.45	6,609	10.17
		ชาย	1,077	18.49	716	8.94	270	5.97	1,233	11.34	446	16.55	3,742	11.72
		หญิง	881	14.65	589	6.98	131	2.82	833	7.62	433	14.46	2,867	8.68
061	เนื้องอกร้ายของลำไส้ใหญ่ (C18) Malignant neoplasm of colon	รวม	6,409	54.15	7,309	44.43	3,551	38.72	9,808	44.97	5,270	92.63	32,347	49.80
		ชาย	3,189	54.76	3,937	49.15	1,843	40.76	4,715	43.37	2,770	102.77	16,454	51.54
		หญิง	3,220	53.56	3,372	39.95	1,708	36.75	5,093	46.56	2,500	83.50	15,893	48.11
062	เนื้องอกร้ายที่รอยต่อลำไส้ใหญ่เร็กตัม และซิกมอยด์ เร็กตัม ทวารหนักและช่องทวารหนัก (C19-C21) Malignant neoplasm of recto sigmoid junction, rectum, anus and anal canal	รวม	4,847	40.95	4,008	24.37	1,849	20.16	7,297	33.46	4,416	77.62	22,417	34.51
		ชาย	2,927	50.26	2,261	28.23	988	21.85	3,979	36.60	2,503	92.87	12,658	39.65
		หญิง	1,920	31.93	1,747	20.70	861	18.52	3,318	30.33	1,913	63.89	9,759	29.54
063	เนื้องอกร้ายที่ตับและท่อน้ำดีในตับ (C22) Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts	รวม	7,606	64.26	4,949	30.09	1,881	20.51	14,833	68.01	4,976	87.46	34,245	52.72
		ชาย	5,233	89.86	3,466	43.27	1,345	29.74	9,769	89.85	3,519	130.56	23,332	73.09
		หญิง	2,373	39.47	1,483	17.57	536	11.53	5,064	46.30	1,457	48.66	10,913	33.04
064	เนื้องอกร้ายที่ตับอ่อน (C25) Malignant neoplasm of pancreas	รวม	763	6.45	871	5.30	399	4.35	790	3.62	735	12.92	3,558	5.48
		ชาย	361	6.20	440	5.49	224	4.95	405	3.73	357	13.25	1,787	5.60
		หญิง	402	6.69	431	5.11	175	3.76	385	3.52	378	12.63	1,771	5.36
065	เนื้องอกร้ายที่อวัยวะย่อยอาหารอื่น ๆ (C17, C23- C24, C26) Other malignant neoplasms of digestive organs	รวม	916	7.74	635	3.86	390	4.25	1,818	8.34	562	9.88	4,321	6.65
		ชาย	385	6.61	290	3.62	182	4.02	1,026	9.44	263	9.76	2,146	6.72
		หญิง	531	8.83	345	4.09	208	4.47	792	7.24	299	9.99	2,175	6.58
066	เนื้องอกร้ายที่กล่องเสียง (C32) Malignant neoplasm of larynx	รวม	459	3.88	804	4.89	358	3.90	648	2.97	625	10.99	2,894	4.46
		ชาย	417	7.16	740	9.24	328	7.25	611	5.62	582	21.59	2,678	8.39
		หญิง	42	0.70	64	0.76	30	0.65	37	0.34	43	1.44	216	0.65
067	เนื้องอกร้ายที่หลอดคอ หลอดลม และปอด (C33-C34) Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung	รวม	7,321	61.85	5,377	32.69	2,758	30.08	7,222	33.11	3,039	53.42	25,717	39.59
		ชาย	4,486	77.03	3,482	43.47	1,883	41.64	4,556	41.91	1,842	68.34	16,249	50.90
		หญิง	2,835	47.15	1,895	22.45	875	18.82	2,666	24.37	1,197	39.98	9,468	28.66

ตาราง 20 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2557(ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ภาคเหนือ		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.)		ภาคใต้		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพมหานคร		หน่วยนับ : ราย รวมทั้งประเทศ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
068	เนื้องอกร้ายที่อวัยวะหายใจและอวัยวะของอก (C30-C31, C37-C39) Other malignant neoplasm of respiratory and intrathoracic organs	รวม	215	1.82	222	1.35	161	1.76	492	2.26	443	7.79	1,533	2.36
		ชาย	156	2.68	137	1.71	99	2.19	344	3.16	313	11.61	1,049	3.29
		หญิง	59	0.98	85	1.01	62	1.33	148	1.35	130	4.34	484	1.47
069	เนื้องอกร้ายที่กระดูกและกระดูกอ่อนผิวหนัง (C40-C41) Malignant neoplasm of bone and articular cartilage	รวม	271	2.29	224	1.36	220	2.40	786	3.60	936	16.45	2,437	3.75
		ชาย	153	2.63	122	1.52	130	2.87	406	3.73	590	21.89	1,401	4.39
		หญิง	118	1.96	102	1.21	90	1.94	380	3.47	346	11.56	1,036	3.14
070	เนื้องอกร้ายที่เมลาโนมาของผิวหนัง (C43) Malignant melanoma of skin	รวม	82	0.69	84	0.51	47	0.51	135	0.62	104	1.83	452	0.70
		ชาย	41	0.70	51	0.64	26	0.57	67	0.62	58	2.15	243	0.76
		หญิง	41	0.68	33	0.39	21	0.45	68	0.62	46	1.54	209	0.63
071	เนื้องอกร้ายที่ผิวหนังอื่น ๆ (C44) Other malignant neoplasm of skin	รวม	295	2.49	303	1.84	123	1.34	474	2.17	257	4.52	1,452	2.24
		ชาย	157	2.70	146	1.82	66	1.46	221	2.03	132	4.90	722	2.26
		หญิง	138	2.30	157	1.86	57	1.23	253	2.31	125	4.17	730	2.21
072	เนื้องอกร้ายที่เมโสเธลิอัลและเนื้อเยื่ออ่อน (C45-C49) Malignant neoplasm of mesothelial and soft tissue	รวม	538	4.55	411	2.50	294	3.21	895	4.10	1,046	18.39	3,184	4.90
		ชาย	201	3.45	169	2.11	125	2.76	443	4.07	398	14.77	1,336	4.19
		หญิง	337	5.61	242	2.87	169	3.64	452	4.13	648	21.64	1,848	5.59
073	เนื้องอกร้ายที่เต้านม (C50) Malignant neoplasm of breast	รวม	6,805	57.49	6,051	36.79	2,591	28.26	7,921	36.32	3,709	65.19	27,077	41.69
		ชาย	49	0.84	43	0.54	19	0.42	78	0.72	13	0.48	202	0.63
		หญิง	6,756	112.37	6,008	71.19	2,572	55.33	7,843	71.70	3,696	123.44	26,875	81.36
074	เนื้องอกร้ายที่ปากมดลูก (C53) Malignant neoplasm of cervix uteri	รวม	2,639	43.89	3,089	36.60	1,199	25.80	3,650	33.37	2,786	93.05	13,363	40.45
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	2,639	43.89	3,089	36.60	1,199	25.80	3,650	33.37	2,786	93.05	13,363	40.45
075	เนื้องอกร้ายอื่นๆ ที่มีโครงสร้างของมดลูก (C54-C55) Malignant neoplasm of other and unspecified parts of uterus	รวม	951	15.82	951	11.27	491	10.56	1,391	12.72	1,694	56.58	5,478	16.58
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	951	15.82	951	11.27	491	10.56	1,391	12.72	1,694	56.58	5,478	16.58
076	เนื้องอกร้ายของอวัยวะสืบพันธุ์หญิง (C51-C52, C56-C58) Other malignant neoplasm of female genital organs	รวม	2,007	33.38	1,974	23.39	904	19.45	4,348	39.75	3,811	127.29	13,044	39.49
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	2,007	33.38	1,974	23.39	904	19.45	4,348	39.75	3,811	127.29	13,044	39.49
077	เนื้องอกร้ายที่ต่อมลูกหมาก (C61) Malignant neoplasm of prostate	รวม	1,112	19.09	968	12.09	653	14.44	1,092	10.04	987	36.62	4,812	15.07
		ชาย	1,112	19.09	968	12.09	653	14.44	1,092	10.04	987	36.62	4,812	15.07
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

ตาราง 20 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2557(ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ภาคเหนือ		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.)		ภาคใต้		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพมหานคร		หน่วยนับ : ราย รวมทั้งประเทศ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
078	เนื้องอกร้ายของอวัยวะสืบพันธุ์ชาย (C60, C62-C63) Other malignant neoplasms of male genital organs	รวม	281	4.83	199	2.48	169	3.74	536	4.93	155	5.75	1,340	4.20
		ชาย	281	4.83	199	2.48	169	3.74	536	4.93	155	5.75	1,340	4.20
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
079	เนื้องอกร้ายที่กระเพาะปัสสาวะ (C67) Malignant neoplasm of bladder	รวม	1,368	11.56	1,178	7.16	1,050	11.45	1,845	8.46	1,211	21.29	6,652	10.24
		ชาย	1,047	17.98	922	11.51	902	19.95	1,478	13.59	897	33.28	5,246	16.43
		หญิง	321	5.34	256	3.03	148	3.18	367	3.36	314	10.49	1,406	4.26
080	เนื้องอกร้ายอื่นๆ ที่ท่อปัสสาวะ (C64-C66, C68) Other malignant neoplasm of urinary tract	รวม	436	3.68	303	1.84	222	2.42	567	2.60	424	7.45	1,952	3.01
		ชาย	291	5.00	169	2.11	143	3.16	379	3.49	256	9.50	1,238	3.88
		หญิง	145	2.41	134	1.59	79	1.70	188	1.72	168	5.61	714	2.16
081	เนื้องอกร้ายของตาและส่วนประกอบ (C69) Malignant neoplasm of eye and adnexa	รวม	55	0.46	20	0.12	77	0.84	83	0.38	295	5.19	530	0.82
		ชาย	40	0.69	18	0.22	41	0.91	39	0.36	131	4.86	269	0.84
		หญิง	15	0.25	2	0.02	36	0.77	44	0.40	164	5.48	261	0.79
082	เนื้องอกร้ายของสมอง (C71) Malignant neoplasm of brain	รวม	478	4.04	504	3.06	380	4.14	837	3.84	731	12.85	2,930	4.51
		ชาย	255	4.38	285	3.56	220	4.87	399	3.67	387	14.36	1,546	4.84
		หญิง	223	3.71	219	2.59	160	3.44	438	4.00	344	11.49	1,384	4.19
083	เนื้องอกร้ายที่ส่วนอื่น ๆ ของระบบประสาทส่วนกลาง (C70,C72) Malignant neoplasm of other parts of central nervous system	รวม	46	0.39	58	0.35	32	0.35	61	0.28	59	1.04	256	0.39
		ชาย	14	0.24	31	0.39	12	0.27	34	0.31	24	0.89	115	0.36
		หญิง	32	0.53	27	0.32	20	0.43	27	0.25	35	1.17	141	0.43
084	เนื้องอกอื่น ๆ และที่ไม่ทราบสาเหตุ เนื้องอกทุติยภูมิ ที่มีได้ระบุนายละเอียดและเกิดขึ้นหลายแห่ง (C73-C80, C97) Malignant neoplasm of other, ill-defined, secondary, unspecified and multiple sites	รวม	5,740	48.49	4,885	29.70	2,103	22.93	6,810	31.22	5,300	93.16	24,838	38.24
		ชาย	2,580	44.30	2,234	27.89	938	20.74	3,118	28.68	2,271	84.26	11,141	34.90
		หญิง	3,160	52.56	2,651	31.41	1,165	25.06	3,692	33.75	3,029	101.17	13,697	41.46
085	โรคฮอดกินส์ (C81) Hodgkin's disease	รวม	163	1.38	250	1.52	139	1.52	410	1.88	286	5.03	1,248	1.92
		ชาย	118	2.03	175	2.18	82	1.81	270	2.48	170	6.31	815	2.55
		หญิง	45	0.75	75	0.89	57	1.23	140	1.28	116	3.87	433	1.31
086	เนื้องอกร้ายลิมโฟมาที่ไม่ใช่โรคฮอดกินส์ (C82-C85) Non-Hodgkin's lymphoma	รวม	2,243	18.95	2,104	12.79	1,305	14.23	3,989	18.29	2,038	35.82	11,679	17.98
		ชาย	1,297	22.27	1,199	14.97	717	15.86	2,377	21.86	1,049	38.92	6,639	20.80
		หญิง	946	15.73	905	10.72	588	12.65	1,612	14.74	989	33.03	5,040	15.26

ตาราง 20 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2557(ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ภาคเหนือ		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.)		ภาคใต้		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพมหานคร		รวมทั้งประเทศ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
087	ลิวคีเมีย (C91-C95) Leukaemia	รวม	2,421	20.45	2,985	18.15	2,060	22.46	5,583	25.60	2,105	37.00	15,154	23.33
		ชาย	1,399	24.02	1,783	22.26	1,186	26.23	3,121	28.71	1,277	47.38	8,766	27.46
		หญิง	1,022	17.00	1,202	14.24	874	18.80	2,462	22.51	828	27.65	6,388	19.34
088	เนื้องอกร้ายอื่นๆ ของลิมโฟยด์อื่นๆ ระบบสร้างเม็ด เลือดและเนื้อเยื่อ (C88-C90, C96) Other malignant neoplasm of lymphoid, haematopoietic and related tissue	รวม	494	4.17	671	4.08	371	4.05	1,257	5.76	640	11.25	3,433	5.29
		ชาย	264	4.53	311	3.88	205	4.53	580	5.33	343	12.73	1,703	5.33
		หญิง	230	3.83	360	4.27	166	3.57	677	6.19	297	9.92	1,730	5.24
089	มะเร็งจำกัดเฉพาะที่ของปากมดลูก (D06) Carcinoma in situ of cervix uteri	รวม	217	3.61	396	4.69	139	2.99	443	4.05	125	4.17	1,320	4.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	217	3.61	396	4.69	139	2.99	443	4.05	125	4.17	1,320	4.00
090	เนื้องอกไม่ร้ายของผิวหนัง (D22-D23) Benign neoplasm of skin	รวม	93	0.79	103	0.63	54	0.59	204	0.94	127	2.23	581	0.89
		ชาย	45	0.77	42	0.52	23	0.51	76	0.70	44	1.63	230	0.72
		หญิง	48	0.80	61	0.72	31	0.67	128	1.17	83	2.77	351	1.06
091	เนื้องอกไม่ร้ายของเต้านม (D24) Benign neoplasm of breast	รวม	221	1.87	200	1.22	171	1.86	354	1.62	178	3.13	1,124	1.73
		ชาย	0	0.00	2	0.02	0	0.00	2	0.02	1	0.04	5	0.02
		หญิง	221	3.68	198	2.35	171	3.68	352	3.22	177	5.91	1,119	3.39
092	ไลโอไมโอมาที่มดลูก Leiomyoma of uterus (D25)	รวม	2,291	38.10	2,762	32.73	1,850	39.80	6,411	58.61	1,716	57.31	15,030	45.50
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	2,291	38.10	2,762	32.73	1,850	39.80	6,411	58.61	1,716	57.31	15,030	45.50
093	เนื้องอกไม่ร้ายที่รังไข่ Benign neoplasm of ovary (D27)	รวม	333	5.54	201	2.38	280	6.02	575	5.26	361	12.06	1,750	5.30
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	333	5.54	201	2.38	280	6.02	575	5.26	361	12.06	1,750	5.30
094	เนื้องอกไม่ร้ายที่ระบบปัสสาวะ (D30) Benign neoplasm of urinary organs	รวม	13	0.11	15	0.09	11	0.12	36	0.17	12	0.21	87	0.13
		ชาย	10	0.17	7	0.09	7	0.15	19	0.17	6	0.22	49	0.15
		หญิง	3	0.05	8	0.09	4	0.09	17	0.16	6	0.20	38	0.12
095	เนื้องอกไม่ร้ายของสมองและส่วนอื่นของระบบ ประสาทส่วนกลาง (D33) Benign neoplasm of brain and other parts of central nervous system	รวม	217	1.83	177	1.08	107	1.17	205	0.94	256	4.50	962	1.48
		ชาย	91	1.56	87	1.09	41	0.91	99	0.91	114	4.23	432	1.35
		หญิง	126	2.10	90	1.07	66	1.42	106	0.97	142	4.74	530	1.60

ตาราง 20 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2557(ต่อ)

หน่วยนับ : ราย														
รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ภาคเหนือ		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.)		ภาคใต้		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพมหานคร		รวมทั้งประเทศ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
096	เนื้องอกไม่ร้ายจำกัดเฉพาะที่อื่น ๆและเนื้องอกบางชนิดที่ไม่ทราบพฤติกรรม (D00-D05, D07-D21, D26,D28-D29 D31-D32,D34-D48) Other in situ and benign neoplasms and neoplasms of uncertain and unknown behaviour	รวม	6,297	53.20	6,165	37.48	3,631	39.60	10,407	47.72	4,991	87.73	31,491	48.48
		ชาย	2,776	47.67	2,680	33.46	1,463	32.35	4,360	40.10	1,922	71.31	13,201	41.35
		หญิง	3,521	58.56	3,485	41.29	2,168	46.64	6,047	55.28	3,069	102.50	18,290	55.37
โรคเลือดอวัยวะที่สร้างเลือดและความผิดปกติที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน (D50-D89)														
097	โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก (D50) Iron deficiency anaemia	รวม	1,853	15.66	2,545	15.47	997	10.87	3,812	17.48	373	6.56	9,580	14.75
		ชาย	604	10.37	824	10.29	326	7.21	1,208	11.11	120	4.45	3,082	9.65
		หญิง	1,249	20.77	1,721	20.39	671	14.44	2,604	23.81	253	8.45	6,498	19.67
098	โลหิตจางอื่น ๆ (D51-D64) Other anaemia	รวม	28,635	241.93	24,451	148.64	9,430	102.84	42,617	195.40	4,816	84.65	109,949	169.27
		ชาย	12,891	221.35	10,294	128.52	4,062	89.83	17,279	158.93	2,149	79.73	46,675	146.21
		หญิง	15,744	261.86	14,157	167.74	5,368	115.49	25,338	231.65	2,667	89.08	63,274	191.55
099	ภาวะเลือดออกอื่น ๆ โรคเลือดและอวัยวะที่สร้างเลือด (D65-D77) Haemorrhagic conditions and other diseases of blood and blood forming organs	รวม	2,974	25.13	3,180	19.33	1,948	21.24	5,617	25.75	1,485	26.10	15,204	23.41
		ชาย	1,438	24.69	1,364	17.03	956	21.14	2,835	26.08	798	29.61	7,391	23.15
		หญิง	1,536	25.55	1,816	21.52	992	21.34	2,782	25.43	687	22.95	7,813	23.65
100	ความผิดปกติที่เกี่ยวกับกลไกของภูมิคุ้มกัน (D80-D89) Certain disorders involving the immune mechanism	รวม	63	0.53	159	0.97	88	0.96	177	0.81	277	4.87	764	1.18
		ชาย	51	0.88	141	1.76	64	1.42	146	1.34	176	6.53	578	1.81
		หญิง	12	0.20	18	0.21	24	0.52	31	0.28	101	3.37	186	0.56
โรคต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิซึม														
101	การขาดไอโอดีนที่มีความสัมพันธ์กับต่อมธัยรอยด์ (E00-E02) Iodine deficiency related thyroid disorders	รวม	5	0.04	8	0.05	3	0.03	13	0.06	2	0.04	31	0.05
		ชาย	3	0.05	0	0.00	1	0.02	6	0.06	1	0.04	11	0.03
		หญิง	2	0.03	8	0.09	2	0.04	7	0.06	1	0.03	20	0.06
102	โรคพิษธัยรอยด์ (E05) Thyrotoxicosis	รวม	696	5.88	862	5.24	436	4.75	1,728	7.92	336	5.91	4,058	6.25
		ชาย	169	2.90	256	3.20	145	3.21	461	4.24	115	4.27	1,146	3.59
		หญิง	527	8.77	606	7.18	291	6.26	1,267	11.58	221	7.38	2,912	8.82
103	ความผิดปกติของต่อมธัยรอยด์อื่น ๆ (E03-E04, E06-E07) Other disorders of thyroid	รวม	1,245	10.52	1,172	7.12	995	10.85	2,479	11.37	735	12.92	6,626	10.20
		ชาย	175	3.00	173	2.16	121	2.68	313	2.88	106	3.93	888	2.78
		หญิง	1,070	17.80	999	11.84	874	18.80	2,166	19.80	629	21.01	5,738	17.37

ตาราง 20 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2557(ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ภาคเหนือ		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.)		ภาคใต้		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพมหานคร		หน่วยนับ : ราย	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	รวมทั้งประเทศ	จำนวน
104	เบาหวาน (E10-E14) Diabetes mellitus	รวม	17,789	150.29	23,147	140.72	11,998	130.84	42,340	194.13	4,664	81.98	99,938	153.86
		ชาย	7,185	123.37	8,453	105.54	4,518	99.91	15,833	145.63	1,906	70.72	37,895	118.71
		หญิง	10,604	176.37	14,694	174.10	7,480	160.93	26,507	242.33	2,758	92.12	62,043	187.82
105	ทุพโภชนาการ (E40-E46) Malnutrition	รวม	66	0.56	85	0.52	104	1.13	109	0.50	57	1.00	421	0.65
		ชาย	35	0.60	37	0.46	59	1.30	50	0.46	30	1.11	211	0.66
		หญิง	31	0.52	48	0.57	45	0.97	59	0.54	27	0.90	210	0.64
106	การขาดวิตามินเอ (E50) Vitamin A deficiency	รวม	0	0.00	1	0.01	0	0.00	2	0.01	3	0.05	6	0.01
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.04	1	0.00
		หญิง	0	0.00	1	0.01	0	0.00	2	0.02	2	0.07	5	0.02
107	การขาดวิตามินอื่น ๆ (E51-E56) Other vitamin deficiencies	รวม	51	0.43	27	0.16	28	0.31	87	0.40	30	0.53	223	0.34
		ชาย	35	0.60	19	0.24	16	0.35	69	0.63	18	0.67	157	0.49
		หญิง	16	0.27	8	0.09	12	0.26	18	0.16	12	0.40	66	0.20
108	ผลที่ตามมาของภาวะทุพโภชนาการและภาวะพร่อง โภชนาการอื่น ๆ Sequelae of malnutrition and other nutritional deficiencies (E64)	รวม	0	0.00	1	0.01	2	0.02	1	0.00	0	0.00	4	0.01
		ชาย	0	0.00	0	0.00	1	0.02	0	0.00	0	0.00	1	0.00
		หญิง	0	0.00	1	0.01	1	0.02	1	0.01	0	0.00	3	0.01
109	โรคอ้วน (E66) Obesity	รวม	89	0.75	27	0.16	65	0.71	88	0.40	165	2.90	434	0.67
		ชาย	57	0.98	9	0.11	35	0.77	46	0.42	92	3.41	239	0.75
		หญิง	32	0.53	18	0.21	30	0.65	42	0.38	73	2.44	195	0.59
110	การขาดปริมาณของเหลวในร่างกาย (E86) Volume depletion	รวม	154	1.30	138	0.84	256	2.79	214	0.98	74	1.30	836	1.29
		ชาย	74	1.27	67	0.84	107	2.37	93	0.86	40	1.48	381	1.19
		หญิง	80	1.33	71	0.84	149	3.21	121	1.11	34	1.14	455	1.38
111	ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตา บอลิกอื่น ๆ (E15-E35, E58-E63, E65, E67- E85, E87-E90) Other Endocrine, nutritional and metabolic disorders	รวม	16,266	137.42	15,025	91.34	5,068	55.27	24,521	112.43	3,256	57.23	64,136	98.74
		ชาย	6,748	115.87	5,758	71.89	2,072	45.82	9,790	90.05	1,306	48.46	25,674	80.43
		หญิง	9,518	158.30	9,267	109.80	2,996	64.46	14,731	134.67	1,950	65.13	38,462	116.44
โรคทางจิตเวชและความผิดปกติของพฤติกรรม														
112	สมองเสื่อม (F00-F03) Dementia	รวม	186	1.57	300	1.82	85	0.93	334	1.53	141	2.48	1,046	1.61
		ชาย	75	1.29	152	1.90	38	0.84	158	1.45	62	2.30	485	1.52
		หญิง	111	1.85	148	1.75	47	1.01	176	1.61	79	2.64	561	1.70

ตาราง 20 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2557(ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ภาคเหนือ		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.)		ภาคใต้		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพมหานคร		หน่วยนับ : ราย รวมทั้งประเทศ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
113	ความผิดปกติของพฤติกรรมและจิตประสาทที่เกิดจากการเสพยาเสพติด (F10) Mental and behavioral disorders due to use of alcohol	รวม	9,314	78.69	6,024	36.62	1,666	18.17	16,377	75.09	1,022	17.96	34,403	52.96
		ชาย	8,450	145.09	5,322	66.45	1,574	34.81	14,881	136.87	925	34.32	31,152	97.59
		หญิง	864	14.37	702	8.32	92	1.98	1,496	13.68	97	3.24	3,251	9.84
114	ความผิดปกติทางพฤติกรรมและจิตประสาทที่เกิดจากการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทอื่น ๆ (F11-F19) Mental and behavioral disorders due to other psychoactive substance use	รวม	1,220	10.31	2,575	15.65	1,088	11.86	2,012	9.22	704	12.37	7,599	11.70
		ชาย	1,040	17.86	2,205	27.53	1,026	22.69	1,840	16.92	604	22.41	6,715	21.04
		หญิง	180	2.99	370	4.38	62	1.33	172	1.57	100	3.34	884	2.68
115	จิตเภท พฤติกรรมแบบจิตเภทและความหลงผิด (F20-F29) Schizophrenia, schizotypal and delusional disorders	รวม	4,613	38.97	5,868	35.67	3,209	34.99	12,585	57.70	3,357	59.01	29,632	45.62
		ชาย	2,794	47.98	3,597	44.91	2,298	50.82	8,937	82.20	2,052	76.13	19,678	61.64
		หญิง	1,819	30.25	2,271	26.91	911	19.60	3,648	33.35	1,305	43.59	9,954	30.13
116	ความผิดปกติทางอารมณ์ (F30-F39) Mood (affective) disorders	รวม	2,582	21.81	1,550	9.42	1,576	17.19	3,420	15.68	768	13.50	9,896	15.24
		ชาย	867	14.89	497	6.21	528	11.68	1,033	9.50	324	12.02	3,249	10.18
		หญิง	1,715	28.52	1,053	12.48	1,048	22.55	2,387	21.82	444	14.83	6,647	20.12
117	โรคประสาท อาการทางกายที่เกิดจากจิตใจและความเครียด (F40-F48) Neurotic, stress related and somatoform disorders	รวม	1,612	13.62	1,277	7.76	1,140	12.43	3,069	14.07	267	4.69	7,365	11.34
		ชาย	459	7.88	426	5.32	338	7.47	711	6.54	133	4.93	2,067	6.48
		หญิง	1,153	19.18	851	10.08	802	17.25	2,358	21.56	134	4.48	5,298	16.04
118	ภาวะปัญญาอ่อน (F70-F79) Mental retardation	รวม	141	1.19	375	2.28	56	0.61	254	1.16	708	12.44	1,534	2.36
		ชาย	72	1.24	226	2.82	23	0.51	137	1.26	419	15.55	877	2.75
		หญิง	69	1.15	149	1.77	33	0.71	117	1.07	289	9.65	657	1.99
119	ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมอื่น ๆ (F04-F09, F50-F69, F80-F99) Other mental and behavioral disorders	รวม	2,062	17.42	2,741	16.66	490	5.34	1,574	7.22	1,398	24.57	8,265	12.72
		ชาย	1,471	25.26	2,035	25.41	276	6.10	859	7.90	940	34.88	5,581	17.48
		หญิง	591	9.83	706	8.36	214	4.60	715	6.54	458	15.30	2,684	8.13
โรคระบบประสาท (G00-G99)														
120	การอักเสบของระบบประสาทส่วนกลาง (G00-G09) Inflammatory diseases of the central nervous system	รวม	2,468	20.85	1,877	11.41	924	10.08	4,478	20.53	614	10.79	10,361	15.95
		ชาย	1,535	26.36	1,152	14.38	526	11.63	2,728	25.09	351	13.02	6,292	19.71
		หญิง	933	15.52	725	8.59	398	8.56	1,750	16.00	263	8.78	4,069	12.32
121	โรคพาคินสัน (G20) Parkinson's disease	รวม	189	1.60	206	1.25	113	1.23	466	2.14	132	2.32	1,106	1.70
		ชาย	92	1.58	99	1.24	30	0.66	202	1.86	75	2.78	498	1.56
		หญิง	97	1.61	107	1.27	83	1.79	264	2.41	57	1.90	608	1.84

ตาราง 20 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2557(ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ภาคเหนือ		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.)		ภาคใต้		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพมหานคร		หน่วยนับ : ราย รวมทั้งประเทศ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
122	โรคอัลไซเมอร์ (G30) Alzheimer;s disease	รวม	138	1.17	81	0.49	50	0.55	109	0.50	62	1.09	440	0.68
		ชาย	59	1.01	33	0.41	20	0.44	43	0.40	25	0.93	180	0.56
		หญิง	79	1.31	48	0.57	30	0.65	66	0.60	37	1.24	260	0.79
123	มัลติเปิ้ล สเคลอโรสิส (G35) Multiple sclerosis	รวม	71	0.60	41	0.25	40	0.44	94	0.43	37	0.65	283	0.44
		ชาย	11	0.19	8	0.10	3	0.07	15	0.14	9	0.33	46	0.14
		หญิง	60	1.00	33	0.39	37	0.80	79	0.72	28	0.94	237	0.72
124	ลมบ้าหมู (G40-G41) Epilepsy	รวม	7,314	61.79	7,841	47.67	4,893	53.36	11,186	51.29	2,395	42.10	33,629	51.77
		ชาย	4,763	81.78	5,039	62.91	3,143	69.51	7,272	66.89	1,453	53.91	21,670	67.88
		หญิง	2,551	42.43	2,802	33.20	1,750	37.65	3,914	35.78	942	31.46	11,959	36.20
125	โรคไมเกรนและกลุ่มอาการปวดศีรษะอื่นๆ (G43-G44) Migraine and other headache syndromes	รวม	1,530	12.93	1,778	10.81	1,566	17.08	3,620	16.60	263	4.62	8,757	13.48
		ชาย	504	8.65	531	6.63	465	10.28	1,297	11.93	67	2.49	2,864	8.97
		หญิง	1,026	17.06	1,247	14.77	1,101	23.69	2,323	21.24	196	6.55	5,893	17.84
126	โรคเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยชั่วคราวและกลุ่มอาการต่อเนื่อง (G45) Transient cerebral ischaemic attacks and related syndromes	รวม	1,404	11.86	1,985	12.07	1,110	12.10	2,441	11.19	527	9.26	7,467	11.50
		ชาย	772	13.26	1,091	13.62	656	14.51	1,367	12.57	296	10.98	4,182	13.10
		หญิง	632	10.51	894	10.59	454	9.77	1,074	9.82	231	7.72	3,285	9.94
127	ความผิดปกติของเส้นประสาท รากประสาทและปมประสาท (G50-G59) Nerve, nerve root and plexus disorders	รวม	625	5.28	673	4.09	565	6.16	1,228	5.63	473	8.31	3,564	5.49
		ชาย	279	4.79	259	3.23	174	3.85	445	4.09	198	7.35	1,355	4.24
		หญิง	346	5.75	414	4.91	391	8.41	783	7.16	275	9.18	2,209	6.69
128	สมองพิการและกลุ่มอาการอัมพาตอื่น ๆ (G80-G83) Cerebral palsy and other paralytic syndromes	รวม	797	6.73	492	2.99	430	4.69	1,121	5.14	395	6.94	3,235	4.98
		ชาย	511	8.77	306	3.82	281	6.21	714	6.57	242	8.98	2,054	6.43
		หญิง	286	4.76	186	2.20	149	3.21	407	3.72	153	5.11	1,181	3.58
129	โรคของระบบประสาทอื่น ๆ (G10-G13, G21-G26, G31-G32, G36-G37, G46-G47, G60-G73, G90-G99) Other diseases of the nervous system	รวม	4,452	37.61	3,279	19.93	1,823	19.88	8,244	37.80	2,285	40.16	20,083	30.92
		ชาย	2,763	47.44	1,912	23.87	1,065	23.55	5,521	50.78	1,208	44.82	12,469	39.06
		หญิง	1,689	28.09	1,367	16.20	758	16.31	2,723	24.89	1,077	35.97	7,614	23.05
โรคของตาและส่วนประกอบของตา (H00-H59)														
130	การอักเสบของหนังตา (H00-H01) Inflammation of eyelid	รวม	269	2.27	197	1.20	223	2.43	567	2.60	52	0.91	1,308	2.01
		ชาย	125	2.15	83	1.04	104	2.30	281	2.58	22	0.82	615	1.93
		หญิง	144	2.40	114	1.35	119	2.56	286	2.61	30	1.00	693	2.10

ตาราง 20 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2557(ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ภาคเหนือ		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.)		ภาคใต้		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพมหานคร		หน่วยนับ : ราย รวมทั้งประเทศ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
131	เยื่อบุตาอักเสบและความผิดปกติของเยื่อบุตาอื่น ๆ (H10-H13) Conjunctivitis and other disorders of conjunctiva	รวม	1,481	12.51	2,692	16.37	815	8.89	4,238	19.43	225	3.95	9,451	14.55
		ชาย	550	9.44	1,328	16.58	315	6.97	1,402	12.90	120	4.45	3,715	11.64
		หญิง	931	15.48	1,364	16.16	500	10.76	2,836	25.93	105	3.51	5,736	17.36
132	กระจกตาอักเสบและความผิดปกติของตาขาว และ กระจกตาอื่น ๆ (H15-H19) Keratitis and other disorders of sclera and cornea	รวม	962	8.13	1,181	7.18	507	5.53	1,862	8.54	598	10.51	5,110	7.87
		ชาย	563	9.67	681	8.50	349	7.72	1,132	10.41	319	11.84	3,044	9.54
		หญิง	399	6.64	500	5.92	158	3.40	730	6.67	279	9.32	2,066	6.25
133	ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ (H25-H28) Cataract and other disorders of sclera and cornea	รวม	36,053	304.60	57,140	347.37	18,586	202.68	61,724	283.00	18,131	318.69	191,634	295.02
		ชาย	15,662	268.93	22,332	278.82	7,873	174.11	25,477	234.33	7,611	282.39	78,955	247.33
		หญิง	20,391	339.14	34,808	412.42	10,713	230.48	36,247	331.38	10,520	351.36	112,679	341.11
134	จอประสาทตาหลุดออกและรอยฉีกของจอประสาทตา (H33) Retinal detachments and breaks	รวม	521	4.40	1,129	6.86	464	5.06	936	4.29	1,123	19.74	4,173	6.42
		ชาย	331	5.68	654	8.17	263	5.82	550	5.06	683	25.34	2,481	7.77
		หญิง	190	3.16	475	5.63	201	4.32	386	3.53	440	14.70	1,692	5.12
135	ต้อหิน (H40-H42) Glaucoma	รวม	1,090	9.21	1,004	6.10	490	5.34	1,518	6.96	860	15.12	4,962	7.64
		ชาย	464	7.97	474	5.92	218	4.82	562	5.17	448	16.62	2,166	6.79
		หญิง	626	10.41	530	6.28	272	5.85	956	8.74	412	13.76	2,796	8.46
136	ตาเหล่ (H49-H50) Strabismus	รวม	160	1.35	183	1.11	217	2.37	338	1.55	511	8.98	1,409	2.17
		ชาย	74	1.27	86	1.07	96	2.12	165	1.52	249	9.24	670	2.10
		หญิง	86	1.43	97	1.15	121	2.60	173	1.58	262	8.75	739	2.24
137	ความผิดปกติของสายตาและการเพ่งมอง (H52) Disorders of refraction and accommodation	รวม	11	0.09	9	0.05	7	0.08	13	0.06	8	0.14	48	0.07
		ชาย	4	0.07	3	0.04	2	0.04	8	0.07	5	0.19	22	0.07
		หญิง	7	0.12	6	0.07	5	0.11	5	0.05	3	0.10	26	0.08
138	ตาบอดและสายตาเลือนราง (H54) Blindness and low vision	รวม	31	0.26	37	0.22	36	0.39	46	0.21	15	0.26	165	0.25
		ชาย	22	0.38	20	0.25	21	0.46	28	0.26	6	0.22	97	0.30
		หญิง	9	0.15	17	0.20	15	0.32	18	0.16	9	0.30	68	0.21
139	โรคของตาและส่วนประกอบของตาอื่น ๆ (H02-H06, H20-H22, H30-H32, H34-H36, H43-H48, H51, H53, H55-H59) Other diseases of the eye and adnexa	รวม	1,679	14.19	2,266	13.78	1,504	16.40	3,583	16.43	2,309	40.59	11,341	17.46
		ชาย	765	13.14	958	11.96	666	14.73	1,522	14.00	1,070	39.70	4,981	15.60
		หญิง	914	15.20	1,308	15.50	838	18.03	2,061	18.84	1,239	41.38	6,360	19.25

ตาราง 20 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2557(ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ภาคเหนือ		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.)		ภาคใต้		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพมหานคร		หน่วยนับ : ราย รวมทั้งประเทศ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
โรคของหูและปมกกหู (H60-H95)														
140	หูชั้นกลางอักเสบและความผิดปกติของหูชั้นกลาง และปมกกหูอื่น ๆ (H65-H75) Otitis media and other disorders of middle ear and mastoid	รวม	688	5.81	594	3.61	817	8.91	985	4.52	569	10.00	3,653	5.62
		ชาย	323	5.55	313	3.91	375	8.29	446	4.10	284	10.54	1,741	5.45
		หญิง	365	6.07	281	3.33	442	9.51	539	4.93	285	9.52	1,912	5.79
141	การสูญเสียการได้ยิน (H90-H91) Hearing loss	รวม	59	0.50	143	0.87	50	0.55	144	0.66	201	3.53	597	0.92
		ชาย	24	0.41	60	0.75	30	0.66	65	0.60	110	4.08	289	0.91
		หญิง	35	0.58	83	0.98	20	0.43	79	0.72	91	3.04	308	0.93
142	โรคของหูและปมกกหูอื่น ๆ (H60-H62, H80-H83, H92-H95) Other diseases of the ear and mastoid process	รวม	2,826	23.88	4,589	27.90	3,678	40.11	6,077	27.86	739	12.99	17,909	27.57
		ชาย	868	14.90	1,280	15.98	1,027	22.71	1,816	16.70	247	9.16	5,238	16.41
		หญิง	1,958	32.57	3,309	39.21	2,651	57.03	4,261	38.96	492	16.43	12,671	38.36
โรกระบบไหลเวียนโลหิต (I00-I99)														
143	ไข้รูมาติกเฉียบพลัน (I00-I02) Acute rheumatic fever	รวม	20	0.17	45	0.27	95	1.04	131	0.60	25	0.44	316	0.49
		ชาย	10	0.17	21	0.26	51	1.13	73	0.67	16	0.59	171	0.54
		หญิง	10	0.17	24	0.28	44	0.95	58	0.53	9	0.30	145	0.44
144	โรคหัวใจรูมาติกเรื้อรัง (I05-I09) Chronic rheumatic heart disease	รวม	875	7.39	657	3.99	435	4.74	1,667	7.64	489	8.60	4,123	6.35
		ชาย	337	5.79	250	3.12	132	2.92	695	6.39	156	5.79	1,570	4.92
		หญิง	538	8.95	407	4.82	303	6.52	972	8.89	333	11.12	2,553	7.73
145	ความดันโลหิตสูงที่ไม่มียาเหตุหน้า (I10) Essential (primary) hypertension	รวม	7,195	60.79	9,462	57.52	6,370	69.47	14,940	68.50	1,584	27.84	39,551	60.89
		ชาย	2,729	46.86	3,303	41.24	2,264	50.07	5,799	53.34	573	21.26	14,668	45.95
		หญิง	4,466	74.28	6,159	72.97	4,106	88.34	9,141	83.57	1,011	33.77	24,883	75.33
146	โรคความดันโลหิตสูงอื่น ๆ (I11-I15) Other hypertensive diseases	รวม	403	3.40	378	2.30	461	5.03	459	2.10	223	3.92	1,924	2.96
		ชาย	161	2.76	143	1.79	211	4.67	194	1.78	95	3.52	804	2.52
		หญิง	242	4.02	235	2.78	250	5.38	265	2.42	128	4.28	1,120	3.39
147	กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (I21-I22) Acute myocardial infarction	รวม	9,204	77.76	13,526	82.23	8,828	96.27	13,564	62.19	4,747	83.44	49,869	76.77
		ชาย	4,809	82.57	7,576	94.59	5,804	128.35	7,963	73.24	2,880	106.86	29,032	90.95
		หญิง	4,395	73.10	5,950	70.50	3,024	65.06	5,601	51.21	1,867	62.36	20,837	63.08
148	โรคหัวใจขาดเลือดอื่น ๆ (I20, I23-I25) Other ischaemic heart diseases	รวม	9,582	80.95	18,100	110.03	8,866	96.69	13,136	60.23	9,439	165.91	59,123	91.02
		ชาย	4,886	83.90	9,961	124.37	5,928	131.10	7,305	67.19	5,631	208.93	33,711	105.60
		หญิง	4,696	78.10	8,139	96.43	2,938	63.21	5,831	53.31	3,808	127.19	25,412	76.93

ตาราง 20 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2557(ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ภาคเหนือ		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.)		ภาคใต้		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพมหานคร		หน่วยนับ : ราย รวมทั้งประเทศ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
149	ก่อนเลือดอุดตันในหลอดเลือดใหญ่ของปอด (I26) Pulmonary embolism	รวม	190	1.61	303	1.84	127	1.38	397	1.82	182	3.20	1,199	1.85
		ชาย	63	1.08	101	1.26	44	0.97	137	1.26	62	2.30	407	1.27
		หญิง	127	2.11	202	2.39	83	1.79	260	2.38	120	4.01	792	2.40
150	ความผิดปกติของการนำกระแสไฟฟ้าหัวใจและหัวใจ เต้นผิดจังหวะ (I44-I49) Conduction disorders and cardiac arrhythmias	รวม	8,302	70.14	9,482	57.64	4,089	44.59	14,479	66.39	2,788	49.00	39,140	60.26
		ชาย	3,324	57.08	3,717	46.41	1,649	36.47	5,784	53.20	1,219	45.23	15,693	49.16
		หญิง	4,978	82.79	5,765	68.31	2,440	52.49	8,695	79.49	1,569	52.40	23,447	70.98
151	หัวใจล้มเหลว (I50) Heart failure	รวม	17,994	152.02	25,354	154.13	13,105	142.91	23,477	107.64	5,664	99.56	85,594	131.77
		ชาย	7,229	124.13	10,057	125.56	5,444	120.39	10,395	95.61	2,488	92.31	35,613	111.56
		หญิง	10,765	179.04	15,297	181.24	7,661	164.82	13,082	119.60	3,176	106.08	49,981	151.31
152	โรคหัวใจอื่น ๆ (I27-I43, I51-I52) Other heart diseases	รวม	2,905	24.54	2,937	17.85	1,749	19.07	4,759	21.82	2,158	37.93	14,508	22.34
		ชาย	1,643	28.21	1,610	20.10	914	20.21	2,637	24.25	1,221	45.30	8,025	25.14
		หญิง	1,262	20.99	1,327	15.72	835	17.96	2,122	19.40	937	31.30	6,483	19.63
153	เลือดออกในสมอง (I60-I62) Intracranial haemorrhage	รวม	7,005	59.18	8,761	53.26	3,907	42.61	8,719	39.98	2,990	52.56	31,382	48.31
		ชาย	4,263	73.20	5,138	64.15	2,305	50.97	5,335	49.07	1,734	64.34	18,775	58.81
		หญิง	2,742	45.61	3,623	42.93	1,602	34.47	3,384	30.94	1,256	41.95	12,607	38.17
154	เนื้อสมองตาย (I63) Cerebral infraction	รวม	12,734	107.58	18,531	112.65	8,778	95.73	21,934	100.57	5,708	100.33	67,685	104.20
		ชาย	6,814	117.00	10,273	128.26	4,981	110.15	11,969	110.09	3,150	116.87	37,187	116.49
		หญิง	5,920	98.46	8,258	97.84	3,797	81.69	9,965	91.10	2,558	85.44	30,498	92.33
155	เป็นลมหมดสติที่ไม่จัดกลุ่มว่าเป็นจากเลือดออกใน สมองหรือเนื้อสมองตายจากการขาดเลือด (I64) Stroke, not specified as haemorrhage or infarction	รวม	1,947	16.45	1,989	12.09	1,669	18.20	4,750	21.78	352	6.19	10,707	16.48
		ชาย	1,103	18.94	1,047	13.07	915	20.24	2,579	23.72	193	7.16	5,837	18.28
		หญิง	844	14.04	942	11.16	754	16.22	2,171	19.85	159	5.31	4,870	14.74
156	โรคหลอดเลือดในสมองอื่น ๆ (I65-I69) Other cerebrovascular diseases	รวม	1,832	15.48	1,411	8.58	1,304	14.22	1,792	8.22	835	14.68	7,174	11.04
		ชาย	954	16.38	756	9.44	743	16.43	943	8.67	420	15.58	3,816	11.95
		หญิง	878	14.60	655	7.76	561	12.07	849	7.76	415	13.86	3,358	10.17
157	อะเทโรสเคลอโรสิส (I70) Atherosclerosis	รวม	107	0.90	125	0.76	74	0.81	65	0.30	364	6.40	735	1.13
		ชาย	57	0.98	72	0.90	38	0.84	37	0.34	187	6.94	391	1.22
		หญิง	50	0.83	53	0.63	36	0.77	28	0.26	177	5.91	344	1.04
158	โรคหลอดเลือดส่วนปลายอื่น ๆ (I73) Other peripheral vascular diseases	รวม	74	0.63	97	0.59	70	0.76	85	0.39	86	1.51	412	0.63
		ชาย	40	0.69	53	0.66	46	1.02	41	0.38	44	1.63	224	0.70
		หญิง	34	0.57	44	0.52	24	0.52	44	0.40	42	1.40	188	0.57

ตาราง 20 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2557(ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ภาคเหนือ		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.)		ภาคใต้		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพมหานคร		หน่วยนับ : ราย รวมทั้งประเทศ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
159	ลิ่มเลือดและก้อนเลือดอุดตันที่หลอดเลือดแดง (I74) Aterial embolism and thrombosis	รวม	558	4.71	695	4.23	400	4.36	824	3.78	437	7.68	2,914	4.49
		ชาย	292	5.01	362	4.52	236	5.22	454	4.18	218	8.09	1,562	4.89
		หญิง	266	4.42	333	3.95	164	3.53	370	3.38	219	7.31	1,352	4.09
160	โรคของหลอดเลือดแดง หลอดเลือดแดงย่อย และ แคปิลารี่อื่น ๆ (I71-I72, I77-I79) Other disease of arteries, arterioles and capillaries	รวม	1,004	8.48	789	4.80	659	7.19	1,239	5.68	936	16.45	4,627	7.12
		ชาย	531	9.12	472	5.89	461	10.19	783	7.20	640	23.75	2,887	9.04
		หญิง	473	7.87	317	3.76	198	4.26	456	4.17	296	9.89	1,740	5.27
161	หลอดเลือดดำอักเสบ หลอดเลือดดำอักเสบมีลิ่มเลือด ก้อนเลือดและลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ (I80-I82) Phlebitis, thrombophlebitis, venous embolism and thrombosis	รวม	649	5.48	782	4.75	405	4.42	1,420	6.51	303	5.33	3,559	5.48
		ชาย	240	4.12	255	3.18	156	3.45	567	5.22	123	4.56	1,341	4.20
		หญิง	409	6.80	527	6.24	249	5.36	853	7.80	180	6.01	2,218	6.71
162	หลอดเลือดดำขอดของระยางส่วนล่าง (I83) Varicose veins of lower extremities	รวม	150	1.27	281	1.71	144	1.57	147	0.67	251	4.41	973	1.50
		ชาย	62	1.06	102	1.27	50	1.11	62	0.57	79	2.93	355	1.11
		หญิง	88	1.46	179	2.12	94	2.02	85	0.78	172	5.74	618	1.87
163	ริดสีดวงทวาร (I84) Haemorrhoids	รวม	2,018	17.05	2,057	12.50	1,264	13.78	3,067	14.06	719	12.64	9,125	14.05
		ชาย	1,244	21.36	1,217	15.19	715	15.81	1,741	16.01	406	15.06	5,323	16.67
		หญิง	774	12.87	840	9.95	549	11.81	1,326	12.12	313	10.45	3,802	11.51
164	โรคอื่น ๆ ของระบบไหลเวียนโลหิต (I85-I99) Other diseases of the circulatory system	รวม	4,269	36.07	3,824	23.25	1,265	13.80	3,744	17.17	906	15.92	14,008	21.57
		ชาย	2,670	45.85	2,366	29.54	771	17.05	2,372	21.82	553	20.52	8,732	27.35
		หญิง	1,599	26.59	1,458	17.27	494	10.63	1,372	12.54	353	11.79	5,276	15.97
โรกระบบหายใจ (J00-J99)														
165	คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบ เฉียบพลัน (J02-J03) Acute pharyngitis and acute tonsillitis	รวม	13,406	113.26	17,434	105.99	11,913	129.91	19,024	87.22	2,055	36.12	63,832	98.27
		ชาย	7,208	123.77	9,360	116.86	6,118	135.30	9,775	89.91	1,102	40.89	33,563	105.14
		หญิง	6,198	103.09	8,074	95.66	5,795	124.67	9,249	84.56	953	31.83	30,269	91.63
166	กล่องเสียงและหลอดลมใหญ่อักเสบเฉียบพลัน (J04) Acute laryngitis and tracheitis	รวม	86	0.73	111	0.67	58	0.63	180	0.83	47	0.83	482	0.74
		ชาย	37	0.64	60	0.75	34	0.75	107	0.98	25	0.93	263	0.82
		หญิง	49	0.81	51	0.60	24	0.52	73	0.67	22	0.73	219	0.66
167	การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลัน อื่น ๆ (J00-J01, J05-J06) Other acute upper respiratory infections	รวม	7,079	59.81	9,731	59.16	7,391	80.60	13,534	62.05	1,867	32.82	39,602	60.97
		ชาย	4,017	68.98	5,935	74.10	3,854	85.23	7,758	71.36	1,052	39.03	22,616	70.85
		หญิง	3,062	50.93	3,796	44.98	3,537	76.10	5,776	52.81	815	27.22	16,986	51.42

ตาราง 20 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2557(ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ภาคเหนือ		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.)		ภาคใต้		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพมหานคร		รวมทั้งประเทศ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
168	ไข้หวัดใหญ่ (J10-J11) Influenza	รวม	3,485	29.44	5,050	30.70	2,661	29.02	5,348	24.52	1,847	32.46	18,391	28.31
		ชาย	1,838	31.56	2,738	34.18	1,324	29.28	2,631	24.20	946	35.10	9,477	29.69
		หญิง	1,647	27.39	2,312	27.39	1,337	28.76	2,717	24.84	901	30.09	8,914	26.99
169	ปอดบวม (J12-J18) Pneumonia	รวม	47,221	398.95	62,062	377.29	39,408	429.75	109,941	504.08	11,509	202.29	270,141	415.89
		ชาย	26,214	450.12	33,877	422.96	22,065	487.96	59,558	547.80	6,444	239.09	148,158	464.12
		หญิง	21,007	349.39	28,185	333.95	17,343	373.12	50,383	460.61	5,065	169.17	121,983	369.28
170	หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบ เฉียบพลัน (J20-J21) Acute bronchitis and acute bronchiolitis	รวม	23,789	200.98	27,282	165.85	22,914	249.88	50,852	233.16	4,110	72.24	128,947	198.52
		ชาย	13,366	229.51	14,877	185.74	12,838	283.91	28,416	261.37	2,287	84.85	71,784	224.87
		หญิง	10,423	173.36	12,405	146.98	10,076	216.78	22,436	205.12	1,823	60.89	57,163	173.05
171	ไซนัสอักเสบเรื้อรัง (J32) Chronic sinusitis	รวม	404	3.41	442	2.69	199	2.17	531	2.43	292	5.13	1,868	2.88
		ชาย	186	3.19	227	2.83	112	2.48	238	2.19	135	5.01	898	2.81
		หญิง	218	3.63	215	2.55	87	1.87	293	2.68	157	5.24	970	2.94
172	โรคอื่นของจมูกและไซนัส (J30-J31, J33-J34) Other diseases of nose and nasal sinuses	รวม	548	4.63	543	3.30	360	3.93	926	4.25	447	7.86	2,824	4.35
		ชาย	321	5.51	314	3.92	216	4.78	539	4.96	274	10.17	1,664	5.21
		หญิง	227	3.78	229	2.71	144	3.10	387	3.54	173	5.78	1,160	3.51
173	โรคเรื้อรังของต่อมทอนซิลและต่อมทอนซิลในคอ (J35) Chronic diseases of tonsils and adenoids	รวม	1,012	8.55	1,375	8.36	1,072	11.69	1,816	8.33	971	17.07	6,246	9.62
		ชาย	552	9.48	766	9.56	525	11.61	904	8.31	580	21.52	3,327	10.42
		หญิง	460	7.65	609	7.22	547	11.77	912	8.34	391	13.06	2,919	8.84
174	โรคอื่น ๆ ของระบบหายใจส่วนบน (J36-J39) Other diseases of upper respiratory tract	รวม	686	5.80	671	4.08	657	7.16	1,198	5.49	627	11.02	3,839	5.91
		ชาย	399	6.85	411	5.13	406	8.98	703	6.47	361	13.39	2,280	7.14
		หญิง	287	4.77	260	3.08	251	5.40	495	4.53	266	8.88	1,559	4.72
175	โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิด อุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น (J40-J44) Bronchitis, emphysema and other chronic obstructive pulmonary diseases	รวม	38,702	326.98	25,387	154.33	25,573	278.88	32,776	150.28	3,541	62.24	125,979	193.95
		ชาย	24,149	414.66	19,838	247.68	19,417	429.40	25,886	238.10	2,614	96.99	91,904	287.90
		หญิง	14,553	242.05	5,549	65.75	6,156	132.44	6,890	62.99	927	30.96	34,075	103.15
176	โรคหืด (J45-J46) Asthma	รวม	7,465	63.07	12,542	76.25	10,657	116.22	16,113	73.88	2,599	45.68	49,376	76.02
		ชาย	3,028	51.99	4,846	60.50	4,038	89.30	6,187	56.91	1,150	42.67	19,249	60.30
		หญิง	4,437	73.80	7,696	91.19	6,619	142.40	9,926	90.75	1,449	48.40	30,127	91.20
177	โรคหลอดลมเล็กโป่งพอง (J47) Bronchioectasis	รวม	1,264	10.68	1,283	7.80	924	10.08	3,827	17.55	361	6.35	7,659	11.79
		ชาย	646	11.09	598	7.47	399	8.82	1,762	16.21	172	6.38	3,577	11.21
		หญิง	618	10.28	685	8.12	525	11.29	2,065	18.88	189	6.31	4,082	12.36

ตาราง 20 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2557(ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ภาคเหนือ		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.)		ภาคใต้		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพมหานคร		หน่วยนับ : ราย	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	รวมทั้งประเทศ	จำนวน
178	โรคปอดสะสมในปอด (J60-J65) Pneumoconiosis	รวม	17	0.14	11	0.07	7	0.08	56	0.26	0	0.00	91	0.14
		ชาย	11	0.19	5	0.06	3	0.07	53	0.49	0	0.00	72	0.23
		หญิง	6	0.10	6	0.07	4	0.09	3	0.03	0	0.00	19	0.06
179	โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินหายใจ (J22, J66-J99) Other diseases of the respiratory system	รวม	8,270	69.87	8,426	51.22	5,151	56.17	11,620	53.28	3,110	54.66	36,577	56.31
		ชาย	5,146	88.36	5,132	64.07	3,097	68.49	7,448	68.51	1,784	66.19	22,607	70.82
		หญิง	3,124	51.96	3,294	39.03	2,054	44.19	4,172	38.14	1,326	44.29	13,970	42.29
โรกระบบย่อยอาหาร (K00-K93)														
180	ฟันผุ (K02) Dental caries	รวม	142	1.20	161	0.98	152	1.66	199	0.91	122	2.14	776	1.19
		ชาย	80	1.37	91	1.14	86	1.90	102	0.94	68	2.52	427	1.34
		หญิง	62	1.03	70	0.83	66	1.42	97	0.89	54	1.80	349	1.06
181	ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง (K00-K01, K03-K08) Other disorders of teeth and supporting structures	รวม	898	7.59	971	5.90	702	7.66	1,778	8.15	249	4.38	4,598	7.08
		ชาย	453	7.78	501	6.26	339	7.50	864	7.95	141	5.23	2,298	7.20
		หญิง	445	7.40	470	5.57	363	7.81	914	8.36	108	3.61	2,300	6.96
182	โรคอื่น ๆ ของช่องปาก คอมน้ำลายและขากรรไกร (K09-K14) Other diseases of the oral cavity, salivary glands and jaws	รวม	1,838	15.53	1,685	10.24	1,256	13.70	4,664	21.38	555	9.76	9,998	15.39
		ชาย	940	16.14	874	10.91	684	15.13	2,257	20.76	285	10.57	5,040	15.79
		หญิง	898	14.94	811	9.61	572	12.31	2,407	22.01	270	9.02	4,958	15.01
183	แผลเยื่อของกระเพาะอาหารดูโอเดนิ้ม (K25-K27) Gastric and duodenal ulcer	รวม	6,818	57.60	7,135	43.38	2,327	25.38	9,379	43.00	1,879	33.03	27,538	42.40
		ชาย	4,574	78.54	4,584	57.23	1,419	31.38	6,721	61.82	1,177	43.67	18,475	57.87
		หญิง	2,244	37.32	2,551	30.23	908	19.53	2,658	24.30	702	23.45	9,063	27.44
184	กระเพาะอาหารอักเสบและดูโอเดนิ้มอักเสบ (K29) Gastritis and duodenitis	รวม	10,164	85.87	13,807	83.94	8,791	95.87	19,325	88.60	2,474	43.49	54,561	84.00
		ชาย	5,442	93.44	7,081	88.41	4,352	96.24	10,370	95.38	1,282	47.57	28,527	89.36
		หญิง	4,722	78.54	6,726	79.69	4,439	95.50	8,955	81.87	1,192	39.81	26,034	78.81
185	โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนิ้ม (K20-K23, K28, K30-K31) Other diseases of oesophagus, stomach and duodenum	รวม	13,077	110.48	12,837	78.04	14,061	153.34	29,985	137.48	1,786	31.39	71,746	110.45
		ชาย	5,783	99.30	5,737	71.63	6,047	133.73	13,611	125.19	859	31.87	32,037	100.36
		หญิง	7,294	121.31	7,100	84.12	8,014	172.41	16,374	149.70	927	30.96	39,709	120.21
186	โรคของไส้ติ่ง (K35-K38) Diseases of appEndix	รวม	17,396	146.97	17,581	106.88	10,721	116.91	31,134	142.75	4,940	86.83	81,772	125.89
		ชาย	8,342	143.24	8,797	109.83	5,282	116.81	14,186	130.48	2,630	97.58	39,237	122.91
		หญิง	9,054	150.59	8,784	104.08	5,439	117.02	16,948	154.94	2,310	77.15	42,535	128.77

ตาราง 20 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2557(ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ภาคเหนือ		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.)		ภาคใต้		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพมหานคร		หน่วยนับ : ราย รวมทั้งประเทศ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
187	ไส้เลื่อนที่บริเวณขาหนีบ (K40) Inguinal hernia	รวม	6,210	52.47	5,976	36.33	3,952	43.10	8,557	39.23	2,316	40.71	27,011	41.58
		ชาย	5,899	101.29	5,660	70.67	3,686	81.52	8,079	74.31	2,171	80.55	25,495	79.87
		หญิง	311	5.17	316	3.74	266	5.72	478	4.37	145	4.84	1,516	4.59
188	ไส้เลื่อนอื่น ๆ (K41-K46) Other hernia	รวม	694	5.86	774	4.71	441	4.81	642	2.94	459	8.07	3,010	4.63
		ชาย	260	4.46	341	4.26	170	3.76	312	2.87	184	6.83	1,267	3.97
		หญิง	434	7.22	433	5.13	271	5.83	330	3.02	275	9.18	1,743	5.28
189	โรคโครนและลำไส้ใหญ่อักเสบแผลเปื่อย (K50-K51) Crohn's disease and ulcerative colitis	รวม	138	1.17	130	0.79	62	0.68	178	0.82	126	2.21	634	0.98
		ชาย	60	1.03	60	0.75	35	0.77	91	0.84	73	2.71	319	1.00
		หญิง	78	1.30	70	0.83	27	0.58	87	0.80	53	1.77	315	0.95
190	ลำไส้ไม่ทำงานและลำไส้เกิดอุดตันแบบไม่มีไส้เลื่อน (K56) Paralytic ileus and intestinal obstruction without hernia	รวม	4,396	37.14	4,106	24.96	2,660	29.01	7,245	33.22	1,202	21.13	19,609	30.19
		ชาย	2,673	45.90	2,487	31.05	1,773	39.21	4,599	42.30	619	22.97	12,151	38.06
		หญิง	1,723	28.66	1,619	19.18	887	19.08	2,646	24.19	583	19.47	7,458	22.58
191	โรคถุงเนื้อของลำไส้ (K57) Diverticular disease of intestine	รวม	799	6.75	970	5.90	378	4.12	939	4.31	492	8.65	3,578	5.51
		ชาย	368	6.32	428	5.34	194	4.29	460	4.23	246	9.13	1,696	5.31
		หญิง	431	7.17	542	6.42	184	3.96	479	4.38	246	8.22	1,882	5.70
192	โรคอื่น ๆ ของลำไส้และเยื่อช่องท้อง (K52-K55, K58-K67) Other diseases of intestine and peritoneum	รวม	8,311	70.22	9,438	57.38	5,677	61.91	13,578	62.25	3,224	56.67	40,228	61.93
		ชาย	4,756	81.66	5,275	65.86	3,130	69.22	7,759	71.37	1,876	69.60	22,796	71.41
		หญิง	3,555	59.13	4,163	49.32	2,547	54.80	5,819	53.20	1,348	45.02	17,432	52.77
193	โรคตับเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ (K70) Alcoholic liver disease	รวม	2,196	18.55	2,935	17.84	930	10.14	3,959	18.15	654	11.50	10,674	16.43
		ชาย	1,700	29.19	2,067	25.81	801	17.71	3,018	27.76	504	18.70	8,090	25.34
		หญิง	496	8.25	868	10.28	129	2.78	941	8.60	150	5.01	2,584	7.82
194	โรคอื่น ๆ ของตับ (K71-K77) Other disease of liver	รวม	5,294	44.73	5,719	34.77	2,667	29.08	9,654	44.26	1,741	30.60	25,075	38.60
		ชาย	3,253	55.86	3,115	38.89	1,642	36.31	6,007	55.25	960	35.62	14,977	46.92
		หญิง	2,041	33.95	2,604	30.85	1,025	22.05	3,647	33.34	781	26.09	10,098	30.57
195	โรคนิ่วในระบบน้ำดีและถุงน้ำดีอักเสบ (K80-K81) Cholelithiasis and cholecystitis	รวม	8,182	69.13	8,778	53.36	3,512	38.30	17,638	80.87	3,943	69.31	42,053	64.74
		ชาย	3,164	54.33	3,297	41.16	1,196	26.45	6,983	64.23	1,615	59.92	16,255	50.92
		หญิง	5,018	83.46	5,481	64.94	2,316	49.83	10,655	97.41	2,328	77.75	25,798	78.10
196	ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันและโรคอื่น ๆ ของตับอ่อน (K85-K86) Acute pancreatitis and other disease of the pancreas	รวม	2,761	23.33	3,313	20.14	1,232	13.44	3,866	17.73	1,173	20.62	12,345	19.01
		ชาย	2,161	37.11	2,430	30.34	882	19.51	3,067	28.21	813	30.16	9,353	29.30
		หญิง	600	9.98	883	10.46	350	7.53	799	7.30	360	12.02	2,992	9.06

ตาราง 20 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2557(ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ภาคเหนือ		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.)		ภาคใต้		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพมหานคร		หน่วยนับ : ราย	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	รวมทั้งประเทศ	จำนวน
197	โรคอื่น ๆ ของระบบย่อยอาหาร (K82-K83, K87-K93) Other diseases of the digestive system	รวม	15,511	131.05	14,961	90.95	5,561	60.64	20,690	94.86	3,176	55.82	59,899	92.22
		ชาย	10,333	177.43	9,214	115.04	3,431	75.88	13,958	128.38	1,870	69.38	38,806	121.56
		หญิง	5,178	86.12	5,747	68.09	2,130	45.83	6,732	61.55	1,306	43.62	21,093	63.85
โรคของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (L00-L99)														
198	โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (L00-L08) Infection of the skin and subcutaneous tissue	รวม	17,104	144.50	20,895	127.03	15,278	166.61	39,042	179.01	3,330	58.53	95,649	147.25
		ชาย	9,787	168.05	11,063	138.12	8,514	188.29	22,582	207.71	1,773	65.78	53,719	168.28
		หญิง	7,317	121.70	9,832	116.49	6,764	145.52	16,460	150.48	1,557	52.00	41,930	126.93
199	โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (L10-L99) Other diseases of the skin and subcutaneous tissue	รวม	7,425	62.73	8,825	53.65	4,569	49.83	11,680	53.55	2,506	44.05	35,005	53.89
		ชาย	3,922	67.34	4,462	55.71	2,364	52.28	6,312	58.06	1,300	48.23	18,360	57.51
		หญิง	3,503	58.26	4,363	51.69	2,205	47.44	5,368	49.08	1,206	40.28	16,645	50.39
โรคระบบกล้ามเนื้อโครงร่างและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (M00-M99)														
200	ข้ออักเสบรูมาตอยและข้ออักเสบหลายข้อ (M05-M14) Rheumatoid arthritis and other inflammatory polyarthropathies	รวม	3,087	26.08	2,515	15.29	1,669	18.20	5,600	25.68	721	12.67	13,592	20.93
		ชาย	1,777	30.51	1,484	18.53	1,055	23.33	3,238	29.78	338	12.54	7,892	24.72
		หญิง	1,310	21.79	1,031	12.22	614	13.21	2,362	21.59	383	12.79	5,700	17.26
201	โรคข้อเสื่อม (M15-M19) Arthrosis	รวม	4,911	41.49	6,000	36.48	1,275	13.90	2,096	9.61	3,740	65.74	18,022	27.75
		ชาย	1,021	17.53	1,011	12.62	232	5.13	545	5.01	603	22.37	3,412	10.69
		หญิง	3,890	64.70	4,989	59.11	1,043	22.44	1,551	14.18	3,137	104.77	14,610	44.23
202	ความพิการของแขนขา (M20-M21) Acquired deformities of limbs	รวม	116	0.98	151	0.92	90	0.98	155	0.71	345	6.06	857	1.32
		ชาย	55	0.94	66	0.82	51	1.13	83	0.76	147	5.45	402	1.26
		หญิง	61	1.01	85	1.01	39	0.84	72	0.66	198	6.61	455	1.38
203	ความผิดปกติอื่น ๆ ของข้อ (M00-M03, M22-M25) Other disorders of joints	รวม	2,834	23.94	2,419	14.71	1,262	13.76	4,447	20.39	1,233	21.67	12,195	18.77
		ชาย	1,613	27.70	1,400	17.48	826	18.27	2,597	23.89	791	29.35	7,227	22.64
		หญิง	1,221	20.31	1,019	12.07	436	9.38	1,850	16.91	442	14.76	4,968	15.04
204	ความผิดปกติของระบบเนื้อเยื่อประสาน (M30-M36) Systemic connective tissue disorders	รวม	1,689	14.27	1,490	9.06	829	9.04	2,681	12.29	1,154	20.28	7,843	12.07
		ชาย	383	6.58	357	4.46	150	3.32	507	4.66	300	11.13	1,697	5.32
		หญิง	1,306	21.72	1,133	13.42	679	14.61	2,174	19.88	854	28.52	6,146	18.61
205	กระดูกสันหลังและหมอนรองกระดูกสันหลังอื่น ๆ ผิดปกติ (M50-M51) Cervical and other intervertebral disc disorders	รวม	1,392	11.76	1,003	6.10	702	7.66	2,024	9.28	676	11.88	5,797	8.92
		ชาย	669	11.49	497	6.21	383	8.47	1,082	9.95	355	13.17	2,986	9.35
		หญิง	723	12.02	506	6.00	319	6.86	942	8.61	321	10.72	2,811	8.51

ตาราง 20 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2557(ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ภาคเหนือ		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.)		ภาคใต้		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพมหานคร		หน่วยนับ : ราย รวมทั้งประเทศ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
206	พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ (M40-M49, M53-M54) Other dorsopathies	รวม	8,451	71.40	4,804	29.20	2,797	30.50	7,284	33.40	2,726	47.91	26,062	40.12
		ชาย	3,076	52.82	1,784	22.27	1,198	26.49	3,000	27.59	1,050	38.96	10,108	31.66
		หญิง	5,375	89.40	3,020	35.78	1,599	34.40	4,284	39.17	1,676	55.98	15,954	48.30
207	เนื้อเยื่อผิดปกติ (M60-M79) Soft tissue disorders	รวม	8,167	69.00	6,854	41.67	5,074	55.33	18,092	82.95	2,157	37.91	40,344	62.11
		ชาย	3,896	66.90	3,617	45.16	2,562	56.66	9,678	89.02	1,025	38.03	20,778	65.09
		หญิง	4,271	71.04	3,237	38.35	2,512	54.04	8,414	76.92	1,132	37.81	19,566	59.23
208	ความผิดปกติของความหนาแน่นของเนื้อกระดูก และ โครงสร้าง (M80-M85) Disorders of bone density and structure	รวม	1,070	9.04	797	4.85	677	7.38	1,396	6.40	609	10.70	4,549	7.00
		ชาย	441	7.57	362	4.52	353	7.81	657	6.04	286	10.61	2,099	6.58
		หญิง	629	10.46	435	5.15	324	6.97	739	6.76	323	10.79	2,450	7.42
209	กระดูกอักเสบ (M86) Osteomyelitis	รวม	1,325	11.19	1,440	8.75	694	7.57	2,488	11.41	426	7.49	6,373	9.81
		ชาย	847	14.54	883	11.02	431	9.53	1,506	13.85	275	10.20	3,942	12.35
		หญิง	478	7.95	557	6.60	263	5.66	982	8.98	151	5.04	2,431	7.36
210	โรคอื่น ๆ ของระบบกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อประสาน (M87-M99) Other diseases of the musculoskeletal system and connective tissue	รวม	1,303	11.01	1,416	8.61	882	9.62	1,787	8.19	745	13.09	6,133	9.44
		ชาย	670	11.50	650	8.12	463	10.24	1,000	9.20	362	13.43	3,145	9.85
		หญิง	633	10.53	766	9.08	419	9.01	787	7.19	383	12.79	2,988	9.05
โรคของระบบสืบพันธุ์และปัสสาวะ (N00-N99)														
211	กลุ่มอาการไตอักเสบเฉียบพลันและชนิดกำเริบเร็ว (N00-N01) Acute and rapidly progressive nephritic syndromes	รวม	355	3.00	513	3.12	823	8.97	1,072	4.92	162	2.85	2,925	4.50
		ชาย	205	3.52	310	3.87	495	10.95	649	5.97	101	3.75	1,760	5.51
		หญิง	150	2.49	203	2.41	328	7.06	423	3.87	61	2.04	1,165	3.53
212	โรคของหน่วยไตอื่น ๆ (N02-N08) Other glomerular diseases	รวม	958	8.09	1,000	6.08	1,026	11.19	1,725	7.91	514	9.03	5,223	8.04
		ชาย	538	9.24	540	6.74	588	13.00	923	8.49	297	11.02	2,886	9.04
		หญิง	420	6.99	460	5.45	438	9.42	802	7.33	217	7.25	2,337	7.07
213	โรคของท่อและเนื้อเยื่อระหว่างท่อในไต (N10-N16) Renal tubulo-interstitial diseases	รวม	14,951	126.31	13,386	81.38	8,306	90.58	24,871	114.03	2,805	49.30	64,319	99.02
		ชาย	5,353	91.92	3,588	44.80	2,138	47.28	8,859	81.48	905	33.58	20,843	65.29
		หญิง	9,598	159.63	9,798	116.09	6,168	132.70	16,012	146.39	1,900	63.46	43,476	131.61
214	ไตวาย (N17-N19) Renal failure	รวม	21,949	185.44	18,370	111.68	8,437	92.01	50,624	232.11	4,762	83.70	104,142	160.33
		ชาย	10,261	176.19	8,110	101.26	3,998	88.42	20,163	185.46	2,300	85.34	44,832	140.44
		หญิง	11,688	194.40	10,260	121.56	4,439	95.50	30,461	278.48	2,462	82.23	59,310	179.55

ตาราง 20 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2557(ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ภาคเหนือ		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.)		ภาคใต้		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพมหานคร		หน่วยนับ : ราย รวมทั้งประเทศ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
215	นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ (N20-N23) Urolithiasis	รวม	9,981	84.33	3,901	23.72	4,287	46.75	15,130	69.37	1,259	22.13	34,558	53.20
		ชาย	6,678	114.67	2,288	28.57	2,432	53.78	9,488	87.27	697	25.86	21,583	67.61
		หญิง	3,303	54.94	1,613	19.11	1,855	39.91	5,642	51.58	562	18.77	12,975	39.28
216	กระเพาะปัสสาวะอักเสบ (N30) Cystitis	รวม	2,578	21.78	2,077	12.63	1,539	16.78	3,512	16.10	340	5.98	10,046	15.47
		ชาย	759	13.03	536	6.69	344	7.61	1,111	10.22	91	3.38	2,841	8.90
		หญิง	1,819	30.25	1,541	18.26	1,195	25.71	2,401	21.95	249	8.32	7,205	21.81
217	โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะ (N25-N29, N31-N39) Other diseases of the urinary system	รวม	17,026	143.85	19,350	117.63	9,197	100.29	23,518	107.83	5,299	93.14	74,390	114.52
		ชาย	6,833	117.33	6,741	84.16	3,361	74.33	9,427	86.71	2,110	78.29	28,472	89.19
		หญิง	10,193	169.53	12,609	149.40	5,836	125.56	14,091	128.82	3,189	106.51	45,918	139.01
218	ต่อมลูกหมากโตจากการเพิ่มจำนวนเซลล์ (N40) Hyperplasia of prostate	รวม	1,664	28.57	1,734	21.65	1,128	24.95	2,232	20.53	1,235	45.82	7,993	25.04
		ชาย	1,664	28.57	1,734	21.65	1,128	24.95	2,232	20.53	1,235	45.82	7,993	25.04
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
219	ความผิดปกติอื่น ๆ ของต่อมลูกหมาก (N41-N42) Other disorders of prostate	รวม	74	1.27	64	0.80	19	0.42	95	0.87	87	3.23	339	1.06
		ชาย	74	1.27	64	0.80	19	0.42	95	0.87	87	3.23	339	1.06
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
220	ถุงน้ำและถุงที่มีอสุจิที่อักเสบ (N43) Hydrocele and spermatocele	รวม	495	8.50	468	5.84	349	7.72	797	7.33	198	7.35	2,307	7.23
		ชาย	495	8.50	468	5.84	349	7.72	797	7.33	198	7.35	2,307	7.23
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
221	หนังหุ้มปลายองคชาตยาวเกินไป ปลายตีบรูเปิดไม่ได้หรือเปิดลำบาก (N47) Redundant prepuce, phimosis and paraphimosis	รวม	676	11.61	663	8.28	283	6.26	1,105	10.16	192	7.12	2,919	9.14
		ชาย	676	11.61	663	8.28	283	6.26	1,105	10.16	192	7.12	2,919	9.14
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
222	โรคอื่น ๆ ของอวัยวะสืบพันธุ์ชาย (N44-N46, N48-N51) Other disease of male genital organs	รวม	1,278	21.94	1,516	18.93	1,095	24.22	2,887	26.55	322	11.95	7,098	22.24
		ชาย	1,278	21.94	1,516	18.93	1,095	24.22	2,887	26.55	322	11.95	7,098	22.24
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
223	ความผิดปกติของเต้านม (N60-N64) Disorders of breast	รวม	1,282	10.83	1,167	7.09	1,185	12.92	2,275	10.43	537	9.44	6,446	9.92
		ชาย	72	1.24	74	0.92	82	1.81	153	1.41	37	1.37	418	1.31
		หญิง	1,210	20.12	1,093	12.95	1,103	23.73	2,122	19.40	500	16.70	6,028	18.25
224	ปีกมดลูกและรังไข่อักเสบ (N70) Salpingitis and oophoritis	รวม	283	4.71	387	4.59	172	3.70	512	4.68	173	5.78	1,527	4.62
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	283	4.71	387	4.59	172	3.70	512	4.68	173	5.78	1,527	4.62

ตาราง 20 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2557(ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ภาคเหนือ		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.)		ภาคใต้		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพมหานคร		หน่วยนับ : ราย รวมทั้งประเทศ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
225	ปากมดลูกอักเสบ (N72) Inflammatory disease of cervix uteri	รวม	33	0.55	46	0.55	43	0.93	61	0.56	12	0.40	195	0.59
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	33	0.55	46	0.55	43	0.93	61	0.56	12	0.40	195	0.59
226	การอักเสบอื่น ๆ ของอวัยวะในอุ้งเชิงกรานสตรี (N71, N73-N77) Other inflammatory diseases of female pelvic organs	รวม	1,835	30.52	2,492	29.53	1,705	36.68	3,447	31.51	530	17.70	10,009	30.30
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	1,835	30.52	2,492	29.53	1,705	36.68	3,447	31.51	530	17.70	10,009	30.30
227	เยื่อบุมดลูกอักเสบ (N80) Endometriosis	รวม	1,012	16.83	968	11.47	906	19.49	2,127	19.45	894	29.86	5,907	17.88
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	1,012	16.83	968	11.47	906	19.49	2,127	19.45	894	29.86	5,907	17.88
228	การหย่อนตัวของอวัยวะสืบพันธุ์สตรี (N81) Female genital prolapse	รวม	680	11.31	527	6.24	316	6.80	1,194	10.92	451	15.06	3,168	9.59
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	680	11.31	527	6.24	316	6.80	1,194	10.92	451	15.06	3,168	9.59
229	ความผิดปกติอื่นที่ไม่ใช่การอักเสบของรังไข่ท่อนำไข่และเอ็นยึดมดลูก (N83) Noninflammatory disorder of ovary, fallopian tube and broad ligament	รวม	737	12.26	1,005	11.91	692	14.89	1,474	13.48	369	12.32	4,277	12.95
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	737	12.26	1,005	11.91	692	14.89	1,474	13.48	369	12.32	4,277	12.95
230	ความผิดปกติของระดู (N91-N92) Disorder of menstruation	รวม	929	15.45	1,201	14.23	1,062	22.85	1,847	16.89	203	6.78	5,242	15.87
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	929	15.45	1,201	14.23	1,062	22.85	1,847	16.89	203	6.78	5,242	15.87
231	การหมดประจำเดือนและความผิดปกติอื่นในระยะหมดประจำเดือน (N95) Menopausal and other perimenopausal disorders	รวม	567	9.43	663	7.86	540	11.62	882	8.06	173	5.78	2,825	8.55
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	567	9.43	663	7.86	540	11.62	882	8.06	173	5.78	2,825	8.55
232	ภาวะมีบุตรยากในสตรี (N97) Female infertility	รวม	4	0.07	3	0.04	3	0.06	11	0.10	1	0.03	22	0.07
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	4	0.07	3	0.04	3	0.06	11	0.10	1	0.03	22	0.07
233	ความผิดปกติอื่น ๆ ของท่อนำเดินปัสสาวะและสืบพันธุ์ (N82, N84-N90, N93-N94, N96, N98-N99) Other disorders of genitourinary tract	รวม	2,922	48.60	2,751	32.59	2,352	50.60	4,812	43.99	926	30.93	13,763	41.66
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	2,922	48.60	2,751	32.59	2,352	50.60	4,812	43.99	926	30.93	13,763	41.66

ตาราง 20 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2557(ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ภาคเหนือ		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.)		ภาคใต้		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพมหานคร		หน่วยนับ : ราย	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	รวมทั้งประเทศ	จำนวน
การตั้งครรภ์ การคลอดและระยะหลังคลอด (O00-O99)														
234	แท้งเอง (O03) Spontaneous abortion	รวม	1,583	26.33	3,038	36.00	3,214	69.15	4,413	40.34	1,012	33.80	13,260	40.14
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	1,583	26.33	3,038	36.00	3,214	69.15	4,413	40.34	1,012	33.80	13,260	40.14
235	การทำแท้งโดยเหตุผลทางการแพทย์ (O04) Medical abortion	รวม	231	3.84	149	1.77	117	2.52	626	5.72	82	2.74	1,205	3.65
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	231	3.84	149	1.77	117	2.52	626	5.72	82	2.74	1,205	3.65
236	การตั้งครรภ์อื่น ๆ ที่สิ้นสุดโดยการแท้ง (O00-O02, O05-O08) Other pregnancies with abortive outcome	รวม	4,119	68.51	4,941	58.54	5,999	129.06	6,793	62.10	1,341	44.79	23,193	70.21
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	4,119	68.51	4,941	58.54	5,999	129.06	6,793	62.10	1,341	44.79	23,193	70.21
237	การบวม การมีโปรตีนในปัสสาวะ และความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ระยะคลอด และระยะหลังคลอด (O10-O16) Oedema, proteinuria and hypertensive disorders in pregnancy, childbirth and the puerperium	รวม	1,829	30.42	3,158	37.42	3,355	72.18	4,467	40.84	729	24.35	13,538	40.98
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	1,829	30.42	3,158	37.42	3,355	72.18	4,467	40.84	729	24.35	13,538	40.98
238	รกเกาะต่ำ รกลอกตัวก่อนกำหนด และตกเลือดก่อนคลอด (O44-O46) Placenta praevia, premature separation of placenta and antepartum haemorrhage	รวม	655	10.89	883	10.46	1,079	23.21	1,315	12.02	187	6.25	4,119	12.47
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	655	10.89	883	10.46	1,079	23.21	1,315	12.02	187	6.25	4,119	12.47
239	การดูแล มารดาอื่นๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ์ และถุงน้ำคร่ำ และปัญหาที่อาจจะเกิดได้ในระยะคลอด (O30-O43, O47-O48) Other maternal care related to fetus and amniotic cavity and possible delivery problems	รวม	17,336	288.33	22,430	265.76	25,636	551.54	33,087	302.49	5,787	193.28	104,276	315.67
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	17,336	288.33	22,430	265.76	25,636	551.54	33,087	302.49	5,787	193.28	104,276	315.67
240	การคลอดติดขัด (O64-O66) Obstructed labour	รวม	3,653	60.76	4,256	50.43	4,603	99.03	9,916	90.65	1,268	42.35	23,696	71.73
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	3,653	60.76	4,256	50.43	4,603	99.03	9,916	90.65	1,268	42.35	23,696	71.73
241	ตกเลือดหลังคลอด (O72) Postpartum haemorrhage	รวม	1,177	19.58	1,387	16.43	1,541	33.15	2,219	20.29	199	6.65	6,523	19.75
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	1,177	19.58	1,387	16.43	1,541	33.15	2,219	20.29	199	6.65	6,523	19.75

ตาราง 20 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2557(ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ภาคเหนือ		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.)		ภาคใต้		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพมหานคร		หน่วยนับ : ราย รวมทั้งประเทศ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
242	ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆของการตั้งครรภ์ และการคลอด (O20-O29, O60-O63, O67-O71, O73-O75, O81-O84) Other complications of pregnancy and delivery	รวม	16,034	266.68	21,904	259.53	31,482	677.31	32,815	300.00	5,185	173.18	107,420	325.19
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	16,034	266.68	21,904	259.53	31,482	677.31	32,815	300.00	5,185	173.18	107,420	325.19
243	การคลอดของครรภ์เดียว (O80) Single spontaneous delivery	รวม	26,618	442.71	36,130	428.08	34,100	733.63	61,404	561.37	5,358	178.96	163,610	495.30
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	26,618	442.71	36,130	428.08	34,100	733.63	61,404	561.37	5,358	178.96	163,610	495.30
244	ภาวะแทรกซ้อนที่ส่วนใหญ่พบในระยะหลังคลอด และภาวะทางสูติกรรมอื่น ๆ ที่มีได้ระบุรายละเอียด (O85-O99) Complications predominantly related to the puerperium and other obstetric conditions, not Elsewhere classified	รวม	3,266	54.32	4,533	53.71	5,989	128.85	7,445	68.06	1,496	49.97	22,729	68.81
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	3,266	54.32	4,533	53.71	5,989	128.85	7,445	68.06	1,496	49.97	22,729	68.81
ภาวะบางอย่างที่เกิดในระยะปริกำเนิด (P00-P96)														
245	ทารกในครรภ์และแรกเกิดที่ได้รับผลจากปัจจัยทาง มารดา และโรคแทรกในระยะตั้งครรภ์ เจริญครรภ์ และคลอด (P00-P04) Fetus and newborn affected by maternal factors and by complications of pregnancy, labor and delivery	รวม	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
246	ทารกในครรภ์โตช้าทารกในครรภ์ขาดสารอาหาร และความผิดปกติเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ระยะสั้นและ น้ำหนักแรกเกิดน้อย (P05-P07) Slow fetal growth, fetal malnutrition and disorders related to short gestation and low birth weight	รวม	7,303	61.70	14,357	87.28	9,566	104.32	16,860	77.30	7,046	123.85	55,132	84.88
		ชาย	3,448	59.21	6,997	87.36	4,702	103.98	8,225	75.65	3,545	131.53	26,917	84.32
		หญิง	3,855	64.12	7,360	87.20	4,864	104.64	8,635	78.94	3,501	116.93	28,215	85.42
247	บาดเจ็บจากการคลอด (P10-P15) Birth trauma	รวม	467	3.95	832	5.06	418	4.56	1,035	4.75	560	9.84	3,312	5.10
		ชาย	265	4.55	480	5.99	238	5.26	599	5.51	308	11.43	1,890	5.92
		หญิง	202	3.36	352	4.17	180	3.87	436	3.99	252	8.42	1,422	4.30
248	ขาดออกซิเจนขณะอยู่ในโพรงมดลูก และภาวะ แอสฟิกเซียเมื่อแรกเกิด (P20-P21) Intrauterine hypoxia and birth asphyxia	รวม	720	6.08	1,158	7.04	679	7.40	1,599	7.33	984	17.30	5,140	7.91
		ชาย	409	7.02	661	8.25	402	8.89	914	8.41	548	20.33	2,934	9.19
		หญิง	311	5.17	497	5.89	277	5.96	685	6.26	436	14.56	2,206	6.68

ตาราง 20 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2557(ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ภาคเหนือ		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.)		ภาคใต้		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพมหานคร		หน่วยนับ : ราย รวมทั้งประเทศ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
249	ภาวะหายใจผิดปกติอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด (P22-P28) Other respiratory disorders originating in the perinatal period	รวม	2,573	21.74	6,568	39.93	4,861	53.01	7,991	36.64	2,261	39.74	24,254	37.34
		ชาย	1,529	26.25	3,983	49.73	3,021	66.81	4,989	45.89	1,380	51.20	14,902	46.68
		หญิง	1,044	17.36	2,585	30.63	1,840	39.59	3,002	27.45	881	29.43	9,352	28.31
250	การติดเชื้อแต่กำเนิดและโรคปรสิต (P35-P37) Congenital infectious and parasitic diseases	รวม	1,822	15.39	3,613	21.96	2,151	23.46	5,524	25.33	956	16.80	14,066	21.65
		ชาย	996	17.10	1,874	23.40	1,133	25.06	2,917	26.83	535	19.85	7,455	23.35
		หญิง	826	13.74	1,739	20.60	1,018	21.90	2,607	23.83	421	14.06	6,611	20.01
251	การติดเชื้อเฉพาะอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด (P38-P39) Other infections specific to the perinatal period	รวม	393	3.32	702	4.27	366	3.99	642	2.94	114	2.00	2,217	3.41
		ชาย	207	3.55	419	5.23	197	4.36	372	3.42	68	2.52	1,263	3.96
		หญิง	186	3.09	283	3.35	169	3.64	270	2.47	46	1.54	954	2.89
252	โรคเม็ดเลือดแดงของทารกในครรภ์และแรกเกิด (P55) Haemolytic disease of fetus and newborn	รวม	516	4.36	1,352	8.22	712	7.76	1,617	7.41	500	8.79	4,697	7.23
		ชาย	244	4.19	668	8.34	338	7.47	799	7.35	240	8.90	2,289	7.17
		หญิง	272	4.52	684	8.10	374	8.05	818	7.48	260	8.68	2,408	7.29
253	ภาวะอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด (P08, P29, P50-P54, P56-P96) Other conditions originating in the perinatal period	รวม	21,835	184.47	29,776	181.02	16,249	177.20	47,305	216.89	10,034	176.37	125,199	192.75
		ชาย	11,858	203.61	16,063	200.55	8,855	195.83	25,446	234.05	5,444	201.99	67,666	211.97
		หญิง	9,977	165.94	13,713	162.48	7,394	159.08	21,859	199.84	4,590	153.30	57,533	174.17
ความผิดปกติ ความพิการแต่กำเนิด และโครโมโซมผิดปกติ (Q00-Q99)														
254	กระดูกสันหลังแยก (Q05) Spina blfida	รวม	57	0.48	25	0.15	33	0.36	52	0.24	76	1.34	243	0.37
		ชาย	29	0.50	13	0.16	7	0.15	26	0.24	39	1.45	114	0.36
		หญิง	28	0.47	12	0.14	26	0.56	26	0.24	37	1.24	129	0.39
255	ความผิดปกติอื่น ๆ แต่กำเนิดของระบบประสาท (Q00-Q04, Q06-Q07) Other congenital malformations of the nervous system	รวม	152	1.28	154	0.94	124	1.35	232	1.06	211	3.71	873	1.34
		ชาย	81	1.39	77	0.96	55	1.22	120	1.10	110	4.08	443	1.39
		หญิง	71	1.18	77	0.91	69	1.48	112	1.02	101	3.37	430	1.30
256	ความผิดปกติแต่กำเนิดของระบบไหลเวียนโลหิต (Q20-Q28) Congenital malformation of the circulatory system	รวม	1,198	10.12	984	5.98	1,094	11.93	1,851	8.49	2,749	48.32	7,876	12.13
		ชาย	564	9.68	472	5.89	496	10.97	926	8.52	1,398	51.87	3,856	12.08
		หญิง	634	10.54	512	6.07	598	12.87	925	8.46	1,351	45.12	4,020	12.17
257	ปากแหว่งและเพดานโหว่ (Q35-Q37) Cleft lip and cleft palate	รวม	373	3.15	535	3.25	551	6.01	1,039	4.76	389	6.84	2,887	4.44
		ชาย	209	3.59	268	3.35	268	5.93	598	5.50	204	7.57	1,547	4.85
		หญิง	164	2.73	267	3.16	283	6.09	441	4.03	185	6.18	1,340	4.06

ตาราง 20 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2557(ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ภาคเหนือ		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.)		ภาคใต้		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพมหานคร		หน่วยนับ : ราย รวมทั้งประเทศ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
258	ลำไส้เล็กไม่มี ตันและติบ (Q41)	รวม	22	0.19	35	0.21	31	0.34	40	0.18	29	0.51	157	0.24
	Absence, atresia and stenosis of small intestine	ชาย	7	0.12	18	0.22	12	0.27	15	0.14	12	0.45	64	0.20
		หญิง	15	0.25	17	0.20	19	0.41	25	0.23	17	0.57	93	0.28
259	ความผิดปกติแต่กำเนิดอื่น ๆ ของระบบย่อยอาหาร (Q38-Q40, Q42-Q45)	รวม	1,479	12.50	3,473	21.11	1,258	13.72	2,751	12.61	2,423	42.59	11,384	17.53
	Other congenital malformations of the digestive system	ชาย	907	15.57	2,080	25.97	734	16.23	1,689	15.54	1,379	51.16	6,789	21.27
		หญิง	572	9.51	1,393	16.50	524	11.27	1,062	9.71	1,044	34.87	4,595	13.91
260	อัณฑะไม่ลงถุง (Q53)	รวม	169	2.90	213	2.66	179	3.96	281	2.58	212	7.87	1,054	3.30
	Undescended testicle	ชาย	169	2.90	213	2.66	179	3.96	281	2.58	212	7.87	1,054	3.30
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
261	ความผิดปกติอื่น ๆ ของระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ (Q50-Q52, Q54-Q64)	รวม	303	2.56	197	1.20	252	2.75	417	1.91	494	8.68	1,663	2.56
	Other malformations of the genitourinary system	ชาย	205	3.52	121	1.51	178	3.94	296	2.72	390	14.47	1,190	3.73
		หญิง	98	1.63	76	0.90	74	1.59	121	1.11	104	3.47	473	1.43
262	ความพิการแต่กำเนิดของสะโพก (Q65)	รวม	19	0.16	7	0.04	11	0.12	53	0.24	65	1.14	155	0.24
	Congenital deformities of hip	ชาย	4	0.07	4	0.05	6	0.13	17	0.16	25	0.93	56	0.18
		หญิง	15	0.25	3	0.04	5	0.11	36	0.33	40	1.34	99	0.30
263	ความพิการแต่กำเนิดของเท้า (Q66)	รวม	139	1.17	253	1.54	303	3.30	407	1.87	240	4.22	1,342	2.07
	Congenital deformities of feet	ชาย	68	1.17	127	1.59	174	3.85	210	1.93	134	4.97	713	2.23
		หญิง	71	1.18	126	1.49	129	2.78	197	1.80	106	3.54	629	1.90
264	ความผิดปกติและความพิการแต่กำเนิดอื่น ๆ ของระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง (Q67-Q79)	รวม	370	3.13	365	2.22	301	3.28	725	3.32	735	12.92	2,496	3.84
	Other congenital malformations and deformations of the musculoskeletal system	ชาย	213	3.66	212	2.65	155	3.43	382	3.51	398	14.77	1,360	4.26
		หญิง	157	2.61	153	1.81	146	3.14	343	3.14	337	11.26	1,136	3.44
265	ความผิดปกติแต่กำเนิดอื่น ๆ	รวม	582	4.92	602	3.66	568	6.19	1,045	4.79	1,333	23.43	4,130	6.36
	Other congenital malformations	ชาย	292	5.01	282	3.52	275	6.08	512	4.71	694	25.75	2,055	6.44
	(Q10-Q18, Q30-Q34, Q80-Q89)	หญิง	290	4.82	320	3.79	293	6.30	533	4.87	639	21.34	2,075	6.28
266	ความผิดปกติของโครโมโซมที่มีได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น (Q90-Q99)	รวม	107	0.90	80	0.49	71	0.77	105	0.48	84	1.48	447	0.69
	Chromosomal abnormalities, not Elsewhere classified	ชาย	66	1.13	42	0.52	27	0.60	33	0.30	34	1.26	202	0.63
		หญิง	41	0.68	38	0.45	44	0.95	72	0.66	50	1.67	245	0.74

ตาราง 20 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2557(ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ภาคเหนือ		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.)		ภาคใต้		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพมหานคร		หน่วยนับ : ราย รวมทั้งประเทศ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจทั้งคลินิกและตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ไม่ได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น (R00-R99)														
267	ปวดท้องและปวดอุ้งเชิงกราน (R10) Abdominal and pelvic pain	รวม	5,131	43.35	4,282	26.03	3,718	40.55	5,996	27.49	622	10.93	19,749	30.40
		ชาย	2,119	36.39	1,659	20.71	1,373	30.36	2,404	22.11	227	8.42	7,782	24.38
		หญิง	3,012	50.10	2,623	31.08	2,345	50.45	3,592	32.84	395	13.19	11,967	36.23
268	ไข้ไม่ทราบสาเหตุ (R50) Fever of unknown origin	รวม	8,983	75.89	6,721	40.86	6,214	67.76	15,171	69.56	1,482	26.05	38,571	59.38
		ชาย	4,896	84.07	3,511	43.84	3,162	69.93	7,865	72.34	727	26.97	20,161	63.16
		หญิง	4,087	67.98	3,210	38.03	3,052	65.66	7,306	66.79	755	25.22	18,410	55.73
269	ชราภาพ (R54) Senility	รวม	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
270	อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจทางคลินิกและตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ไม่ได้มีรหัสระบุไว้ (R00-R09, R11-R49, R51-R53, R55-R99) Other symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not Elsewhere classified	รวม	34,509	291.55	39,538	240.36	32,539	354.84	63,646	291.82	6,760	118.82	176,992	272.48
		ชาย	17,112	293.83	18,938	236.45	14,553	321.84	30,482	280.37	3,326	123.40	84,411	264.42
		หญิง	17,397	289.35	20,600	244.08	17,986	386.95	33,164	303.19	3,434	114.69	92,581	280.27
การบาดเจ็บ การเป็นพิษและผลติดตามจากเหตุภายนอก (S00-T98)														
271	กระดูกแตกหักบริเวณกะโหลกศีรษะและกระดูกหน้า (S02) Fracture of skull and facial bones	รวม	2,234	18.87	3,122	18.98	1,843	20.10	4,128	18.93	1,020	17.93	12,347	19.01
		ชาย	1,776	30.50	2,457	30.68	1,339	29.61	3,352	30.83	857	31.80	9,781	30.64
		หญิง	458	7.62	665	7.88	504	10.84	776	7.09	163	5.44	2,566	7.77
272	กระดูกคอ กระดูกซี่โครง หรือกระดูกเชิงกรานหัก (S12, S22, S32, T08) Fracture of neck, thorax and pelvis	รวม	3,796	32.07	3,397	20.65	2,005	21.86	3,843	17.62	933	16.40	13,974	21.51
		ชาย	2,444	41.97	2,135	26.66	1,247	27.58	2,462	22.65	573	21.26	8,861	27.76
		หญิง	1,352	22.49	1,262	14.95	758	16.31	1,381	12.63	360	12.02	5,113	15.48
273	กระดูกต้นขา แตก หัก ร้าว (S72) Fracture of femur	รวม	7,054	59.60	7,409	45.04	3,281	35.78	6,582	30.18	2,585	45.44	26,911	41.43
		ชาย	2,762	47.43	3,177	39.67	1,611	35.63	2,984	27.45	996	36.95	11,530	36.12
		หญิง	4,292	71.38	4,232	50.14	1,670	35.93	3,598	32.89	1,589	53.07	15,381	46.56
274	กระดูกแตกหักของแขนขาอื่น ๆ (S42, S52, S62, S82, S92, T10, T12) Fracture of other limb bones	รวม	19,515	164.87	18,737	113.91	11,219	122.35	28,824	132.16	4,538	79.76	82,833	127.52
		ชาย	12,870	220.99	12,600	157.31	7,623	168.58	19,922	183.24	3,191	118.39	56,206	176.07
		หญิง	6,645	110.52	6,137	72.71	3,596	77.36	8,902	81.38	1,347	44.99	26,627	80.61
275	กระดูกแตกหักหลายบริเวณในร่างกาย (T02) Fracture involving multiple body regions	รวม	2	0.02	1	0.01	8	0.09	8	0.04	1	0.02	20	0.03
		ชาย	2	0.03	1	0.01	6	0.13	5	0.05	1	0.04	15	0.05
		หญิง	0	0.00	0	0.00	2	0.04	3	0.03	0	0.00	5	0.02

ตาราง 20 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2557(ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ภาคเหนือ		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.)		ภาคใต้		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพมหานคร		รวมทั้งประเทศ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
276	กระดูกเคลื่อน เคล็ด ชัด บริเวณร่างกายหลายแห่งที่ระบุเฉพาะ (S03, S13, S23, S33, S43,S53, S63, S73, S83, S93, T03) Dislocations, sprains and strains of specified and multiple body regions	รวม	2,012	17.00	2,254	13.70	1,358	14.81	3,206	14.70	522	9.18	9,352	14.40
		ชาย	1,321	22.68	1,407	17.57	843	18.64	2,186	20.11	335	12.43	6,092	19.08
		หญิง	691	11.49	847	10.04	515	11.08	1,020	9.33	187	6.25	3,260	9.87
277	การบาดเจ็บของตาและเบ้าตา (S05) Injury of eye and orbi	รวม	1,497	12.65	1,461	8.88	1,012	11.04	2,215	10.16	301	5.29	6,486	9.99
		ชาย	1,199	20.59	1,091	13.62	825	18.24	1,747	16.07	243	9.02	5,105	15.99
		หญิง	298	4.96	370	4.38	187	4.02	468	4.28	58	1.94	1,381	4.18
278	การบาดเจ็บภายในกะโหลกศีรษะ (S06) Intracranial injury	รวม	8,654	73.11	9,279	56.41	6,721	73.29	16,637	76.28	2,026	35.61	43,317	66.69
		ชาย	6,232	107.01	6,669	83.26	4,438	98.15	11,955	109.96	1,476	54.76	30,770	96.39
		หญิง	2,422	40.28	2,610	30.92	2,283	49.12	4,682	42.80	550	18.37	12,547	37.98
279	การบาดเจ็บของอวัยวะภายในอื่น ๆ (S26-S27, S36-S37) Injury of other internal organs	รวม	2,042	17.25	2,605	15.84	1,996	21.77	3,270	14.99	756	13.29	10,669	16.43
		ชาย	1,750	30.05	2,181	27.23	1,677	37.09	2,747	25.27	657	24.38	9,012	28.23
		หญิง	292	4.86	424	5.02	319	6.86	523	4.78	99	3.31	1,657	5.02
280	การบาดเจ็บจากการบดอัดและการบาดเจ็บที่เกิดจากตัดขานบริเวณร่างกายหลายแห่งที่ระบุเฉพาะ (S07-S08, S17-S18, S28, S38, S47-S48, S57-S58, S67-S68, S77-S78, S87-S88, S97-S98, T04-T05) Crushing injuries and traumatic amputations of specified and multiple body regions	รวม	1,126	9.51	1,107	6.73	614	6.70	1,720	7.89	245	4.31	4,812	7.41
		ชาย	897	15.40	873	10.90	490	10.84	1,424	13.10	200	7.42	3,884	12.17
		หญิง	229	3.81	234	2.77	124	2.67	296	2.71	45	1.50	928	2.81
281	การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ ,ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย (S00-S01, S04, S09-S11, S09-S11, S14-S16, S19-S21, S24-S25, S29-S31, S34-S35, S39-S41, S44-S46, S49-S51, S54-S56, S59-S61, S64-S66, S69-S71, S74-S76, S79-S81, S84-S86, S89-S91, S94-S96, S99, T00-T01, T06-T07, T09, T11, T13-T14) Other injuries of specified, unspecified and multiple body regions	รวม	19,038	160.84	21,949	133.43	15,189	165.64	30,572	140.17	4,153	73.00	90,901	139.94
		ชาย	13,360	229.40	14,821	185.04	10,320	228.23	21,984	202.21	3,146	116.73	63,631	199.33
		หญิง	5,678	94.44	7,128	84.46	4,869	104.75	8,588	78.51	1,007	33.63	27,270	82.55
282	ผลของวัตถุแปลกปลอมผ่านเข้าทางทวารธรรมชาติของร่างกาย (T15-T19) Effects of foreign body entering through natural orifice	รวม	870	7.35	1,115	6.78	874	9.53	1,691	7.75	321	5.64	4,871	7.50
		ชาย	544	9.34	636	7.94	440	9.73	1,013	9.32	176	6.53	2,809	8.80
		หญิง	326	5.42	479	5.68	434	9.34	678	6.20	145	4.84	2,062	6.24

ตาราง 20 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2557(ต่อ)

หน่วยนับ : ราย														
รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ภาคเหนือ		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.)		ภาคใต้		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพมหานคร		รวมทั้งประเทศ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
283	แผลถูกความร้อนและถูกสารกัดกร่อน (T20-T32) Burns and corrosions	รวม	1,666	14.08	2,070	12.58	1,438	15.68	3,310	15.18	470	8.26	8,954	13.78
		ชาย	1,144	19.64	1,333	16.64	930	20.57	2,149	19.77	293	10.87	5,849	18.32
		หญิง	522	8.68	737	8.73	508	10.93	1,161	10.61	177	5.91	3,105	9.40
284	การเป็นพิษจากยา เครื่องยาและชีววัตถุ (T36-T50) Poisoning by drugs and biological substances	รวม	3,398	28.71	4,598	27.95	2,332	25.43	5,280	24.21	857	15.06	16,465	25.35
		ชาย	1,380	23.70	1,679	20.96	888	19.64	2,198	20.22	353	13.10	6,498	20.36
		หญิง	2,018	33.56	2,919	34.59	1,444	31.07	3,082	28.18	504	16.83	9,967	30.17
285	การเป็นพิษจากสารที่โดยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ใช้ เป็นยา (T51-T65) Toxic effects of substances chiefly nonmedicinal as to source	รวม	7,772	65.66	10,936	66.48	8,235	89.80	11,923	54.67	773	13.59	39,639	61.03
		ชาย	4,669	80.17	6,266	78.23	4,847	107.19	6,877	63.25	393	14.58	23,052	72.21
		หญิง	3,103	51.61	4,670	55.33	3,388	72.89	5,046	46.13	380	12.69	16,587	50.21
286	กลุ่มอาการจากการทารุณ (T74) Maltreatment syndromes	รวม	41	0.35	33	0.20	18	0.20	130	0.60	19	0.33	241	0.37
		ชาย	7	0.12	9	0.11	1	0.02	5	0.05	4	0.15	26	0.08
		หญิง	34	0.57	24	0.28	17	0.37	125	1.14	15	0.50	215	0.65
287	อื่น ๆ และที่มีได้ระบุผลของสาเหตุภายนอก (T33-T35, T66-T73, T75-T78) Other and unspecified effects of external causes	รวม	4,063	34.33	6,026	36.63	3,575	38.99	7,758	35.57	605	10.63	22,027	33.91
		ชาย	2,335	40.09	3,447	43.04	1,999	44.21	4,480	41.21	355	13.17	12,616	39.52
		หญิง	1,728	28.74	2,579	30.56	1,576	33.91	3,278	29.97	250	8.35	9,411	28.49
288	ภาวะแทรกซ้อนระยะแรกของการบาดเจ็บบางชนิด และภาวะแทรกซ้อนของการรักษาทางศัลยกรรม และอายุรกรรมที่มีได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น (T79-T88) Certain early complications of trauma and complications of surgical and medical care, note Elsewhere classified	รวม	9,575	80.90	10,231	62.20	5,750	62.70	19,166	87.88	4,138	72.73	48,860	75.22
		ชาย	5,748	98.70	5,770	72.04	3,424	75.72	11,350	104.40	2,100	77.92	28,392	88.94
		หญิง	3,827	63.65	4,461	52.86	2,326	50.04	7,816	71.46	2,038	68.07	20,468	61.96
289	ผลระยะล่าของการบาดเจ็บ การเป็นพิษและผลที่ตาม มาจากสาเหตุภายนอกอื่น ๆ (T90-T98) Sequela of injuries, of poisoning and of other consequences of external causes	รวม	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อสถานะสุขภาพและการเข้ารับบริการสุขภาพ (Z00-Z99)														
290	บุคคลขอรับบริการเพื่อการตรวจและชันสูตร (Z00-Z13) Persons encountering health services for examination and investigation	รวม	1,528	12.91	1,166	7.09	565	6.16	624	2.86	1,203	21.15	5,086	7.83
		ชาย	738	12.67	536	6.69	275	6.08	280	2.58	520	19.29	2,349	7.36
		หญิง	790	13.14	630	7.46	290	6.24	344	3.14	683	22.81	2,737	8.29

ตาราง 20 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2557(ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ภาคเหนือ		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.)		ภาคใต้		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพมหานคร		รวมทั้งประเทศ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
291	การติดเชื้อไวรัสโดยไม่มีอาการ (Z21)	รวม	5	0.04	14	0.09	8	0.09	10	0.05	3	0.05	40	0.06
	Asymptomatic human immunodeficiency	ชาย	2	0.03	7	0.09	5	0.11	4	0.04	2	0.07	20	0.06
	virus (HIV) infection status	หญิง	3	0.05	7	0.08	3	0.06	6	0.05	1	0.03	20	0.06
292	บุคคลที่มีอาการที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพที่	รวม	157	1.33	413	2.51	129	1.41	995	4.56	160	2.81	1,854	2.85
	เกี่ยวข้องกับโรคติดต่อ (Z20, Z22-Z29)	ชาย	69	1.18	216	2.70	75	1.66	497	4.57	83	3.08	940	2.94
	Other persons with potential health hazards	หญิง	88	1.46	197	2.33	54	1.16	498	4.55	77	2.57	914	2.77
293	การรับบริการคุมกำเนิด (Z30)	รวม	453	3.83	486	2.95	546	5.95	953	4.37	41	0.72	2,479	3.82
	Contraceptive management	ชาย	7	0.12	4	0.05	7	0.15	11	0.10	4	0.15	33	0.10
		หญิง	446	7.42	482	5.71	539	11.60	942	8.61	37	1.24	2,446	7.40
294	การตรวจคัดกรองก่อนการคลอด และการให้คำแนะนำ	รวม	24	0.40	25	0.30	52	1.12	107	0.98	9	0.30	217	0.66
	เกี่ยวกับการตั้งครรภ์อื่น ๆ (Z34-Z36)	ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	Antenatal screening and other supervision	หญิง	24	0.40	25	0.30	52	1.12	107	0.98	9	0.30	217	0.66
295	การเกิดของทารกตามสถานที่เกิด (Z38)	รวม	48,728	411.68	85,261	518.32	71,452	779.20	106,366	487.69	20,121	353.67	331,928	511.01
	Liveborn infants according to place of birth	ชาย	24,771	425.34	43,184	539.16	36,607	809.56	53,606	493.06	10,073	373.74	168,241	527.03
		หญิง	23,957	398.45	42,077	498.54	34,845	749.66	52,760	482.35	10,048	335.60	163,687	495.53
296	การดูแลและการตรวจหลังคลอด (Z39)	รวม	212	3.53	243	2.88	241	5.18	487	4.45	26	0.87	1,209	3.66
	Postpartum care and examination	ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	212	3.53	243	2.88	241	5.18	487	4.45	26	0.87	1,209	3.66
297	บุคคลขอรับบริการสุขภาพ เพื่อหัตถการหรือการ	รวม	5,642	47.67	5,086	30.92	2,695	29.39	10,917	50.05	1,764	31.01	26,104	40.19
	บริการสุขภาพที่ระบุเฉพาะ (Z40-Z54, Z40-Z54)	ชาย	3,357	57.64	3,059	38.19	1,622	35.87	6,659	61.25	962	35.69	15,659	49.05
	Persons encountering health services	หญิง	2,285	38.00	2,027	24.02	1,073	23.08	4,258	38.93	802	26.79	10,445	31.62
298	บุคคลขอรับบริการสุขภาพด้วยเหตุผลอื่น (Z31-Z33,	รวม	119	1.01	276	1.68	72	0.79	306	1.40	36	0.63	809	1.25
	Z37, Z55-Z99)	ชาย	43	0.74	153	1.91	23	0.51	137	1.26	23	0.85	379	1.19
	Persons encountering health services for	หญิง	76	1.26	123	1.46	49	1.05	169	1.55	13	0.43	430	1.30
	other reasons													

*ไขจากไวรัสที่นำโดยแมลงและไขเลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่น ๆ (A90-A94, A96-A99) โรคในกลุ่มนี้ของประเทศไทย คือ โรคไขเลือดออก

รวมรวม / วิเคราะห์ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน สวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการและครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สภส.)

ตาราง 21 จำนวน และอัตราผู้ป่วยในรวมทุการวินิจฉัยโรค กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค)พ.ศ.2556-2557

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	หน่วยนับ : รายโรค			
			2556		2557	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
	รวมทุกกลุ่มโรค	รวม	7,345,753	84,445.28	7,127,523	78,657.20
		ชาย	3,386,370	88,793.99	3,289,635	81,748.56
		หญิง	3,959,383	81,050.29	3,837,888	76,187.69
กลุ่มโรคติดเชื้อและปรสิตบางชนิด (A00 - B99)						
001	อหิวาตกโรค (A00) Cholera	รวม	73	0.84	42	0.46
		ชาย	27	0.71	10	0.25
		หญิง	46	0.94	32	0.64
002	ไข้รากสาดน้อยและไข้รากสาดเทียม (A01) Typhoid and paratyphoid fever	รวม	1,003	11.53	650	7.17
		ชาย	429	11.25	307	7.63
		หญิง	574	11.75	343	6.81
003	โรคบิดจากเชื้อชิเกลลา (A03) Shigellosis	รวม	131	1.51	35	0.39
		ชาย	47	1.23	12	0.30
		หญิง	84	1.72	23	0.46
004	โรคบิดมีตัว (A06) Amoebiasis	รวม	939	10.79	889	9.81
		ชาย	391	10.25	369	9.17
		หญิง	548	11.22	520	10.32
005	อาการท้องร่วงกระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ (A09) Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin	รวม	116,666	1,341.17	104,761	1,156.11
		ชาย	42,238	1,107.52	38,136	947.69
		หญิง	74,428	1,523.57	66,625	1,322.60
006	โรคลำไส้อักเสบอื่น ๆ (A02, A04 - A05, A07-A08) Other intestinal infectious diseases	รวม	10,959	125.98	10,775	118.91
		ชาย	4,201	110.15	4,091	101.66
		หญิง	6,758	138.34	6,684	132.69
007	วัณโรคทางเดินหายใจ (A15-A16) Respiratory tuberculosis	รวม	29,175	335.39	27,159	299.72
		ชาย	18,807	493.14	17,754	441.19
		หญิง	10,368	212.24	9,405	186.70
008	วัณโรคอื่น ๆ (A17-A19) Other Tuberculosis	รวม	4,884	56.15	4,637	51.17
		ชาย	2,702	70.85	2,401	59.67
		หญิง	2,182	44.67	2,236	44.39
009	กาฬโรค (A20) Plaque	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
010	โรคติดเชื้อบรูเซลลา (A23) Brucellosis	รวม	4	0.05	2	0.02
		ชาย	4	0.10	0	0.00
		หญิง	0	0.00	2	0.04
011	โรคเรื้อน (A30) Leprosy	รวม	281	3.23	275	3.03
		ชาย	171	4.48	173	4.30
		หญิง	110	2.25	102	2.02
012	บาดทะยักในเด็กแรกเกิด (A33) Tetanus neonatorum	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
013	บาดทะยักอื่น ๆ (A34-A35) Other tetanus	รวม	120	1.38	133	1.47
		ชาย	61	1.60	82	2.04
		หญิง	59	1.21	51	1.01
014	โรคคอติด (A36) Diphtheria	รวม	12	0.14	6	0.07
		ชาย	6	0.16	3	0.07
		หญิง	6	0.12	3	0.06

ตาราง 21 จำนวน และอัตราผู้ป่วยในรวมทุการวินิจฉัยโรค กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค)พ.ศ.2556-2557 (ต่อ)

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2556		2557	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
015	โรคไอกรน (A37) Whooping cough	รวม	1	0.01	2	0.02
		ชาย	1	0.03	0	0.00
		หญิง	0	0.00	2	0.04
016	การติดเชื้อเมนีงโกคอคคัส (A39) Meningococcal infection	รวม	31	0.36	29	0.32
		ชาย	15	0.39	12	0.30
		หญิง	16	0.33	17	0.34
017	โลหิตเป็นพิษ (A40-A41) Septicemia	รวม	77,884	895.34	68,168	752.28
		ชาย	35,958	942.85	31,471	782.07
		หญิง	41,926	858.24	36,697	728.49
018	โรคจากแบคทีเรียอื่น ๆ (A21-A22, A24-A28, A31-A32, A38, A42-A49) Other bacterial diseases	รวม	16,685	191.81	15,079	166.41
		ชาย	8,675	227.47	7,889	196.04
		หญิง	8,010	163.97	7,190	142.73
019	ซิฟิลิสแต่กำเนิด (A50) Congenital syphilis	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
020	ซิฟิลิสระยะเริ่ม (A51) Early syphilis	รวม	32	0.37	44	0.49
		ชาย	17	0.45	20	0.50
		หญิง	15	0.31	24	0.48
021	ซิฟิลิสอื่น ๆ (A52-A53) Other syphilis	รวม	1,070	12.30	1,034	11.41
		ชาย	593	15.55	586	14.56
		หญิง	477	9.76	448	8.89
022	การติดเชื้อหนองใน (A54) Gonococcal infection	รวม	20	0.23	16	0.18
		ชาย	13	0.34	11	0.27
		หญิง	7	0.14	5	0.10
023	โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จากเชื้อคลาไมเดีย (A55-A56) Sexually transmitted chlamydial diseases	รวม	13	0.15	5	0.06
		ชาย	6	0.16	2	0.05
		หญิง	7	0.14	3	0.06
024	โรคติดเชื้ออื่นๆ ที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นส่วนใหญ่ (A57-A64) Other infections with a predominantly sexual mode of transmission	รวม	312	3.59	266	2.94
		ชาย	111	2.91	105	2.61
		หญิง	201	4.11	161	3.20
025	โรคไขกลับซ้ำ (A68) Relapsing fever	รวม	2	0.02	1	0.01
		ชาย	1	0.03	0	0.00
		หญิง	1	0.02	1	0.02
026	ริดสีดวงตา (A71) Trachoma	รวม	4	0.05	2	0.02
		ชาย	4	0.10	0	0.00
		หญิง	0	0.00	2	0.04
027	ไข้รากสาดใหญ่ (A75) Typhus fever	รวม	4,183	48.09	3,587	39.59
		ชาย	1,964	51.50	1,817	45.15
		หญิง	2,219	45.42	1,770	35.14
028	โรคโปลิโอเฉียบพลัน (A80) Acute poliomyelitis	รวม	31	0.36	31	0.34
		ชาย	17	0.45	21	0.52
		หญิง	14	0.29	10	0.20
029	โรคพิษสุนัขบ้า (A82) Rabies	รวม	2	0.02	1	0.01
		ชาย	2	0.05	0	0.00
		หญิง	0	0.00	1	0.02

ตาราง 21 จำนวน และอัตราผู้ป่วยในรวมทุการวินิจฉัยโรค กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค)พ.ศ.2556-2557 (ต่อ)

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2556		2557	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
030	สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส (A83-A86) Viral encephalitis	รวม	158	1.82	155	1.71
		ชาย	66	1.73	59	1.47
		หญิง	92	1.88	96	1.91
031	ไข้เหลือง (A95) Yellow fever	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
032	ไข้จากไวรัสที่นำโดยแมลงและไขเลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่น ๆ (A90-A94, A96-A99) Other arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers	รวม	5,647	64.92	2,273	25.08
		ชาย	2,216	58.11	934	23.21
		หญิง	3,431	70.23	1,339	26.58
033	เริม (B00) Herpesviral infection	รวม	1,357	15.60	1,373	15.15
		ชาย	595	15.60	591	14.69
		หญิง	762	15.60	782	15.52
034	อีสุกอีใสและงูสวัด (B01-B02) Varicella and zoster	รวม	3,957	45.49	3,881	42.83
		ชาย	1,775	46.54	1,685	41.87
		หญิง	2,182	44.67	2,196	43.59
035	หัด (B05) Measles	รวม	8	0.09	7	0.08
		ชาย	4	0.10	3	0.07
		หญิง	4	0.08	4	0.08
036	หัดเยอรมัน (B06) Rubella	รวม	3	0.03	2	0.02
		ชาย	1	0.03	2	0.05
		หญิง	2	0.04	0	0.00
037	ตับอักเสบเฉียบพลันชนิดบี (B16) Acute hepatitis B	รวม	1,335	15.35	1,331	14.69
		ชาย	760	19.93	813	20.20
		หญิง	575	11.77	518	10.28
038	ตับอักเสบจากไวรัสอื่น ๆ (B15, B17-B19) Other viral hepatitis	รวม	11,737	134.93	12,002	132.45
		ชาย	6,473	169.73	6,925	172.09
		หญิง	5,264	107.76	5,077	100.79
039	ภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากไวรัส (HIV) (B20-B24) Human immunodeficiency virus [HIV] disease	รวม	3,184	36.60	3,151	34.77
		ชาย	1,835	48.12	1,767	43.91
		หญิง	1,349	27.61	1,384	27.47
040	คางทูม (B26) Mumps	รวม	24	0.28	14	0.15
		ชาย	6	0.16	7	0.17
		หญิง	18	0.37	7	0.14
041	โรคจากไวรัสอื่น (A81, A87-A89, B03-B04, B07-B09, B25, B27-B34) Other viral diseases	รวม	3,548	40.79	2,753	30.38
		ชาย	1,384	36.29	1,147	28.50
		หญิง	2,164	44.30	1,606	31.88
042	โรคติดเชื้อรา (B35-B49) Mycoses	รวม	8,143	93.61	7,299	80.55
		ชาย	4,125	108.16	3,625	90.08
		หญิง	4,018	82.25	3,674	72.93
043	มาลาเรีย (B50-B54) Malaria	รวม	644	7.40	440	4.86
		ชาย	335	8.78	260	6.46
		หญิง	309	6.33	180	3.57

ตาราง 21 จำนวน และอัตราผู้ป่วยในรวมทุการวินิจฉัยโรค กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค)พ.ศ.2556-2557 (ต่อ)

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2556		2557	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
044	โรคไลชมาเนีย (B55) Leishmaniasis	รวม	1	0.01	3	0.03
		ชาย	1	0.03	2	0.05
		หญิง	0	0.00	1	0.02
045	โรคทริปาโนโซม (B56-B57) Trypanosomiasis	รวม	7	0.08	6	0.07
		ชาย	3	0.08	3	0.07
		หญิง	4	0.08	3	0.06
046	โรคติดเชื้อซิสโตโซม (B65) Schistosomiasis	รวม	6	0.07	15	0.17
		ชาย	5	0.13	7	0.17
		หญิง	1	0.02	8	0.16
047	โรคพยาธิใบไม้อื่น ๆ (B66) Other fluke infections	รวม	417	4.79	372	4.11
		ชาย	227	5.95	187	4.65
		หญิง	190	3.89	185	3.67
048	โรคพยาธิเอคคิโนคอกคัส (B67) Echinococcosis	รวม	14	0.16	8	0.09
		ชาย	8	0.21	3	0.07
		หญิง	6	0.12	5	0.10
049	โรคพยาธิราคันคูลัส (B72) Dracunculiasis	รวม	1	0.01	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	1	0.02	0	0.00
050	โรคพยาธิออนโคเชอร์คา (B73) Onchocerciasis	รวม	2	0.02	0	0.00
		ชาย	1	0.03	0	0.00
		หญิง	1	0.02	0	0.00
051	โรคพยาธิฟิลาเรีย (B74) Filariasis	รวม	13	0.15	6	0.07
		ชาย	5	0.13	0	0.00
		หญิง	8	0.16	6	0.12
052	โรคพยาธิปากขอ (B76) Hookworm diseases	รวม	390	4.48	275	3.03
		ชาย	169	4.43	137	3.40
		หญิง	221	4.52	138	2.74
053	โรคพยาธิตัวติดอื่น ๆ (B68-B71, B75, B77-B83) Other helminthiasis	รวม	3,714	42.70	3,495	38.57
		ชาย	2,363	61.96	2,183	54.25
		หญิง	1,351	27.66	1,312	26.05
054	ผลตามหลังวัณโรค (B90) Sequelae of tuberculosis	รวม	15,551	178.77	15,408	170.04
		ชาย	9,461	248.08	9,488	235.78
		หญิง	6,090	124.66	5,920	117.52
055	ผลตามหลังโรคโปลิโอ (B91) Sequelae of poliomyelitis	รวม	12	0.14	14	0.15
		ชาย	6	0.16	10	0.25
		หญิง	6	0.12	4	0.08
056	ผลตามหลังโรคเรื้อน (B92) Sequelae of leprosy	รวม	46	0.53	31	0.34
		ชาย	24	0.63	17	0.42
		หญิง	22	0.45	14	0.28
057	โรคติดเชื้อและปรสิตอื่น ๆ (A65-A67, A69-A70, A74, A77-A79, B58-B64, B85-B89, B94, B99) Other infectious and parasitic diseases	รวม	2,441	28.06	1,993	21.99
		ชาย	1,234	32.36	1,018	25.30
		หญิง	1,207	24.71	975	19.36

ตาราง 21 จำนวน และอัตราผู้ป่วยในรวมทุการวินิจฉัยโรค กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค)พ.ศ.2556-2557 (ต่อ)

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2556		2557	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
	โรคเนื้องอกร้ายและเนื้องอกไม่ร้าย (C00-D48)					
058	เนื้องอกร้ายของริมฝีปาก ช่องปากและคอหอย (C00-C14) Malignant neoplasm of lip, oral cavity and pharynx	รวม	9,490	109.10	8,620	95.13
		ชาย	6,178	161.99	5,572	138.47
		หญิง	3,312	67.80	3,048	60.51
059	เนื้องอกร้ายที่หลอดอาหาร (C15) Malignant neoplasm of oesophagus	รวม	3,864	44.42	3,788	41.80
		ชาย	3,106	81.44	3,067	76.22
		หญิง	758	15.52	721	14.31
060	เนื้องอกร้ายที่กระเพาะอาหาร (C16) Malignant neoplasm of stomach	รวม	4,672	53.71	4,483	49.47
		ชาย	2,832	74.26	2,771	68.86
		หญิง	1,840	37.67	1,712	33.99
061	เนื้องอกร้ายของลำไส้ใหญ่ (C18) Malignant neoplasm of colon	รวม	22,611	259.93	23,386	258.08
		ชาย	12,301	322.54	12,729	316.32
		หญิง	10,310	211.05	10,657	211.56
062	เนื้องอกร้ายที่รอยต่อลำไส้ใหญ่เร็กตัม และซิกมอยด์ เร็กตัม ทวารหนัก และช่องทวารหนัก (C19-C21) Malignant neoplasm of recto sigmoid junction, rectum, anus and anal canal	รวม	15,017	172.63	15,591	172.06
		ชาย	8,911	233.66	9,165	227.75
		หญิง	6,106	124.99	6,426	127.57
063	เนื้องอกร้ายที่ตับและท่อน้ำดีในตับ (C22) Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts	รวม	26,690	306.82	25,087	276.85
		ชาย	16,846	441.72	16,125	400.71
		หญิง	9,844	201.51	8,962	177.91
064	เนื้องอกร้ายที่ตับอ่อน (C25) Malignant neoplasm of pancreas	รวม	2,722	31.29	2,669	29.45
		ชาย	1,296	33.98	1,277	31.73
		หญิง	1,426	29.19	1,392	27.63
065	เนื้องอกร้ายที่อวัยวะย่อยอาหารอื่น ๆ (C17, C23-C24, C26) Other malignant neoplasms of digestive organs	รวม	3,325	38.22	3,276	36.15
		ชาย	1,706	44.73	1,671	41.52
		หญิง	1,619	33.14	1,605	31.86
066	เนื้องอกร้ายที่กล่องเสียง (C32) Malignant neoplasm of larynx	รวม	2,817	32.38	2,333	25.75
		ชาย	2,575	67.52	2,154	53.53
		หญิง	242	4.95	179	3.55
067	เนื้องอกร้ายที่หลอดคอ หลอดลม และปอด (C33-C34) Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung	รวม	25,986	298.73	23,290	257.02
		ชาย	16,800	440.51	15,042	373.80
		หญิง	9,186	188.04	8,248	163.73
068	เนื้องอกร้ายที่อวัยวะหายใจและอวัยวะช่องอก (C30-C31, C37-C39) Other malignant neoplasm of respiratory and intrathoracic organs	รวม	781	8.98	756	8.34
		ชาย	474	12.43	490	12.18
		หญิง	307	6.28	266	5.28
069	เนื้องอกร้ายที่กระดูกและกระดูกอ่อนผิวข้อ (C40-C41) Malignant neoplasm of bone and articular cartilage	รวม	587	6.75	604	6.67
		ชาย	309	8.10	332	8.25
		หญิง	278	5.69	272	5.40
070	เนื้องอกร้ายที่เมลาโนมาของผิวหนัง (C43) Malignant melanoma of skin	รวม	460	5.29	372	4.11
		ชาย	255	6.69	205	5.09
		หญิง	205	4.20	167	3.32
071	เนื้องอกร้ายที่ผิวหนังอื่น ๆ (C44) Other malignant neoplasm of skin	รวม	1,536	17.66	1,374	15.16
		ชาย	747	19.59	654	16.25
		หญิง	789	16.15	720	14.29

ตาราง 21 จำนวน และอัตราผู้ป่วยในรวมทุการวินิจฉัยโรค กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค)พ.ศ.2556-2557 (ต่อ)

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2556		2557	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
072	เนื้องอกร้ายที่เมโสซีเรียลและเนื้อเยื่ออ่อน (C45-C49) Malignant neoplasm of mesothelial and soft tissue	รวม	1,603	18.43	1,487	16.41
		ชาย	588	15.42	592	14.71
		หญิง	1,015	20.78	895	17.77
073	เนื้องอกร้ายที่เต้านม (C50) Malignant neoplasm of breast	รวม	13,323	153.16	12,513	138.09
		ชาย	164	4.30	190	4.72
		หญิง	13,159	269.37	12,323	244.63
074	เนื้องอกร้ายที่ปากมดลูก (C53) Malignant neoplasm of cervix uteri	รวม	8,810	101.28	7,947	87.70
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	8,810	180.34	7,947	157.76
075	เนื้องอกร้ายอื่นๆ ที่มีได้ระบุส่วนของมดลูก (C54-C55) Malignant neoplasm of other and unspecified parts of uterus	รวม	3,296	37.89	3,399	37.51
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	3,296	67.47	3,399	67.48
076	เนื้องอกร้ายของอวัยวะสืบพันธุ์หญิง (C51-C52, C56-C58) Other malignant neoplasm of female genital organs	รวม	5,967	68.60	5,592	61.71
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	5,967	122.15	5,592	111.01
077	เนื้องอกร้ายที่ต่อมลูกหมาก (C61) Malignant neoplasm of prostate	รวม	7,103	81.65	6,945	76.64
		ชาย	7,103	186.25	6,945	172.59
		หญิง	0	0.00	0	0.00
078	เนื้องอกร้ายของอวัยวะสืบพันธุ์ชาย (C60, C62-C63) Other malignant neoplasms of male genital organs	รวม	800	9.20	754	8.32
		ชาย	800	20.98	754	18.74
		หญิง	0	0.00	0	0.00
079	เนื้องอกร้ายที่กระเพาะปัสสาวะ (C67) Malignant neoplasm of bladder	รวม	6,843	78.67	6,628	73.14
		ชาย	5,490	143.95	5,184	128.82
		หญิง	1,353	27.70	1,444	28.67
080	เนื้องอกร้ายอื่นๆ ที่ท่อปัสสาวะ (C64-C66, C68) Other malignant neoplasm of urinary tract	รวม	1,586	18.23	1,615	17.82
		ชาย	1,056	27.69	1,027	25.52
		หญิง	530	10.85	588	11.67
081	เนื้องอกร้ายของตาและส่วนประกอบ (C69) Malignant neoplasm of eye and adnexa	รวม	93	1.07	105	1.16
		ชาย	58	1.52	63	1.57
		หญิง	35	0.72	42	0.83
082	เนื้องอกร้ายของสมอง (C71) Malignant neoplasm of brain	รวม	1,058	12.16	1,012	11.17
		ชาย	574	15.05	552	13.72
		หญิง	484	9.91	460	9.13
083	เนื้องอกร้ายที่ส่วนอื่น ๆ ของระบบประสาทส่วนกลาง (C70,C72) Malignant neoplasm of other parts of central nervous system	รวม	130	1.49	122	1.35
		ชาย	68	1.78	61	1.52
		หญิง	62	1.27	61	1.21
084	เนื้องอกอื่น ๆ และที่ไม่ทราบสาเหตุ เนื้องอกทุติยภูมิที่มีได้ระบุรายละเอียดและเกิดขึ้นหลายแห่ง (C73-C80, C97) Malignant neoplasm of other, ill-defined, secondary, unspecified and multiple sites	รวม	64,374	740.03	61,325	676.76
		ชาย	33,594	880.87	31,758	789.20
		หญิง	30,780	630.08	29,567	586.95
085	โรคฮอดกินส์ (C81) Hodgkin's disease	รวม	225	2.59	241	2.66
		ชาย	139	3.64	132	3.28
		หญิง	86	1.76	109	2.16
086	เนื้องอกร้ายลิมโฟมาที่มีไขโรคฮอดกินส์ (C82-C85) Non-Hodgkin's lymphoma	รวม	8,111	93.24	7,299	80.55
		ชาย	4,475	117.34	3,909	97.14
		หญิง	3,636	74.43	3,390	67.30

ตาราง 21 จำนวน และอัตราผู้ป่วยในรวมทุการวินิจฉัยโรค กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค)พ.ศ.2556-2557 (ต่อ)

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2556		2557	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
087	ลิวคีเมีย (C91-C95) Leukaemia	รวม	5,334	61.32	5,171	57.07
		ชาย	2,742	71.90	2,871	71.35
		หญิง	2,592	53.06	2,300	45.66
088	เนื้องอกร้ายอื่นๆ ของลิมโฟยด์อื่นๆ ระบบสร้างเม็ดเลือด และเนื้อเยื่อ (C88-C90, C96) Other malignant neoplasm of lymphoid, haematopoitic and related tissue	รวม	2,897	33.30	2,780	30.68
		ชาย	1,417	37.16	1,376	34.19
		หญิง	1,480	30.30	1,404	27.87
089	มะเร็งจำกัดเฉพาะที่ของปากมดลูก (D06) Carcinoma in situ of cervix uteri	รวม	228	2.62	149	1.64
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	228	4.67	149	2.96
090	เนื้องอกไม่ร้ายของผิวหนัง (D22-D23) Benign neoplasm of skin	รวม	143	1.64	146	1.61
		ชาย	68	1.78	53	1.32
		หญิง	75	1.54	93	1.85
091	เนื้องอกไม่ร้ายของเต้านม (D24) Benigh neoplasm of breast	รวม	106	1.22	68	0.75
		ชาย	1	0.03	1	0.02
		หญิง	105	2.15	67	1.33
092	ไลโอไมโอมาที่มดลูก (D25) Leiomyoma of uterus	รวม	903	10.38	889	9.81
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	903	18.48	889	17.65
093	เนื้องอกไม่ร้ายที่รังไข่ (D27) Benigh neoplasm of ovary	รวม	396	4.55	370	4.08
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	396	8.11	370	7.35
094	เนื้องอกไม่ร้ายที่ระบบปัสสาวะ (D30) Benigh neoplasm of urinary organs	รวม	90	1.03	84	0.93
		ชาย	53	1.39	50	1.24
		หญิง	37	0.76	34	0.67
095	เนื้องอกไม่ร้ายของสมองและส่วนอื่นของระบบประสาทส่วนกลาง (D33) Benigh neoplasm of brain and other parts of central nervous system	รวม	458	5.27	473	5.22
		ชาย	209	5.48	223	5.54
		หญิง	249	5.10	250	4.96
096	เนื้องอกไม่ร้ายจำกัดเฉพาะที่อื่น ๆ และเนื้องอกบางชนิดที่ไม่ทราบพฤติกรรม (D00-D05, D07-D21,D26,D28-D29 D31-D32, D34-D48) Other in situ and benign neoplasms and neoplasms of uncertain and unknown behaviour	รวม	20,443	235.01	19,869	219.27
		ชาย	9,693	254.16	9,460	235.08
		หญิง	10,750	220.06	10,409	206.63
โรคเลือดอวัยวะที่สร้างเลือดและความผิดปกติที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน (D50-D89)						
097	โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก (D50) Iron deficiency anaemia	รวม	51,160	588.12	47,255	521.49
		ชาย	19,500	511.31	18,169	451.51
		หญิง	31,660	648.09	29,086	577.40
098	โลหิตจางอื่น ๆ (D51-D64) Other anaemia	รวม	330,132	3,795.13	313,785	3,462.84
		ชาย	137,179	3,596.97	129,673	3,222.42
		หญิง	192,953	3,949.83	184,112	3,654.89
099	ภาวะเลือดออกอื่น ๆ โรคเลือดและอวัยวะที่สร้างเลือด (D65-D77) Haemorrhagic conditions and other diseases of blood and blood forming organs	รวม	59,441	683.32	54,849	605.30
		ชาย	30,528	800.47	28,063	697.38
		หญิง	28,913	591.86	26,786	531.74
100	ความผิดปกติที่เกี่ยวกับกลไกของภูมิคุ้มกัน (D80-D89) Certain disorders involving the immune mechanism	รวม	103	1.18	101	1.11
		ชาย	51	1.34	34	0.84
		หญิง	52	1.06	67	1.33

ตาราง 21 จำนวน และอัตราผู้ป่วยในรวมทุการวินิจฉัยโรค กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค)พ.ศ.2556-2557 (ต่อ)

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2556		2557	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
โรคต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม (E00-E90)						
101	การขาดไอโอดีนที่มีความสัมพันธ์กับต่อมธัยรอยด์ (E00-E02) Iodine deficiency related thyroid disorders	รวม	446	5.13	409	4.51
		ชาย	121	3.17	130	3.23
		หญิง	325	6.65	279	5.54
102	โรคพิษธัยรอยด์ (E05) Thyrotoxicosis	รวม	11,794	135.58	11,573	127.72
		ชาย	2,539	66.58	2,652	65.90
		หญิง	9,255	189.45	8,921	177.09
103	ความผิดปกติของต่อมธัยรอยด์อื่น ๆ (E03-E04, E06-E07) Other disorders of thyroid	รวม	13,202	151.77	13,679	150.96
		ชาย	2,896	75.94	3,136	77.93
		หญิง	10,306	210.97	10,543	209.29
104	เบาหวาน (E10-E14) Diabetes mellitus	รวม	450,477	5,178.59	437,623	4,829.48
		ชาย	161,266	4,228.55	157,379	3,910.92
		หญิง	289,211	5,920.28	280,244	5,563.25
105	ทุพโภชนาการ (E40-E46) Malnutrition	รวม	15,880	182.55	12,208	134.72
		ชาย	8,379	219.71	6,494	161.38
		หญิง	7,501	153.55	5,714	113.43
106	การขาดวิตามินเอ (E50) Vitamin A deficiency	รวม	23	0.26	30	0.33
		ชาย	8	0.21	10	0.25
		หญิง	15	0.31	20	0.40
107	การขาดวิตามินอื่น ๆ (E51-E56) Other vitamin deficiencies	รวม	495	5.69	530	5.85
		ชาย	211	5.53	219	5.44
		หญิง	284	5.81	311	6.17
108	ผลที่ตามมาของภาวะทุพโภชนาการและภาวะพร่องโภชนาการอื่น ๆ (E64) Sequelae of malnutrition and other nutritional deficiencies	รวม	48	0.55	48	0.53
		ชาย	20	0.52	26	0.65
		หญิง	28	0.57	22	0.44
109	โรคอ้วน (E66) Obesity	รวม	1,584	18.21	1,446	15.96
		ชาย	347	9.10	352	8.75
		หญิง	1,237	25.32	1,094	21.72
110	การขาดปริมาณของเหลวในร่างกาย (E86) Volume depletion	รวม	25,917	297.94	20,902	230.67
		ชาย	10,251	268.79	8,290	206.01
		หญิง	15,666	320.69	12,612	250.37
111	ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิกอื่น ๆ (E15-E35, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E90) Other Endocrine, nutritional and metabolic disorders	รวม	1,064,102	12,232.70	1,020,585	11,262.87
		ชาย	443,482	11,628.54	426,957	10,610.03
		หญิง	620,620	12,704.36	593,628	11,784.38
โรคทางจิตเวชและความผิดปกติของพฤติกรรม (F00-F99)						
112	สมองเสื่อม (F00-F03) Dementia	รวม	9,018	103.67	7,814	86.23
		ชาย	3,860	101.21	3,269	81.24
		หญิง	5,158	105.59	4,545	90.22
113	ความผิดปกติของพฤติกรรมและจิตประสาทที่เกิดจากการเสพแอลกอฮอล์ (F10) Mental and behavioral disorders due to use of alcohol	รวม	13,512	155.33	11,970	132.10
		ชาย	10,778	282.61	9,562	237.62
		หญิง	2,734	55.97	2,408	47.80
114	ความผิดปกติทางพฤติกรรมและจิตประสาทที่เกิดจากการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทอื่น ๆ (F11-F19) Mental and behavioral disorders due to other psychoactive substance use	รวม	1,699	19.53	1,226	13.53
		ชาย	1,368	35.87	955	23.73
		หญิง	331	6.78	271	5.38

ตาราง 21 จำนวน และอัตราผู้ป่วยในรวมทุการวินิจฉัยโรค กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค)พ.ศ.2556-2557 (ต่อ)

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2556		2557	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
115	จิตเภท พฤติกรรมแบบจิตเภทและความหลงผิด (F20-F29) Schizophrenia, schizotypal and delusional disorders	รวม	8,609	98.97	8,278	91.35
		ชาย	3,813	99.98	3,743	93.01
		หญิง	4,796	98.18	4,535	90.03
116	ความผิดปกติทางอารมณ์ (F30-F39) Mood (affective) disorders	รวม	9,013	103.61	9,929	109.57
		ชาย	2,894	75.88	3,270	81.26
		หญิง	6,119	125.26	6,659	132.19
117	โรคประสาท อาการทางกายที่เกิดจากจิตใจและความเครียด (F40-F48) Neurotic, stress related and somatoform disorders	รวม	8,107	93.20	7,016	77.43
		ชาย	2,229	58.45	1,909	47.44
		หญิง	5,878	120.33	5,107	101.38
118	ภาวะปัญญาอ่อน (F70-F79) Mental retardation	รวม	153	1.76	148	1.63
		ชาย	67	1.76	70	1.74
		หญิง	86	1.76	78	1.55
119	ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมอื่น ๆ (F04 -F09, F50-F69, F80-F99) Other mental and behavioral disorders	รวม	20,989	241.29	20,469	225.89
		ชาย	10,288	269.76	10,169	252.70
		หญิง	10,701	219.05	10,300	204.47
โรกระบบประสาท (G00-G99)						
120	การอักเสบของระบบประสาทส่วนกลาง (G00-G09) Inflammatory diseases of the central nervous system	รวม	5,222	60.03	5,290	58.38
		ชาย	2,871	75.28	2,854	70.92
		หญิง	2,351	48.13	2,436	48.36
121	โรคพาคินสัน (G20) Parkinson's disease	รวม	11,900	136.80	11,575	127.74
		ชาย	5,573	146.13	5,432	134.99
		หญิง	6,327	129.52	6,143	121.95
122	โรคแอลไซเมอร์ (G30) Alzheimer;s disease	รวม	4,620	53.11	4,382	48.36
		ชาย	1,825	47.85	1,713	42.57
		หญิง	2,795	57.21	2,669	52.98
123	มัลติเปิ้ล สเคลอโรสิส (G35) Multiple sclerosis	รวม	64	0.74	54	0.60
		ชาย	22	0.58	15	0.37
		หญิง	42	0.86	39	0.77
124	ลมบ้าหมู (G40-G41) Epilepsy	รวม	15,890	182.67	15,807	174.44
		ชาย	9,069	237.80	9,032	224.45
		หญิง	6,821	139.63	6,775	134.49
125	โรคไมเกรนและกลุ่มอาการปวดศีรษะอื่นๆ (G43-G44) Migraine and other headache syndromes	รวม	4,273	49.12	3,748	41.36
		ชาย	1,468	38.49	1,248	31.01
		หญิง	2,805	57.42	2,500	49.63
126	โรคเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยชั่วคราวและกลุ่มอาการต่อเนื่อง (G45) Transient cerebral ischaemic attacks and related syndromes	รวม	5,692	65.43	5,566	61.42
		ชาย	3,015	79.06	3,037	75.47
		หญิง	2,677	54.80	2,529	50.20
127	ความผิดปกติของเส้นประสาท รากประสาทและปมประสาท (G50-G59) Nerve, nerve root and plexus disorders	รวม	4,085	46.96	3,780	41.71
		ชาย	1,894	49.66	1,699	42.22
		หญิง	2,191	44.85	2,081	41.31
128	สมองพิการและกลุ่มอาการอัมพาตอื่น ๆ (G80-G83) Cerebral palsy and other paralytic syndromes	รวม	18,122	208.33	16,459	181.64
		ชาย	9,909	259.82	9,112	226.44
		หญิง	8,213	168.12	7,347	145.85
129	โรคของระบบประสาทอื่น ๆ (G10-G13, G21-G26, G31-G32, G36-G37, G46-G47, G60-G73, G90-G99) Other diseases of the nervous system	รวม	35,128	403.82	34,529	381.05
		ชาย	16,744	439.04	16,336	405.96
		หญิง	18,384	376.33	18,193	361.16

ตาราง 21 จำนวน และอัตราผู้ป่วยในรวมทุการวินิจฉัยโรค กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค)พ.ศ.2556-2557 (ต่อ)

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2556		2557	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
โรคของตาและส่วนประกอบของตา (H00-H59)						
130	การอักเสบของหนังตา (H00-H01) Inflammation of eyelid	รวม	675	7.76	541	5.97
		ชาย	276	7.24	226	5.62
		หญิง	399	8.17	315	6.25
131	เยื่อบุตาอักเสบและความผิดปกติของเยื่อบุตาอื่น ๆ (H10-H13) Conjunctivitis and other disorders of conjunctiva	รวม	10,633	122.23	10,735	118.47
		ชาย	3,841	100.71	3,938	97.86
		หญิง	6,792	139.04	6,797	134.93
132	กระจกตาอักเสบและความผิดปกติของตาขาว และกระจกตาอื่น ๆ (H15-H19) Keratitis and other disorders of sclera and cornea	รวม	5,023	57.74	4,121	45.48
		ชาย	2,497	65.47	2,048	50.89
		หญิง	2,526	51.71	2,073	41.15
133	ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ (H25-H28) Cataract and other disorders of sclera and cornea	รวม	187,655	2,157.24	167,608	1,849.67
		ชาย	75,158	1,970.72	67,372	1,674.22
		หญิง	112,497	2,302.86	100,236	1,989.83
134	จอประสาทตาหลุดออกและรอยฉีกของจอประสาทตา (H33) Retinal detachments and breaks	รวม	2,166	24.90	2,024	22.34
		ชาย	1,325	34.74	1,190	29.57
		หญิง	841	17.22	834	16.56
135	ต้อหิน (H40-H42) Glaucoma	รวม	12,980	149.22	11,619	128.22
		ชาย	5,569	146.02	5,016	124.65
		หญิง	7,411	151.71	6,603	131.08
136	ตาเหล่ (H49-H50) Strabismus	รวม	419	4.82	390	4.30
		ชาย	179	4.69	181	4.50
		หญิง	240	4.91	209	4.15
137	ความผิดปกติของสายตาและการเพ่งมอง (H52) Disorders of refraction and accommodation	รวม	496	5.70	574	6.33
		ชาย	197	5.17	260	6.46
		หญิง	299	6.12	314	6.23
138	ตาบอดและสายตาสั้นกลาง (H54) Blindness and low vision	รวม	93,884	1,079.27	150,106	1,656.52
		ชาย	37,775	990.50	60,109	1,493.73
		หญิง	56,109	1,148.58	89,997	1,786.57
139	โรคของตาและส่วนประกอบของตาอื่น ๆ (H02-H06, H20-H22, H30-H32, H34-H36, H43-H48, H51, H53, H55-H59) Other diseases of the eye and adnexa	รวม	17,388	199.89	15,890	175.36
		ชาย	7,388	193.72	6,634	164.86
		หญิง	10,000	204.70	9,256	183.75
โรคของหูและปุ่มกกหู (H60-H95)						
140	หูชั้นกลางอักเสบและความผิดปกติของหูชั้นกลางและปุ่มกกหูอื่นๆ (H65-H75) Otitis media and other disorders of middle ear and mastoid	รวม	1,546	17.77	1,325	14.62
		ชาย	716	18.77	630	15.66
		หญิง	830	16.99	695	13.80
141	การสูญเสียการได้ยิน (H90-H91) Hearing loss	รวม	1,320	15.17	1,202	13.26
		ชาย	735	19.27	672	16.70
		หญิง	585	11.98	530	10.52
142	โรคของหูและปุ่มกกหูอื่น ๆ (H60-H62, H80-H83, H92-H95) Other diseases of the ear and mastoid process	รวม	16,809	193.23	14,260	157.37
		ชาย	5,262	137.97	4,485	111.45
		หญิง	11,547	236.37	9,775	194.05
โรครบบั้ไหลเวียนโลหิต (I00-I99)						
143	ไข้รูมาติกเฉียบพลัน (I00-I02) Acute rheumatic fever	รวม	144	1.66	134	1.48
		ชาย	38	1.00	61	1.52
		หญิง	106	2.17	73	1.45

ตาราง 21 จำนวน และอัตราผู้ป่วยในรวมทุการวินิจฉัยโรค กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค)พ.ศ.2556-2557 (ต่อ)

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2556		2557	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
144	โรคหัวใจรูมาติกเรื้อรัง (I05-I09) Chronic rheumatic heart disease	รวม	12,573	144.54	12,025	132.70
		ชาย	4,735	124.16	4,607	114.49
		หญิง	7,838	160.45	7,418	147.26
145	ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุ (I10) Essential (primary) hypertension	รวม	748,232	8,601.52	731,588	8,073.59
		ชาย	308,245	8,082.49	302,303	7,512.33
		หญิง	439,987	9,006.73	429,285	8,521.94
146	โรคความดันโลหิตสูงอื่น ๆ (I11-I15) Other hypertensive diseases	รวม	8,699	100.00	7,004	77.29
		ชาย	3,598	94.34	2,955	73.43
		หญิง	5,101	104.42	4,049	80.38
147	กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (I21-I22) Acute myocardial infarction	รวม	49,313	566.89	47,735	526.79
		ชาย	25,574	670.58	24,914	619.12
		หญิง	23,739	485.95	22,821	453.03
148	โรคหัวใจขาดเลือดอื่น ๆ (I20, I23-I25) Other ischaemic heart diseases	รวม	163,596	1,880.67	154,650	1,706.67
		ชาย	83,613	2,192.42	79,303	1,970.71
		หญิง	79,983	1,637.29	75,347	1,495.75
149	ก้อนเลือดอุดตันในหลอดเลือดใหญ่ของปอด (I26) Pulmonary embolism	รวม	2,033	23.37	2,104	23.22
		ชาย	720	18.88	734	18.24
		หญิง	1,313	26.88	1,370	27.20
150	ความผิดปกติของการนำกระแสไฟฟ้าหัวใจ และหัวใจเต้นผิดจังหวะ (I44-I49) Conduction disorders and cardiac arrhythmias	รวม	133,760	1,537.68	131,971	1,456.39
		ชาย	61,545	1,613.77	60,958	1,514.83
		หญิง	72,215	1,478.27	71,013	1,409.71
151	หัวใจล้มเหลว (I50) Heart failure	รวม	122,169	1,404.43	121,089	1,336.30
		ชาย	50,023	1,311.65	49,692	1,234.86
		หญิง	72,146	1,476.86	71,397	1,417.33
152	โรคหัวใจอื่น ๆ (I27-I43, I51-I52) Other heart diseases	รวม	58,254	669.68	56,460	623.08
		ชาย	25,566	670.37	25,352	630.01
		หญิง	32,688	669.14	31,108	617.54
153	เลือดออกในสมอง (I60-I62) Intracranial haemorrhage	รวม	24,937	286.67	23,422	258.4781484
		ชาย	13,298	348.69	12,587	312.79
		หญิง	11,639	238.26	10,835	215.09
154	เนื้อสมองตาย (I63) Cerebral infarction	รวม	59,060	678.94	56,676	625.46
		ชาย	30,355	795.94	29,565	734.70
		หญิง	28,705	587.60	27,111	538.19
155	เป็นลมหมดสติที่ไม่จัดกลุ่มว่าเป็นจากเลือดออกในสมองหรือเนื้อสมองตายจากการขาดเลือด (I64) Stroke, not specified as haemorrhage or infarction	รวม	12,873	147.99	12,976	143.20
		ชาย	6,885	180.53	6,900	171.47
		หญิง	5,988	122.58	6,076	120.62
156	โรคหลอดเลือดในสมองอื่น ๆ (I65-I69) Other cerebrovascular diseases	รวม	71,716	824.43	68,869	760.02
		ชาย	37,897	993.70	36,494	906.89
		หญิง	33,819	692.29	32,375	642.69
157	อะเทอโรสเคลอโรสิส (I70) Atherosclerosis	รวม	1,520	17.47	1,455	16.06
		ชาย	746	19.56	729	18.12
		หญิง	774	15.84	726	14.41
158	โรคหลอดเลือดส่วนปลายอื่น ๆ (I73) Other peripheral vascular diseases	รวม	1,011	11.62	1,172	12.93
		ชาย	542	14.21	589	14.64
		หญิง	469	9.60	583	11.57

ตาราง 21 จำนวน และอัตราผู้ป่วยในรวมทุการวินิจฉัยโรค กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค)พ.ศ.2556-2557 (ต่อ)

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2556		2557	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
159	ลิ่มเลือดและก้อนเลือดอุดตันที่หลอดเลือดแดง (I74) Aterial embolism and thrombosis	รวม	3,730	42.88	3,915	43.20
		ชาย	1,983	52.00	2,045	50.82
		หญิง	1,747	35.76	1,870	37.12
160	โรคของหลอดเลือดแดง หลอดเลือดแดงย่อย และแคปิลารีอื่น ๆ (I71-I72, I77-I79) Other disease of arteries, arterioles and capillaries	รวม	9,107	104.69	9,090	100.31
		ชาย	5,379	141.04	5,274	131.06
		หญิง	3,728	76.31	3,816	75.75
161	หลอดเลือดดำอักเสบ หลอดเลือดดำอักเสบมีลิ่มเลือด ก่อนเลือด และลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ (I80-I82) Phlebitis, thrombophlebitis, venous embolism and thrombosis	รวม	9,713	111.66	9,451	104.30
		ชาย	3,917	102.71	3,678	91.40
		หญิง	5,796	118.65	5,773	114.60
162	หลอดเลือดดำขอดของรยางส่วนล่าง (I83) Varicose veins of lower extremities	รวม	609	7.00	562	6.20
		ชาย	277	7.26	256	6.36
		หญิง	332	6.80	306	6.07
163	ริดสีดวงทวาร (I84) Haemorrhoids	รวม	7,507	86.30	7,051	77.81
		ชาย	4,436	116.32	4,047	100.57
		หญิง	3,071	62.86	3,004	59.63
164	โรคอื่น ๆ ของระบบไหลเวียนโลหิต (I85-I99) Other diseases of the circulatory system	รวม	18,872	216.95	18,485	203.99
		ชาย	10,007	262.39	9,782	243.09
		หญิง	8,865	181.47	8,703	172.77
โรคระบบหายใจ (J00-J99)						
165	คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน (J02-J03) Acute pharyngitis and acute tonsillitis	รวม	5,679	65.28	4,579	50.53
		ชาย	2,152	56.43	1,729	42.97
		หญิง	3,527	72.20	2,850	56.58
166	กล่องเสียงและหลอดลมใหญ่อักเสบเฉียบพลัน (J04) Acute laryngitis and tracheitis	รวม	249	2.86	206	2.27
		ชาย	116	3.04	84	2.09
		หญิง	133	2.72	122	2.42
167	การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่นๆ (J00-J01, J05-J06) Other acute upper respiratory infections	รวม	9,812	112.80	8,719	96.22
		ชาย	3,931	103.07	3,474	86.33
		หญิง	5,881	120.39	5,245	104.12
168	ไข้หวัดใหญ่ (J10-J11) Influenza	รวม	2,741	31.51	3,113	34.35
		ชาย	1,222	32.04	1,373	34.12
		หญิง	1,519	31.09	1,740	34.54
169	ปอดบวม (J12-J18) Pneumonia	รวม	170,725	1,962.62	175,436	1,936.06
		ชาย	89,687	2,351.68	92,542	2,299.70
		หญิง	81,038	1,658.88	82,894	1,645.57
170	หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน (J20-J21) Acute bronchitis and acute bronchiolitis	รวม	27,034	310.78	27,434	302.75
		ชาย	11,976	314.02	12,229	303.89
		หญิง	15,058	308.24	15,205	301.84
171	ไซนัสอักเสบเรื้อรัง (J32) Chronic sinusitis	รวม	1,490	17.13	1,526	16.84
		ชาย	743	19.48	723	17.97
		หญิง	747	15.29	803	15.94
172	โรคอื่นของจมูกและไซนัส (J30-J31, J33-J34) Other diseases of nose and nasal sinuses	รวม	2,798	32.17	2,515	27.75
		ชาย	1,453	38.10	1,297	32.23
		หญิง	1,345	27.53	1,218	24.18

ตาราง 21 จำนวน และอัตราผู้ป่วยในรวมทุการวินิจฉัยโรค กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค)พ.ศ.2556-2557 (ต่อ)

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2556		2557	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
173	โรคเรื้อรังของต่อมทอนซิลและต่อมน้ำเหลืองในคอ (J35) Chronic diseases of tonsils and adenoids	รวม	151	1.74	143	1.58
		ชาย	57	1.49	53	1.32
		หญิง	94	1.92	90	1.79
174	โรคอื่น ๆ ของระบบหายใจส่วนบน (J36-J39) Other diseases of upper respiratory tract	รวม	2,223	25.56	1,911	21.09
		ชาย	1,186	31.10	1,036	25.74
		หญิง	1,037	21.23	875	17.37
175	โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น (J40-J44) Bronchitis, emphysema and other chronic obstructive pulmonary diseases	รวม	191,645	2,203.11	185,745	2,049.83
		ชาย	140,142	3,674.66	135,375	3,364.12
		หญิง	51,503	1,054.29	50,370	999.92
176	โรคหืด (J45-J46) Asthma	รวม	30,496	350.58	29,619	326.87
		ชาย	6,257	164.06	6,052	150.39
		หญิง	24,239	496.18	23,567	467.84
177	โรคหลอดลมเล็กโป่งพอง (J47) Bronchioectasis	รวม	9,512	109.35	8,925	98.49
		ชาย	4,097	107.43	3,919	97.39
		หญิง	5,415	110.85	5,006	99.38
178	โรคฝุ่นสะสมในปอด (J60-J65) Pneumoconiosis	รวม	95	1.09	86	0.95
		ชาย	57	1.49	56	1.39
		หญิง	38	0.78	30	0.60
179	โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินหายใจ (J22, J66-J99) Other diseases of the respiratory system	รวม	157,003	1,804.87	157,281	1,735.71
		ชาย	85,705	2,247.27	86,213	2,142.42
		หญิง	71,298	1,459.50	71,068	1,410.80
โรกระบบย่อยอาหาร (K00-K93)						
180	ฟันผุ (K02) Dental caries	รวม	1,478	16.99	1,413	15.59
		ชาย	674	17.67	661	16.43
		หญิง	804	16.46	752	14.93
181	ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง (K00-K01, K03-K08) Other disorders of teeth and supporting structures	รวม	4,328	49.75	4,137	45.65
		ชาย	1,982	51.97	1,885	46.84
		หญิง	2,346	48.02	2,252	44.71
182	โรคอื่น ๆ ของช่องปาก ต่อม้ำลาย และขากรรไกร (K09-K14) Other diseases of the oral cavity, salivary glands and jaws	รวม	5,807	66.76	5,171	57.07
		ชาย	2,364	61.99	2,078	51.64
		หญิง	3,443	70.48	3,093	61.40
183	แผลเปื่อยของกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น (K25-K27) Gastric and duodenal ulcer	รวม	26,897	309.20	23,515	259.50
		ชาย	15,136	396.88	13,523	336.05
		หญิง	11,761	240.75	9,992	198.36
184	กระเพาะอาหารอักเสบและลำไส้เล็กส่วนต้นอักเสบ (K29) Gastritis and duodenitis (K29)	รวม	21,809	250.71	20,377	224.87
		ชาย	10,160	266.41	9,618	239.01
		หญิง	11,649	238.46	10,759	213.58
185	โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและลำไส้เล็กส่วนต้น (K20-K23, K28, K30-K31) Other diseases of oesophagus, stomach and duodenum	รวม	76,047	874.22	71,537	789.46
		ชาย	30,179	791.32	28,396	705.65
		หญิง	45,868	938.94	43,141	856.41
186	โรคของไส้ติ่ง (K35-K38) Diseases of appendix	รวม	13,794	158.57	12,529	138.27
		ชาย	5,892	154.49	5,381	133.72
		หญิง	7,902	161.76	7,148	141.90

ตาราง 21 จำนวน และอัตราผู้ป่วยในรวมทุการวินิจฉัยโรค กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค)พ.ศ.2556-2557 (ต่อ)

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2556		2557	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
187	ไส้เลื่อนที่บริเวณขาหนีบ (K40) Inguinal hernia	รวม	15,300	175.89	14,296	157.77
		ชาย	14,790	387.81	13,771	342.21
		หญิง	510	10.44	525	10.42
188	ไส้เลื่อนอื่น ๆ (K41-K46) Other hernia	รวม	2,787	32.04	2,644	29.18
		ชาย	1,046	27.43	1,042	25.89
		หญิง	1,741	35.64	1,602	31.80
189	โรคโครนและลำไส้ใหญ่อักเสบแผลเปื่อย (K50-K51) Crohn's disease and ulcerative colitis	รวม	365	4.20	354	3.91
		ชาย	172	4.51	190	4.72
		หญิง	193	3.95	164	3.26
190	ลำไส้ไม่ทำงานและลำไส้เกิดอุดตันแบบไม่มีไส้เลื่อน (K56) Paralytic ileus and intestinal obstruction without hernia	รวม	17,618	202.53	17,084	188.53
		ชาย	10,295	269.95	9,805	243.66
		หญิง	7,323	149.90	7,279	144.50
191	โรคตึงเนื้อของลำไส้ (K57) Diverticular disease of intestine	รวม	3,876	44.56	3,651	40.29
		ชาย	1,769	46.38	1,727	42.92
		หญิง	2,107	43.13	1,924	38.19
192	โรคอื่น ๆ ของลำไส้และเยื่อช่องท้อง (K52-K55, K58-K67) Other diseases of intestine and peritoneum	รวม	44,022	506.07	43,477	479.80
		ชาย	21,615	566.77	21,311	529.59
		หญิง	22,407	458.68	22,166	440.03
193	โรคตับเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ (K70) Alcoholic liver disease	รวม	10,616	122.04	9,442	104.20
		ชาย	7,135	187.09	6,336	157.45
		หญิง	3,481	71.26	3,106	61.66
194	โรคอื่น ๆ ของตับ (K71-K77) Other disease of liver	รวม	52,524	603.81	49,027	541.05
		ชาย	26,827	703.43	25,355	630.08
		หญิง	25,697	526.03	23,672	469.92
195	โรคนิ่วในระบบน้ำดีและถุงน้ำดีอักเสบ (K80-K81) Cholelithiasis and cholecystitis	รวม	31,560	362.81	29,291	323.25
		ชาย	13,436	352.31	12,628	313.81
		หญิง	18,124	371.01	16,663	330.78
196	ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันและโรคอื่น ๆ ของตับอ่อน (K85-K86) Acute pancreatitis and other disease of the pancreas	รวม	3,995	45.93	3,787	41.79
		ชาย	2,208	57.90	2,125	52.81
		หญิง	1,787	36.58	1,662	32.99
197	โรคอื่น ๆ ของระบบย่อยอาหาร (K82-K83, K87-K93) Other diseases of the digestive system	รวม	65,876	757.30	63,154	696.95
		ชาย	36,521	957.62	35,089	871.97
		หญิง	29,355	600.91	28,065	557.13
โรคของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (L00-L99)						
198	โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (L00-L08) Infection of the skin and subcutaneous tissue	รวม	57,632	662.53	51,998	573.83
		ชาย	29,049	761.69	26,340	654.56
		หญิง	28,583	585.11	25,658	509.35
199	โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (L10-L99) Other diseases of the skin and subcutaneous tissue	รวม	45,907	527.74	45,270	499.59
		ชาย	21,252	557.25	20,930	520.12
		หญิง	24,655	504.70	24,340	483.18
โรกระบบกล้ามเนื้อโครงร่างและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (M00-M99)						
200	ข้ออักเสบรูมาตอยด์และข้ออักเสบหลายข้อ (M05-M14) Rheumatoid arthritis and other inflammatory polyarthropathies	รวม	92,745	1,066.18	92,165	1,017.11
		ชาย	60,028	1,573.99	58,759	1,460.18
		หญิง	32,717	669.73	33,406	663.16

ตาราง 21 จำนวน และอัตราผู้ป่วยในรวมทุการวินิจฉัยโรค กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค)พ.ศ.2556-2557 (ต่อ)

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2556		2557	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
201	โรคข้อเสื่อม (M15-M19) Arthrosis	รวม	23,265	267.45	21,438	236.58
		ชาย	5,365	140.68	4,765	118.41
		หญิง	17,900	366.42	16,673	330.98
202	ความพิการของแขนขา (M20-M21) Acquired deformities of limbs	รวม	415	4.77	400	4.41
		ชาย	138	3.62	124	3.08
		หญิง	277	5.67	276	5.48
203	ความผิดปกติอื่น ๆ ของข้อ (M00-M03, M22-M25) Other disorders of joints	รวม	7,520	86.45	7,165	79.07
		ชาย	3,426	89.83	3,276	81.41
		หญิง	4,094	83.81	3,889	77.20
204	ความผิดปกติของระบบเนื้อเยื่อประสาน (M30-M36) Systemic connective tissue disorders	รวม	3,485	40.06	3,515	38.79
		ชาย	951	24.94	919	22.84
		หญิง	2,534	51.87	2,596	51.53
205	กระดูกสันหลังและหมอนรองกระดูกสันหลังอื่น ๆ ผิดปกติ (M50-M51) Cervical and other intervertebral disc disorders	รวม	1,803	20.73	1,727	19.06
		ชาย	926	24.28	864	21.47
		หญิง	877	17.95	863	17.13
206	พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ (M40-M49, M53-M54) Other dorsopathies	รวม	33,405	384.02	31,361	346.09
		ชาย	13,182	345.65	12,474	309.98
		หญิง	20,223	413.97	18,887	374.93
207	เนื้อเยื่อผิดปกติ (M60-M79) Soft tissue disorders	รวม	37,871	435.36	34,534	381.11
		ชาย	17,286	453.26	15,619	388.14
		หญิง	20,585	421.38	18,915	375.49
208	ความผิดปกติของความหนาแน่นของเนื้อกระดูกและโครงสร้าง (M80-M85) Disorders of bone density and structure	รวม	9,934	114.20	8,998	99.30
		ชาย	1,870	49.03	1,766	43.89
		หญิง	8,064	165.07	7,232	143.57
209	กระดูกอักเสบ (M86) Osteomyelitis	รวม	3,487	40.09	3,587	39.59
		ชาย	1,884	49.40	1,975	49.08
		หญิง	1,603	32.81	1,612	32.00
210	โรคอื่น ๆ ของระบบกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อประสาน (M87-M99) Other diseases of the musculoskeletal system and connective tissue	รวม	4,660	53.57	4,525	49.94
		ชาย	1,916	50.24	1,894	47.07
		หญิง	2,744	56.17	2,631	52.23
โรคของระบบสืบพันธุ์และปัสสาวะ (N00-N99)						
211	กลุ่มอาการไตอักเสบเฉียบพลันและชนิดกำเริบเร็ว (N00-N01) Acute and rapidly progressive nephritic syndromes	รวม	289	3.32	210	2.32
		ชาย	139	3.64	102	2.53
		หญิง	150	3.07	108	2.14
212	โรคของหน่วยไตอื่น ๆ (N02-N08) Other glomerular diseases	รวม	17,879	205.53	15,965	176.18
		ชาย	7,051	184.88	6,152	152.88
		หญิง	10,828	221.65	9,813	194.80
213	โรคของท่อและเนื้อเยื่อระหว่างท่อในไต (N10-N16) Renal tubulo-interstitial diseases	รวม	51,805	595.54	46,666	514.99
		ชาย	19,069	500.01	17,526	435.53
		หญิง	32,736	670.12	29,140	578.47
214	ไตวาย (N17-N19) Renal failure	รวม	361,339	4,153.88	374,272	4,130.35
		ชาย	172,855	4,532.43	178,055	4,424.73
		หญิง	188,484	3,858.35	196,217	3,895.19
215	นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ (N20-N23) Urolithiasis	รวม	25,562	293.86	22,992	253.73
		ชาย	15,637	410.02	14,264	354.47
		หญิง	9,925	203.17	8,728	173.26

ตาราง 21 จำนวน และอัตราผู้ป่วยในรวมทุการวินิจฉัยโรค กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค)พ.ศ.2556-2557 (ต่อ)

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2556		2557	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
216	กระเพาะปัสสาวะอักเสบ (N30) Cystitis	รวม	13,242	152.23	12,084	133.36
		ชาย	4,279	112.20	3,797	94.36
		หญิง	8,963	183.48	8,287	164.51
217	โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะ (N25-N29, N31-N39) Other diseases of the urinary system	รวม	116,206	1,335.88	111,919	1,235.10
		ชาย	45,488	1,192.74	43,864	1,090.04
		หญิง	70,718	1,447.63	68,055	1,350.99
218	ต่อมลูกหมากโตจากการเพิ่มจำนวนเซลล์ (N40) Hyperplasia of prostate	รวม	56,840	653.42	53,788	593.59
		ชาย	56,840	1,490.40	53,788	1,336.65
		หญิง	0	0.00	0	0.00
219	ความผิดปกติอื่น ๆ ของต่อมลูกหมาก (N41-N42) Other disorders of prostate	รวม	618	7.10	523	5.77
		ชาย	618	16.20	523	13.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
220	ถุงน้ำและถุงที่มีอสุจิที่อัณฑะ (N43) Hydrocele and spermatocele	รวม	639	7.35	572	6.31
		ชาย	639	16.76	572	14.21
		หญิง	0	0.00	0	0.00
221	หนังหุ้มปลายองคชาตยาวเกินไป ปลายติบรูเปิดไม่ได้ หรือเปิดลำบาก (N47) Redundant prepuce, phimosis and paraphimosis	รวม	756	8.69	688	7.59
		ชาย	756	19.82	688	17.10
		หญิง	0	0.00	0	0.00
222	โรคอื่น ๆ ของอวัยวะสืบพันธุ์ชาย (N44-N46, N48-N51) Other disease of male genital organs	รวม	2,747	31.58	2,524	27.85
		ชาย	2,747	72.03	2,524	62.72
		หญิง	0	0.00	0	0.00
223	ความผิดปกติของเต้านม (N60-N64) Disorders of breast	รวม	1,132	13.01	1,083	11.95
		ชาย	186	4.88	178	4.42
		หญิง	946	19.37	905	17.97
224	ปีกมดลูกและรังไข่อักเสบ (N70) Salpingitis and oophoritis	รวม	84	0.97	66	0.73
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	84	1.72	66	1.31
225	ปากมดลูกอักเสบ (N72) Inflammatory disease of cervix uteri	รวม	146	1.68	140	1.54
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	146	2.99	140	2.78
226	การอักเสบอื่น ๆ ของอวัยวะในอุ้งเชิงกรานสตรี (N71, N73-N77) Other inflammatory diseases of female pelvic organs	รวม	1,475	16.96	1,417	15.64
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	1,475	30.19	1,417	28.13
227	เยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ (N80) Endometriosis	รวม	178	2.05	213	2.35
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	178	3.64	213	4.23
228	การหย่อนตัวของอวัยวะสืบพันธุ์สตรี (N81) Female genital prolapse	รวม	3,573	41.07	3,375	37.25
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	3,573	73.14	3,375	67.00
229	ความผิดปกติอื่นที่ไม่ใช่การอักเสบของรังไข่ ท่อรังไข่ และเอ็นยึดมดลูก (N83) Noninflammatory disorder of ovary, fallopian tube and broad ligament	รวม	699	8.04	576	6.36
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	699	14.31	576	11.43
230	ความผิดปกติของระดู (N91-N92) Disorder of menstruation	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00

ตาราง 21 จำนวน และอัตราผู้ป่วยในรวมทุการวินิจฉัยโรค กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค)พ.ศ.2556-2557 (ต่อ)

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2556		2557	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
231	การหมดประจำเดือนและความผิดปกติอื่นในระยะหมดประจำเดือน (N95) Menopausal and other perimenopausal disorders	รวม	1,306	15.01	1,292	14.26
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	1,306	26.73	1,292	25.65
232	ภาวะมีบุตรยากในสตรี (N97) Female infertility	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
233	ความผิดปกติอื่น ๆ ของท่อทางเดินปัสสาวะและสืบพันธุ์ (N82, N90, N93-N94, N96, N98-N99) Other disorders of genitourinary tract	รวม	2,230	25.64	2,140	23.62
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	2,230	45.65	2,140	42.48
การตั้งครรภ์ การคลอดและระยะหลังคลอด (O00-O99)						
234	แท้งเอง (O03) Spontaneous abortion	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
235	การทำแท้งโดยเหตุผลทางการแพทย์ (O04) Medical abortion	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
236	การตั้งครรภ์อื่น ๆ ที่สิ้นสุดโดยการแท้ง (O00-O02, O05-O08) Other pregnancies with abortive outcome	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
237	การบวม การมีโปรตีนในปัสสาวะ และความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ระยะคลอดและระยะหลังคลอด (O10-O16) Oedema, proteinuria and hypertensive disorders in pregnancy, childbirth and the puerperium	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
238	รกเกาะต่ำ รกลอกตัวก่อนกำหนด และตกเลือดก่อนคลอด (O44-O46) Placenta praevia, premature separation of placenta and antepartum haemorrhage	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
239	การดูแล มารดาอื่น ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ์ และถุงน้ำคร่ำ และปัญหาที่อาจจะเกิดได้ในระยะคลอด (O30-O43, O47-O48) Other maternal care related to fetus and amniotic cavity and possible delivery problems	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
240	การคลอดติดขัด (O64-O66) Obstructed labour	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
241	ตกเลือดหลังคลอด (O72) Postpartum haemorrhage	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
242	ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ของการตั้งครรภ์ และการคลอด (O20-O29, O60-O63, O67-O71, O73-O75, O81-O84) Other complications of pregnancy and delivery	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
243	การคลอดของครรภ์เดียว (O80) Single spontaneous delivery	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00

ตาราง 21 จำนวน และอัตราผู้ป่วยในรวมทุการวินิจฉัยโรค กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค)พ.ศ.2556-2557 (ต่อ)

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2556		2557	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
244	ภาวะแทรกซ้อนที่ส่วนใหญ่พบในระยะหลังคลอดและภาวะทางสูติกรรมอื่น ๆ ที่มีได้ระบุรายละเอียด (O85-O99) Complications predominantly related to the puerperium and other obstetric conditions, not Elsewhere classified	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
ภาวะบางอย่างที่เกิดในระยะปริกำเนิด (P00-P96)						
245	ทารกในครรภ์และแรกเกิดที่ได้รับผลจากปัจจัยทางมารดา และโรคแทรกในระยะตั้งครรภ์ เจ็บครรภ์ และคลอด (P00-P04) Fetus and newborn affected by maternal factors and by complications of pregnancy, labor and delivery	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
246	ทารกในครรภ์โตช้าทารกในครรภ์ขาดสารอาหาร และความผิดปกติเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ระยะสั้น และน้ำหนักทารกแรกเกิดน้อย (P05-P07) Slow fetal growth, fetal malnutrition and disorders related to short gestation and low birth weight	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
247	บาดเจ็บจากการคลอด (P10-P15) Birth trauma	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
248	ขาดออกซิเจนขณะอยู่ในโพรงมดลูก และภาวะแอสฟิกเซียเมื่อแรกเกิด (P20-P21) Intrauterine hypoxia and birth asphyxia	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
249	ภาวะหายใจผิดปกติอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด (P22-P28) Other respiratory disorders originating in the perinatal period	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
250	การติดเชื้อแต่กำเนิดและโรคปรสิต (P35-P37) Congenital infectious and parasitic diseases	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
251	การติดเชื้อเฉพาะอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด (P38-P39) Other infections specific to the perinatal period	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
252	โรคเม็ดเลือดแดงของทารกในครรภ์และแรกเกิด (P55) Haemolytic disease of fetus and newborn	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
253	ภาวะอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด (P08, P29, P50-P54, P56-P96) Other conditions originating in the perinatal period	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
ความผิดปกติ ความพิการแต่กำเนิด และโครโมโซมผิดปกติ (Q00-Q99)						
254	กระดูกสันหลังแยก (Q05) Spina blfida	รวม	6	0.07	6	0.07
		ชาย	2	0.05	2	0.05
		หญิง	4	0.08	4	0.08
255	ความผิดปกติอื่น ๆ แต่กำเนิดของระบบประสาท (Q00-Q04, Q06-Q07) Other congenital malformations of the nervous system	รวม	53	0.61	48	0.53
		ชาย	18	0.47	19	0.47
		หญิง	35	0.72	29	0.58
256	ความผิดปกติแต่กำเนิดของระบบไหลเวียนโลหิต (Q20-Q28) Congenital malformation of the circulatory	รวม	1,182	13.59	1,080	11.92
		ชาย	447	11.72	381	9.47
		หญิง	735	15.05	699	13.88

ตาราง 21 จำนวน และอัตราผู้ป่วยในรวมทุการวินิจฉัยโรค กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค)พ.ศ.2556-2557 (ต่อ)

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2556		2557	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
257	ปากแหว่งและเพดานโหว่ (Q35-Q37) Cleft lip and cleft palate	รวม	8	0.09	9	0.10
		ชาย	7	0.18	4	0.10
		หญิง	1	0.02	5	0.10
258	ลำไส้เล็กไม่มี ดันและตีบ (Q41) Absence, atresia and stenosis of small intestine	รวม	3	0.03	1	0.01
		ชาย	1	0.03	1	0.02
		หญิง	2	0.04	0	0.00
259	ความผิดปกติแต่กำเนิดอื่น ๆ ของระบบย่อยอาหาร (Q38-Q40, Q42-Q45) Other congenital malformations of the digestive system	รวม	174	2.00		
		ชาย	80	2.10	131	1.45
		หญิง	94	1.92	66	1.64
				65	1.29	
260	อัณฑะไม่ลงถุง (Q53) Undescended testicle	รวม	27	0.31	23	0.25
		ชาย	27	0.71	23	0.57
		หญิง	0	0.00	0	0.00
261	ความผิดปกติอื่น ๆ ของระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ (Q50-Q52, Q54-Q64) Other malformations of the genitourinary system	รวม	386	4.44	379	4.18
		ชาย	179	4.69	174	4.32
		หญิง	207	4.24	205	4.07
262	ความพิการแต่กำเนิดของสะโพก (Q65) Congenital deformities of hip	รวม	15	0.17	12	0.13
		ชาย	4	0.10	1	0.02
		หญิง	11	0.23	11	0.22
263	ความพิการแต่กำเนิดของเท้า (Q66) Congenital deformities of feet	รวม	7	0.08	4	0.04
		ชาย	4	0.10	2	0.05
		หญิง	3	0.06	2	0.04
264	ความผิดปกติและความพิการแต่กำเนิดอื่น ๆ ของระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง (Q67-Q79) Other congenital malformations and deformations of the musculoskeletal system	รวม	86	0.99	74	0.82
		ชาย	36	0.94	30	0.75
		หญิง	50	1.02	44	0.87
265	ความผิดปกติแต่กำเนิดอื่น ๆ (Q10-Q18, Q30-Q34, Q80-Q89) Other congenital malformations	รวม	338	3.89	270	2.98
		ชาย	158	4.14	126	3.13
		หญิง	180	3.68	144	2.86
266	ความผิดปกติของโครโมโซมที่มีได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น (Q90-Q99) Chromosomal abnormalities, not Elsewhere classified	รวม	22	0.25	24	0.26
		ชาย	4	0.10	12	0.30
		หญิง	18	0.37	12	0.24
อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจทั้งคลินิกและตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มีได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น (R00-R99)						
267	ปวดท้องและปวดอุ้งเชิงกราน (R10) Abdominal and pelvic pain	รวม	7,030	80.82	6,483	71.54
		ชาย	3,001	78.69	2,798	69.53
		หญิง	4,029	82.48	3,685	73.15
268	ไข้ไม่ทราบสาเหตุ (R50) Fever of unknown origin	รวม	21,878	251.51	21,144	233.34
		ชาย	9,880	259.06	9,871	245.30
		หญิง	11,998	245.60	11,273	223.79
269	ชราภาพ (R54) Senility	รวม	5,201	59.79	3,518	38.82
		ชาย	2,016	52.86	1,437	35.71
		หญิง	3,185	65.20	2,081	41.31
270	อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจทางคลินิกและตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มีได้มีรหัสระบุไว้ (R00-R09, R11-R49, R51-R53, R55-R99) Other symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not Elsewhere classified	รวม	308,428	3,545.63	307,772	3,396.48
		ชาย	145,595	3,817.65	145,679	3,620.17
		หญิง	162,833	3,333.26	162,093	3,217.78

ตาราง 21 จำนวน และอัตราผู้ป่วยในรวมทุการวินิจฉัยโรค กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค)พ.ศ.2556-2557 (ต่อ)

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2556		2557	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
	การบาดเจ็บ การเป็นพิษและผลติดตามจากเหตุภายนอก (S00-T98)					
271	กระดูกแตกหักบริเวณกะโหลกศีรษะและกระดูกหน้า (S02) Fracture of skull and facial bones	รวม	3,092	35.55	2,958	32.64
		ชาย	2,232	58.53	2,138	53.13
		หญิง	860	17.60	820	16.28
272	กระดูกคอ กระดูกซี่โครง หรือกระดูกเชิงกรานหัก (S12, S22, S32, T08) Fracture of neck, thorax and pelvis	รวม	9,697	111.47	8,941	98.67
		ชาย	5,082	133.26	4,736	117.69
		หญิง	4,615	94.47	4,205	83.48
273	กระดูกต้นขา แตก หัก ร้าว (S72) Fracture of femur	รวม	19,450	223.59	18,714	206.52
		ชาย	5,411	141.88	5,027	124.92
		หญิง	14,039	287.38	13,687	271.71
274	กระดูกแตกหักของแขนขาอื่น ๆ (S42, S52, S62, S82, S92, T10, T12) Fracture of other limb bones	รวม	21,781	250.39	19,674	217.12
		ชาย	10,498	275.27	9,334	231.95
		หญิง	11,283	230.97	10,340	205.26
275	กระดูกแตกหักหลายบริเวณในร่างกาย (T02) Fracture involving multiple body regions	รวม	40	0.46	25	0.28
		ชาย	20	0.52	16	0.40
		หญิง	20	0.41	9	0.18
276	กระดูกเคลื่อน เคล็ด ชัด บริเวณร่างกายหลายแห่งที่ระบุเฉพาะ (S03, S13, S23, S33, S43, S53, S63, S73, S83, S93, T03) Dislocations, sprains and strains of specified and multiple body regions	รวม	3,944	45.34	3,468	38.27
		ชาย	1,871	49.06	1,698	42.20
		หญิง	2,073	42.44	1,770	35.14
277	การบาดเจ็บของตาและเบ้าตา (S05) Injury of eye and orbi	รวม	2,079	23.90	1,859	20.52
		ชาย	1,360	35.66	1,183	29.40
		หญิง	719	14.72	676	13.42
278	การบาดเจ็บภายในกะโหลกศีรษะ (S06) Intracranial injury	รวม	16,134	185.47	15,126	166.93
		ชาย	9,946	260.79	9,237	229.54
		หญิง	6,188	126.67	5,889	116.91
279	การบาดเจ็บของอวัยวะภายในอื่น ๆ (S26-S27, S36-S37) Injury of other internal organs	รวม	4,161	47.83	3,645	40.23
		ชาย	3,202	83.96	2,913	72.39
		หญิง	959	19.63	732	14.53
280	การบาดเจ็บจากการบดอัดและการบาดเจ็บที่เกิดจากตัดขาดบริเวณร่างกายหลายแห่งที่ระบุเฉพาะ S17-S18, S28, S38, S47-S48, S57-S58, S67-S68, S77-S78, S87-S88, S97-S98, T04-T05) Crushing injuries and traumatic amputations of specified and multiple body regions (S07-S08,	รวม	1,005	11.55	995	10.98
		ชาย	780	20.45	763	18.96
		หญิง	225	4.61	232	4.61
281	การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ ,ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย (S00-S01, S04, S09-S11, S09-S11, S14-S16, S19-S21, S24-S25, S29-S31, S34-S35, S39-S41, S44-S46, S49-S51, S54-S56, S59-S61, S64-S66, S69-S71, S74-S76, S79-S81, S84-S86, S89-S91, S94-S96, S99, T00-T01, T06-T07, T09, T11, T13-T14) Other injuries of specified, unspecified and multiple body regions	รวม	37,008	425.44	32,219	355.56
		ชาย	22,530	590.76	19,110	474.89
		หญิง	14,478	296.37	13,109	260.23
282	ผลของวัตถุแปลกปลอมผ่านเข้าทางทวารธรรมชาติของร่างกาย (T15-T19) Effects of foreign body entering through natural orifice	รวม	1,099	12.63	967	10.67
		ชาย	608	15.94	507	12.60
		หญิง	491	10.05	460	9.13

ตาราง 21 จำนวน และอัตราผู้ป่วยในรวมทุการวินิจฉัยโรค กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค)พ.ศ.2556-2557 (ต่อ)

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2556		2557	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
283	แผลถูกความร้อนและถูกสารกัดกร่อน (T20-T32) Burns and corrosions	รวม	2,971	34.15	2,868	31.65
		ชาย	1,482	38.86	1,438	35.73
		หญิง	1,489	30.48	1,430	28.39
284	การเป็นพิษจากยา เครื่องยาและชีววัตถุ (T36-T50) Poisoing by drugs and biological substances	รวม	9,255	106.39	8,166	90.12
		ชาย	3,818	100.11	3,551	88.24
		หญิง	5,437	111.30	4,615	91.61
285	การเป็นพิษจากสารที่โดยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ใช้เป็นยา (T51-T65) Toxic effects of substances chiefly nonmedicinal as to source	รวม	7,979	91.72	7,761	85.65
		ชาย	4,037	105.85	3,923	97.49
		หญิง	3,942	80.69	3,838	76.19
286	กลุ่มอาการจากการทารุณ (T74) Maltreatment syndromes	รวม	25	0.29	10	0.11
		ชาย	10	0.26	2	0.05
		หญิง	15	0.31	8	0.16
287	อื่น ๆ และที่มีได้ระบุผลของสาเหตุภายนอก (T33 -T35, T66 -T73, T75 -T78) Other and unspecflied effects of external causes	รวม	3,539	40.68	3,725	41.11
		ชาย	1,595	41.82	1,716	42.64
		หญิง	1,944	39.79	2,009	39.88
288	ภาวะแทรกซ้อนระยะแรกของการบาดเจ็บบางชนิดและภาวะแทรกซ้อนของการรักษาทางศัลยกรรมและอายุรกรรมที่มีได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น (T79-T88) Certain early complications of trauma and complications of surgical and medical care, note Elsewhere classified	รวม	43,409	499.02	43,196	476.70
		ชาย	22,649	593.88	22,341	555.18
		หญิง	20,760	424.97	20,855	414.00
289	ผลระยะล่าช้าของการบาดเจ็บ การเป็นพิษและผลที่ตามมาจากสาเหตุภายนอกอื่น ๆ (T90-T98) Sequela of injuries, of poisoning and of other consequences of external causes	รวม	514	5.91	458	5.05
		ชาย	294	7.71	235	5.84
		หญิง	220	4.50	223	4.43
ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อสถานะสุขภาพและการเข้ารับบริการสุขภาพ (Z00-Z99)						
290	บุคคลขอรับบริการเพื่อการตรวจและชันสูตร (Z00-Z13) Persons encountering health services for examination and investigation	รวม	14,876	171.01	12,156	134.15
		ชาย	7,102	186.22	5,351	132.97
		หญิง	7,774	159.14	6,805	135.09
291	การติดเชื้อไวรัสโดยไม่มีอาการ (Z21) Asymptomatic human immunodeficiency virus (HIV) infection status	รวม	121	1.39	106	1.17
		ชาย	69	1.81	64	1.59
		หญิง	52	1.06	42	0.83
292	บุคคลที่มีอาการที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่อ (Z20,Z22-Z29) Other persons with potential health hazards related to communicable diseases	รวม	557	6.40	467	5.15
		ชาย	291	7.63	234	5.81
		หญิง	266	5.45	233	4.63
293	การรับบริการคุมกำเนิด (Z30) Contraceptive management	รวม	82	0.94	60	0.66
		ชาย	5	0.13	6	0.15
		หญิง	77	1.58	54	1.07
294	การตรวจคัดกรองก่อนการคลอด และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับ การตั้งครรภ์อื่น ๆ (Z34-Z36) Antenatal screening and other supervision of pregnancy	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
295	การเกิดของทารกตามสถานที่เกิด (Z38) Liveborn infants according to place of birth	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00

ตาราง 21 จำนวน และอัตราผู้ป่วยในรวมทุกการวินิจฉัยโรค กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค)พ.ศ.2556-2557 (ต่อ)

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2556		2557	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
296	การดูแลและการตรวจหลังคลอด (Z39) Postpartum care and examination	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
297	บุคคลขอรับบริการสุขภาพ เพื่อหัตถการหรือการบริการสุขภาพที่ระบุเฉพาะ (Z40-Z54, Z40-Z54) Persons encountering health services for specific procedures and health care	รวม	96,615	1,110.67	102,299	1,128.94
		ชาย	48,694	1,276.81	51,307	1,275.00
		หญิง	47,921	980.96	50,992	1,012.27
298	บุคคลขอรับบริการสุขภาพด้วยเหตุผลอื่น (Z31-Z33, Z37, Z55-Z99) Persons encountering health services for other reasons	รวม	37,173	427.33	37,480	413.62
		ชาย	19,833	520.04	20,170	501.23
		หญิง	17,340	354.96	17,310	343.63

รวมรวม / วิเคราะห์ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน สวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการและครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ(สภส.)

ตาราง 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน(รวมทุการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค)พ.ศ.2556-2557

			หน่วยนับ : รายโรค				
รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2556		2557		
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	
รวมทุกกลุ่มโรค			รวม	17,999,153	27,853.28	16,425,775	25,287.81
			ชาย	8,338,795	26,244.62	7,698,628	24,116.63
			หญิง	9,660,358	29,409.32	8,727,147	26,419.62
กลุ่มโรคติดเชื้อและปรสิตบางชนิด (A00 - B99)							
001	อหิวาตกโรค (A00) Cholera	รวม	227	0.35	122	0.19	
		ชาย	109	0.34	58	0.18	
		หญิง	118	0.36	64	0.19	
002	ไข้รากสาดน้อยและไข้รากสาดเทียม (A01) Typhoid and paratyphoid fever	รวม	5,869	9.08	4,025	6.20	
		ชาย	3,090	9.73	2,104	6.59	
		หญิง	2,779	8.46	1,921	5.82	
003	โรคบิดจากเชื้อชิเกลลา (A03) Shigellosis	รวม	365	0.56	161	0.25	
		ชาย	162	0.51	85	0.27	
		หญิง	203	0.62	76	0.23	
004	โรคบิดมีตัว (A06) Amoebiasis	รวม	3,715	5.75	3,089	4.76	
		ชาย	1,771	5.57	1,473	4.61	
		หญิง	1,944	5.92	1,616	4.89	
005	อาการท้องร่วงกระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่งสันนิษฐาน ว่าเกิดจากการติดเชื้อ (A09) Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin	รวม	417,287	645.74	376,716	579.96	
		ชาย	192,068	604.49	175,439	549.58	
		หญิง	225,219	685.64	201,277	609.32	
006	โรคลำไส้อักเสบอื่น ๆ (A02, A04-A05,A07-A08) Other intestinal infectious diseases	รวม	58,431	90.42	56,891	87.58	
		ชาย	28,165	88.64	27,609	86.49	
		หญิง	30,266	92.14	29,282	88.65	
007	วัณโรคทางเดินหายใจ (A15-A16) Respiratory tuberculosis	รวม	69,033	106.83	61,842	95.21	
		ชาย	47,387	149.14	43,082	134.96	
		หญิง	21,646	65.90	18,760	56.79	
008	วัณโรคอื่น ๆ (A17-A19) Other Tuberculosis	รวม	18,056	27.94	16,112	24.80	
		ชาย	11,116	34.99	9,753	30.55	
		หญิง	6,940	21.13	6,359	19.25	
009	กาฬโรค (A20) Plaque	รวม	0	0.00	0	0.00	
		ชาย	0	0.00	0	0.00	
		หญิง	0	0.00	0	0.00	
010	โรคติดเชื้อบรูเซลลา (A23) Brucellosis	รวม	10	0.02	13	0.02	
		ชาย	10	0.03	6	0.02	
		หญิง	0	0.00	7	0.02	
011	โรคเรื้อน (A30) Leprosy	รวม	455	0.70	424	0.65	
		ชาย	298	0.94	283	0.89	
		หญิง	157	0.48	141	0.43	
012	บาดทะยักในเด็กแรกเกิด (A33) Tetanus neonatorum	รวม	3	0.00	4	0.01	
		ชาย	1	0.00	2	0.01	
		หญิง	2	0.01	2	0.01	
013	บาดทะยักอื่น ๆ (A34-A35) Other tetanus	รวม	268	0.41	221	0.34	
		ชาย	167	0.53	151	0.47	
		หญิง	101	0.31	70	0.21	
014	โรคคอตีบ (A36) Diphtheria	รวม	138	0.21	77	0.12	
		ชาย	57	0.18	41	0.13	
		หญิง	81	0.25	36	0.11	

ตาราง 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน(รวมทุการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค)พ.ศ.2556-2557 (ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	หน่วยนับ : รายโรค			
			2556		2557	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
015	โรคไอกรน (A37) Whooping cough	รวม	61	0.09	49	0.08
		ชาย	35	0.11	12	0.04
		หญิง	26	0.08	37	0.11
016	การติดเชื้อเมนีงโกคอคคัส (A39) Meningococcal infection	รวม	123	0.19	95	0.15
		ชาย	70	0.22	50	0.16
		หญิง	53	0.16	45	0.14
017	โลหิตเป็นพิษ (A40-A41) Septicemia	รวม	139,754	216.27	118,204	181.98
		ชาย	70,984	223.41	59,958	187.82
		หญิง	68,770	209.36	58,246	176.33
018	โรคจากแบคทีเรียอื่น ๆ (A21-A22, A24-A28, A31-A32, A38, A42-A49) Other bacterial diseases	รวม	57,424	88.86	51,356	79.06
		ชาย	33,477	105.36	29,572	92.64
		หญิง	23,947	72.90	21,784	65.95
019	ซิฟิลิสแต่กำเนิด (A50) Congenital syphilis	รวม	244	0.38	336	0.52
		ชาย	132	0.42	175	0.55
		หญิง	112	0.34	161	0.49
020	ซิฟิลิสระยะเริ่ม (A51) Early syphilis	รวม	142	0.22	189	0.29
		ชาย	80	0.25	116	0.36
		หญิง	62	0.19	73	0.22
021	ซิฟิลิสอื่น ๆ (A52-A53) Other syphilis	รวม	1,773	2.74	1,874	2.89
		ชาย	972	3.06	1,070	3.35
		หญิง	801	2.44	804	2.43
022	การติดเชื้อหนองใน (A54) Gonococcal infection	รวม	307	0.48	243	0.37
		ชาย	210	0.66	141	0.44
		หญิง	97	0.30	102	0.31
023	โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จากเชื้อคลามัยเดีย (A55-A56) Sexually transmitted chlamydial diseases	รวม	44	0.07	42	0.06
		ชาย	24	0.08	23	0.07
		หญิง	20	0.06	19	0.06
024	โรคติดเชื้ออื่นๆ ที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นส่วนใหญ่ (A57-A64) Other infections with a predominantly sexual mode of transmission	รวม	2,594	4.01	2,391	3.68
		ชาย	623	1.96	630	1.97
		หญิง	1,971	6.00	1,761	5.33
025	โรคไขกลับซ้ำ (A68) Relapsing fever	รวม	10	0.02	1	0.00
		ชาย	3	0.01	0	0.00
		หญิง	7	0.02	1	0.00
026	ริดสีดวงตา (A71) Trachoma	รวม	14	0.02	4	0.01
		ชาย	6	0.02	0	0.00
		หญิง	8	0.02	4	0.01
027	ไข้รากสาดใหญ่ (A75) Typhus fever	รวม	21,457	33.20	15,171	23.36
		ชาย	11,818	37.19	8,512	26.66
		หญิง	9,639	29.34	6,659	20.16
028	โรคโปลิโอเฉียบพลัน (A80) Acute poliomyelitis	รวม	233	0.36	189	0.29
		ชาย	138	0.43	111	0.35
		หญิง	95	0.29	78	0.24
029	โรคพิษสุนัขบ้า (A82) Rabies	รวม	6	0.01	6	0.01
		ชาย	5	0.02	4	0.01
		หญิง	1	0.00	2	0.01
030	สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส (A83-A86) Viral encephalitis	รวม	796	1.23	670	1.03
		ชาย	414	1.30	347	1.09
		หญิง	382	1.16	323	0.98

ตาราง 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน(รวมทุการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค)พ.ศ.2556-2557 (ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	หน่วยนับ : รายโรค			
			2556		2557	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
031	ไข้เหลือง (A95) Yellow fever	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
032	ไข้จากไวรัสที่นำโดยแมลงและไขเลือดออกที่เกิด จากไวรัสอื่น ๆ (A90-A94, A96-A99) Other arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers	รวม	245,020	379.16	62,435	96.12
		ชาย	120,886	380.46	31,309	98.08
		หญิง	124,134	377.90	31,126	94.23
033	เริม (B00) Herpesviral infection	รวม	5,332	8.25	4,815	7.41
		ชาย	2,443	7.69	2,155	6.75
		หญิง	2,889	8.80	2,660	8.05
034	อีสุกอีใสและงูสวัด (B01-B02) Varicella and zoster	รวม	9,963	15.42	10,902	16.78
		ชาย	4,742	14.92	5,357	16.78
		หญิง	5,221	15.89	5,545	16.79
035	หัด (B05) Measles	รวม	1,503	2.33	427	0.66
		ชาย	751	2.36	227	0.71
		หญิง	752	2.29	200	0.61
036	หัดเยอรมัน (B06) Rubella	รวม	113	0.17	50	0.08
		ชาย	50	0.16	27	0.08
		หญิง	63	0.19	23	0.07
037	ตับอักเสบเฉียบพลันชนิดบี (B16) Acute hepatitis B	รวม	5,451	8.44	4,886	7.52
		ชาย	3,479	10.95	3,183	9.97
		หญิง	1,972	6.00	1,703	5.16
038	ตับอักเสบจากไวรัสอื่น ๆ (B15, B17-B19) Other viral hepatitis	รวม	37,816	58.52	35,566	54.75
		ชาย	25,057	78.86	24,198	75.80
		หญิง	12,759	38.84	11,368	34.41
039	ภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากไวรัส (HIV) (B20-B24) Human immunodeficiency virus [HIV] disease	รวม	75,300	116.53	65,032	100.12
		ชาย	42,664	134.28	37,283	116.79
		หญิง	32,636	99.35	27,749	84.00
040	คางทูม (B26) Mumps	รวม	392	0.61	161	0.25
		ชาย	192	0.60	93	0.29
		หญิง	200	0.61	68	0.21
041	โรคจากไวรัสอื่น (A81, A87-A89, B03-B04, B07-B09, B25, B27-B34) Other viral diseases	รวม	61,445	95.08	46,891	72.19
		ชาย	31,733	99.87	25,003	78.32
		หญิง	29,712	90.45	21,888	66.26
042	โรคติดเชื้อรา (B35-B49) Mycoses	รวม	29,461	45.59	25,760	39.66
		ชาย	16,442	51.75	14,097	44.16
		หญิง	13,019	39.63	11,663	35.31
043	มาลาเรีย (B50-B54) Malaria	รวม	9,577	14.82	6,366	9.80
		ชาย	6,535	20.57	4,614	14.45
		หญิง	3,042	9.26	1,752	5.30
044	โรคไลชมาเนีย (B55) Leishmaniasis	รวม	21	0.03	20	0.03
		ชาย	16	0.05	16	0.05
		หญิง	5	0.02	4	0.01
045	โรคทริปาโนโซม (B56-B57) Trypanosomiasis	รวม	33	0.05	28	0.04
		ชาย	17	0.05	14	0.04
		หญิง	16	0.05	14	0.04
046	โรคติดเชื้อซิสโตโซม (B65) Schistosomiasis	รวม	24	0.04	28	0.04
		ชาย	15	0.05	16	0.05
		หญิง	9	0.03	12	0.04

ตาราง 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน(รวมทุการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค)พ.ศ.2556-2557 (ต่อ)

			หน่วยนับ : รายโรค			
รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2556	2557		
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
047	โรคพยาธิใบไม้อื่น ๆ (B66) Other fluke infections	รวม	858	1.33	690	1.06
		ชาย	491	1.55	378	1.18
		หญิง	367	1.12	312	0.94
048	โรคพยาธิเอคคิโนคอกคัส (B67) Echinococcosis	รวม	17	0.03	19	0.03
		ชาย	9	0.03	8	0.03
		หญิง	8	0.02	11	0.03
049	โรคพยาธิดรากันคูลัส (B72) Dracunculiasis	รวม	1	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	1	0.00	0	0.00
050	โรคพยาธิออนโคเชอร์คา (B73) Onchocerciasis	รวม	2	0.00	0	0.00
		ชาย	1	0.00	0	0.00
		หญิง	1	0.00	0	0.00
051	โรคพยาธิฟิลาเรีย (B74) Filariasis	รวม	28	0.04	21	0.03
		ชาย	18	0.06	8	0.03
		หญิง	10	0.03	13	0.04
052	โรคพยาธิปากขอ (B76) Hookworm diseases	รวม	791	1.22	494	0.76
		ชาย	399	1.26	272	0.85
		หญิง	392	1.19	222	0.67
053	โรคพยาธิตัวติดอื่น ๆ (B68-B71, B75, B77-B83) Other helminthiasis	รวม	9,521	14.73	8,048	12.39
		ชาย	5,992	18.86	5,054	15.83
		หญิง	3,529	10.74	2,994	9.06
054	ผลตามหลังวัณโรค (B90) Sequelae of tuberculosis	รวม	23,489	36.35	22,917	35.28
		ชาย	15,344	48.29	15,138	47.42
		หญิง	8,145	24.80	7,779	23.55
055	ผลตามหลังโรคโปลิโอ (B91) Sequelae of poliomyelitis	รวม	70	0.11	64	0.10
		ชาย	39	0.12	38	0.12
		หญิง	31	0.09	26	0.08
056	ผลตามหลังโรคเรื้อน (B92) Sequelae of leprosy	รวม	64	0.10	34	0.05
		ชาย	39	0.12	18	0.06
		หญิง	25	0.08	16	0.05
057	โรคติดเชื้อและปรสิตอื่น ๆ (A65-A67, A69-A70, A74, A77-A79, B58-B64, B85-B89, B94, B99) Other infectious and parasitic diseases	รวม	13,334	20.63	11,183	17.22
		ชาย	7,521	23.67	6,263	19.62
		หญิง	5,813	17.70	4,920	14.89
โรคเนื้องอกร้ายและเนื้องอกไม่ร้าย (C00-D48)						
058	เนื้องอกร้ายของริมฝีปาก ช่องปากและคอหอย (C00-C14) Malignant neoplasm of lip, oral cavity and pharynx	รวม	20,877	32.31	18,586	28.61
		ชาย	14,848	46.73	13,325	41.74
		หญิง	6,029	18.35	5,261	15.93
059	เนื้องอกร้ายที่หลอดอาหาร (C15) Malignant neoplasm of oesophagus	รวม	7,105	10.99	7,044	10.84
		ชาย	6,030	18.98	5,933	18.59
		หญิง	1,075	3.27	1,111	3.36
060	เนื้องอกร้ายที่กระเพาะอาหาร (C16) Malignant neoplasm of stomach	รวม	8,708	13.48	7,805	12.02
		ชาย	4,924	15.50	4,447	13.93
		หญิง	3,784	11.52	3,358	10.17
061	เนื้องอกร้ายของลำไส้ใหญ่ (C18) Malignant neoplasm of colon	รวม	37,670	58.29	39,116	60.22
		ชาย	19,688	61.96	20,045	62.79
		หญิง	17,982	54.74	19,071	57.73
062	เนื้องอกร้ายที่รอยต่อลำไส้ใหญ่เร็คตัม และซิกมอยด์เร็คตัม ทวารหนักและช่องทวารหนัก (C19-C21) Malignant neoplasm of recto sigmoid junction, rectum, anus and anal canal	รวม	25,387	39.29	25,883	39.85
		ชาย	14,615	46.00	14,739	46.17
		หญิง	10,772	32.79	11,144	33.74

ตาราง 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน(รวมทุการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค)พ.ศ.2556-2557 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2556		2557	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
063	เนื้องอกร้ายที่ตับและท่อน้ำดีในตับ (C22) Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts	รวม	47,335	73.25	43,105	66.36
		ชาย	32,239	101.47	29,271	91.69
		หญิง	15,096	45.96	13,834	41.88
064	เนื้องอกร้ายที่ตับอ่อน (C25) Malignant neoplasm of pancreas	รวม	4,684	7.25	4,275	6.58
		ชาย	2,327	7.32	2,154	6.75
		หญิง	2,357	7.18	2,121	6.42
065	เนื้องอกร้ายที่อวัยวะย่อยอาหารอื่น ๆ (C17, C23- C24, C26) Other malignant neoplasms of digestive organs	รวม	5,436	8.41	5,260	8.10
		ชาย	2,759	8.68	2,583	8.09
		หญิง	2,677	8.15	2,677	8.10
066	เนื้องอกร้ายที่กล่องเสียง (C32) Malignant neoplasm of larynx	รวม	4,413	6.83	3,880	5.97
		ชาย	4,065	12.79	3,584	11.23
		หญิง	348	1.06	296	0.90
067	เนื้องอกร้ายที่หลอดคอ หลอดลม และปอด (C33-C34) Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung	รวม	39,510	61.14	34,322	52.84
		ชาย	24,805	78.07	21,617	67.72
		หญิง	14,705	44.77	12,705	38.46
068	เนื้องอกร้ายที่อวัยวะหายใจและอวัยวะช่องอก (C30-C31, C37-C39) Other malignant neoplasm of respiratory and intrathoracic organs	รวม	2,131	3.30	1,958	3.01
		ชาย	1,430	4.50	1,309	4.10
		หญิง	701	2.13	649	1.96
069	เนื้องอกร้ายที่กระดูกและกระดูกอ่อนผิวข้อ (C40-C41) Malignant neoplasm of bone and articular cartilage	รวม	3,273	5.06	3,113	4.79
		ชาย	1,857	5.84	1,760	5.51
		หญิง	1,416	4.31	1,353	4.10
070	เนื้องอกร้ายที่เมลาโนมาของผิวหนัง (C43) Malignant melanoma of skin	รวม	712	1.10	626	0.96
		ชาย	399	1.26	332	1.04
		หญิง	313	0.95	294	0.89
071	เนื้องอกร้ายที่ผิวหนังอื่น ๆ (C44) Other malignant neoplasm of skin	รวม	2,181	3.38	1,957	3.01
		ชาย	1,094	3.44	1,003	3.14
		หญิง	1,087	3.31	954	2.89
072	เนื้องอกร้ายที่เมโซเธลิอัลและเนื้อเยื่ออ่อน (C45-C49) Malignant neoplasm of mesothelial and soft tissue	รวม	4,424	6.85	3,902	6.01
		ชาย	1,881	5.92	1,661	5.20
		หญิง	2,543	7.74	2,241	6.78
073	เนื้องอกร้ายที่เต้านม (C50) Malignant neoplasm of breast	รวม	39,436	61.03	35,470	54.61
		ชาย	274	0.86	285	0.89
		หญิง	39,162	119.22	35,185	106.52
074	เนื้องอกร้ายที่ปากมดลูก (C53) Malignant neoplasm of cervix uteri	รวม	23,044	70.15	19,858	60.12
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	23,044	70.15	19,858	60.12
075	เนื้องอกร้ายอื่นๆ ที่มีได้ระบุส่วนของมดลูก (C54-C55) Malignant neoplasm of other and unspecified parts of uterus	รวม	6,987	21.27	6,618	20.03
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	6,987	21.27	6,618	20.03
076	เนื้องอกร้ายของอวัยวะสืบพันธุ์หญิง (C51-C52, C56-C58) Other malignant neoplasm of female genital organs	รวม	16,722	50.91	14,898	45.10
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	16,722	50.91	14,898	45.10
077	เนื้องอกร้ายที่ต่อมลูกหมาก (C61) Malignant neoplasm of prostate	รวม	7,789	24.51	7,538	23.61
		ชาย	7,789	24.51	7,538	23.61
		หญิง	0	0.00	0	0.00
078	เนื้องอกร้ายของอวัยวะสืบพันธุ์ชาย (C60, C62-C63) Other malignant neoplasms of male genital organs	รวม	1,924	6.06	1,759	5.51
		ชาย	1,924	6.06	1,759	5.51
		หญิง	0	0.00	0	0.00

ตาราง 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน(รวมทุการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค)พ.ศ.2556-2557 (ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	หน่วยนับ : รายโรค			
			2556		2557	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
079	เนื้องอกร้ายที่กระเพาะปัสสาวะ (C67) Malignant neoplasm of bladder	รวม	8,918	13.80	8,638	13.30
		ชาย	7,074	22.26	6,763	21.19
		หญิง	1,844	5.61	1,875	5.68
080	เนื้องอกร้ายอื่นๆ ที่ท่อปัสสาวะ (C64-C66, C68) Other malignant neoplasm of urinary tract	รวม	2,876	4.45	2,774	4.27
		ชาย	1,870	5.89	1,766	5.53
		หญิง	1,006	3.06	1,008	3.05
081	เนื้องอกร้ายของตาและส่วนประกอบ (C69) Malignant neoplasm of eye and adnexa	รวม	766	1.19	629	0.97
		ชาย	439	1.38	317	0.99
		หญิง	327	1.00	312	0.94
082	เนื้องอกร้ายของสมอง (C71) Malignant neoplasm of brain	รวม	4,239	6.56	3,783	5.82
		ชาย	2,282	7.18	1,947	6.10
		หญิง	1,957	5.96	1,836	5.56
083	เนื้องอกร้ายที่ส่วนอื่น ๆ ของระบบประสาทส่วนกลาง (C70,C72) Malignant neoplasm of other parts of central nervous system	รวม	417	0.65	405	0.62
		ชาย	201	0.63	191	0.60
		หญิง	216	0.66	214	0.65
084	เนื้องอกอื่น ๆ และที่ไม่ทราบสาเหตุ เนื้องอกทุติยภูมิ ที่มีได้ระบุรายละเอียดและเกิดขึ้นหลายแห่ง (C73- C80, C97) Malignant neoplasm of other, ill-defined, secondary, unspecified and multiple sites	รวม	132,264	204.68	122,064	187.92
		ชาย	61,943	194.95	57,601	180.44
		หญิง	70,321	214.08	64,463	195.15
085	โรคฮอดกินส์ (C81) Hodgkin's disease	รวม	1,377	2.13	1,418	2.18
		ชาย	800	2.52	910	2.85
		หญิง	577	1.76	508	1.54
086	เนื้องอกร้ายลิมโฟมาที่ไม่ใช่โรคฮอดกินส์ (C82-C85) Non-Hodgkin's lymphoma	รวม	16,709	25.86	15,050	23.17
		ชาย	9,575	30.14	8,475	26.55
		หญิง	7,134	21.72	6,575	19.90
087	ลิวคีเมีย (C91-C95) Leukaemia	รวม	20,859	32.28	18,445	28.40
		ชาย	11,515	36.24	10,579	33.14
		หญิง	9,344	28.45	7,866	23.81
088	เนื้องอกร้ายอื่นๆ ของลิมโฟยด์อื่นๆ ระบบสร้างเม็ด เลือดและเนื้อเยื่อ (C88-C90, C96) Other malignant neoplasm of lymphoid, haematopoietic and related tissue	รวม	4,921	7.62	4,651	7.16
		ชาย	2,536	7.98	2,292	7.18
		หญิง	2,385	7.26	2,359	7.14
089	มะเร็งจำกัดเฉพาะที่ของปากมดลูก (D06) Carcinoma in situ of cervix uteri	รวม	1,975	6.01	1,428	4.32
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	1,975	6.01	1,428	4.32
090	เนื้องอกไม่ร้ายของผิวหนัง (D22-D23) Benign neoplasm of skin	รวม	782	1.21	790	1.22
		ชาย	348	1.10	314	0.98
		หญิง	434	1.32	476	1.44
091	เนื้องอกไม่ร้ายของเต้านม (D24) Benign neoplasm of breast	รวม	1,363	2.11	1,215	1.87
		ชาย	8	0.03	8	0.03
		หญิง	1,355	4.13	1,207	3.65
092	ไลโอไมโอมาที่มดลูก Leiomyoma of uterus (D25)	รวม	24,119	73.43	21,661	65.57
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	24,119	73.43	21,661	65.57
093	เนื้องอกไม่ร้ายที่รังไข่ Benign neoplasm of ovary (D27)	รวม	2,571	7.83	2,327	7.04
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	2,571	7.83	2,327	7.04

ตาราง 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน(รวมทุการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค)พ.ศ.2556-2557 (ต่อ)

			หน่วยนับ : รายโรค			
รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2556		2557	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
094	เนื้องอกไม่ร้ายที่ระบบปัสสาวะ (D30) Benign neoplasm of urinary organs	รวม	155	0.24	138	0.21
		ชาย	89	0.28	78	0.24
		หญิง	66	0.20	60	0.18
095	เนื้องอกไม่ร้ายของสมองและส่วนอื่นของระบบ ประสาทส่วนกลาง (D33) Benign neoplasm of brain and other parts of central nervous system	รวม	1,321	2.04	1,291	1.99
		ชาย	623	1.96	573	1.79
		หญิง	698	2.12	718	2.17
096	เนื้องอกไม่ร้ายจำกัดเฉพาะที่อื่น ๆ และเนื้องอกบาง ชนิดที่ไม่ทราบพฤติกรรม (D00-D05, D07-D21, D26,D28-D29 D31-D32,D34-D48) Other in situ and benign neoplasms and neoplasms of uncertain and unknown behaviour	รวม	47,464	73.45	44,865	69.07
		ชาย	20,219	63.64	19,377	60.70
		หญิง	27,245	82.94	25,488	77.16
โรคเลือดอวัยวะที่สร้างเลือดและความผิดปกติที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน (D50-D89)						
097	โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก (D50) Iron deficiency anaemia	รวม	111,060	171.86	99,303	152.88
		ชาย	45,776	144.07	41,281	129.32
		หญิง	65,284	198.75	58,022	175.65
098	โลหิตจางอื่น ๆ (D51-D64) Other anaemia	รวม	728,887	1,127.94	669,516	1,030.73
		ชาย	329,343	1,036.54	303,189	949.77
		หญิง	399,544	1,216.34	366,327	1,108.98
099	ภาวะเลือดออกอื่น ๆ โรคเลือดและอวัยวะที่สร้างเลือด (D65-D77) Haemorrhagic conditions and other diseases of blood and blood forming organs	รวม	161,751	250.31	137,382	211.50
		ชาย	92,422	290.88	78,735	246.64
		หญิง	69,329	211.06	58,647	177.54
100	ความผิดปกติที่เกี่ยวกับกลไกของภูมิคุ้มกัน (D80-D89) Certain disorders involving the immune mechanism	รวม	1,421	2.20	1,384	2.13
		ชาย	995	3.13	916	2.87
		หญิง	426	1.30	468	1.42
โรคต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิซึม (E00-E90)						
101	การขาดไอโอดีนที่มีความสัมพันธ์กับต่อมธัยรอยด์ (E00-E02) Iodine deficiency related thyroid disorders	รวม	771	1.19	709	1.09
		ชาย	242	0.76	250	0.78
		หญิง	529	1.61	459	1.39
102	โรคพิษธัยรอยด์ (E05) Thyrotoxicosis	รวม	29,867	46.22	28,070	43.21
		ชาย	7,436	23.40	7,245	22.70
		หญิง	22,431	68.29	20,825	63.04
103	ความผิดปกติของต่อมธัยรอยด์อื่น ๆ (E03-E04, E06-E07) Other disorders of thyroid	รวม	27,707	42.88	27,484	42.31
		ชาย	5,901	18.57	6,152	19.27
		หญิง	21,806	66.38	21,332	64.58
104	เบาหวาน (E10-E14) Diabetes mellitus	รวม	698,720	1,081.25	670,664	1,032.50
		ชาย	265,938	836.98	257,906	807.91
		หญิง	432,782	1,317.53	412,758	1,249.54
105	ทุพโภชนาการ (E40-E46) Malnutrition	รวม	29,331	45.39	22,247	34.25
		ชาย	16,401	51.62	12,611	39.51
		หญิง	12,930	39.36	9,636	29.17
106	การขาดวิตามินเอ (E50) Vitamin A deficiency	รวม	88	0.14	76	0.12
		ชาย	37	0.12	32	0.10
		หญิง	51	0.16	44	0.13
107	การขาดวิตามินอื่น ๆ (E51-E56) Other vitamin deficiencies	รวม	1,634	2.53	1,648	2.54
		ชาย	867	2.73	862	2.70
		หญิง	767	2.34	786	2.38

ตาราง 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน(รวมทุกราวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค)พ.ศ.2556-2557 (ต่อ)

		หน่วยนับ : รายโรค				
รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2556	2557		
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
108	ผลที่ตามมาของภาวะทุพโภชนาการและภาวะพร่อง โภชนาการอื่น ๆ Sequelae of malnutrition and other nutritional deficiencies (E64)	รวม	92	0.14	78	0.12
		ชาย	40	0.13	40	0.13
		หญิง	52	0.16	38	0.12
109	โรคอ้วน (E66) Obesity	รวม	10,296	15.93	9,508	14.64
		ชาย	3,881	12.21	3,519	11.02
		หญิง	6,415	19.53	5,989	18.13
110	การขาดปริมาณของเหลวในร่างกาย (E86) Volume depletion	รวม	163,468	252.96	135,022	207.87
		ชาย	81,514	256.55	68,181	213.58
		หญิง	81,954	249.50	66,841	202.35
111	ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตา บอลิกอื่น ๆ (E15-E35, E58-E63, E65, E67- E85, E87-E90) Other Endocrine, nutritional and metabolic disorders	รวม	1,906,738	2,950.63	1,788,496	2,753.43
		ชาย	894,151	2,814.15	841,888	2,637.29
		หญิง	1,012,587	3,082.65	946,608	2,865.66
โรคทางจิตเวชและความผิดปกติของพฤติกรรม (F00-F99)						
112	สมองเสื่อม (F00-F03) Dementia	รวม	9,666	14.96	8,342	12.84
		ชาย	4,260	13.41	3,579	11.21
		หญิง	5,406	16.46	4,763	14.42
113	ความผิดปกติของพฤติกรรมและจิตประสาทที่เกิดจาก การเสพยาเสพติด (F10) Mental and behavioral disorders due to use of alcohol	รวม	104,797	162.17	93,650	144.18
		ชาย	93,175	293.25	83,296	260.93
		หญิง	11,622	35.38	10,354	31.34
114	ความผิดปกติทางพฤติกรรมและจิตประสาทที่เกิดจาก การใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทอื่น ๆ (F11-F19) Mental and behavioral disorders due to other psychoactive substance use	รวม	20,433	31.62	20,175	31.06
		ชาย	17,540	55.20	17,566	55.03
		หญิง	2,893	8.81	2,609	7.90
115	จิตเภท พฤติกรรมแบบจิตเภทและความหลงผิด (F20-F29) Schizophrenia, schizotypal and delusional disorders	รวม	53,396	82.63	51,075	78.63
		ชาย	33,381	105.06	32,188	100.83
		หญิง	20,015	60.93	18,887	57.18
116	ความผิดปกติทางอารมณ์ (F30-F39) Mood (affective) disorders	รวม	27,750	42.94	29,002	44.65
		ชาย	9,317	29.32	9,872	30.92
		หญิง	18,433	56.12	19,130	57.91
117	โรคประสาท อาการทางกายที่เกิดจากจิตใจและ ความเครียด (F40-F48) Neurotic, stress related and somatoform disorders	รวม	30,007	46.44	25,136	38.70
		ชาย	8,357	26.30	7,329	22.96
		หญิง	21,650	65.91	17,807	53.91
118	ภาวะปัญญาอ่อน (F70-F79) Mental retardation	รวม	5,532	8.56	4,958	7.63
		ชาย	2,909	9.16	2,708	8.48
		หญิง	2,623	7.99	2,250	6.81
119	ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมอื่น ๆ (F04-F09, F50-F69, F80-F99) Other mental and behavioral disorders	รวม	36,806	56.96	35,580	54.78
		ชาย	21,130	66.50	20,641	64.66
		หญิง	15,676	47.72	14,939	45.22
โรคระบบประสาท (G00-G99)						
120	การอักเสบของระบบประสาทส่วนกลาง (G00-G09) Inflammatory diseases of the central nervous system	รวม	27,162	42.03	24,706	38.04
		ชาย	16,637	52.36	15,077	47.23
		หญิง	10,525	32.04	9,629	29.15
121	โรคพาคินสัน (G20) Parkinson's disease	รวม	13,140	20.33	12,722	19.59
		ชาย	6,174	19.43	5,998	18.79
		หญิง	6,966	21.21	6,724	20.36
122	โรคอัลไซเมอร์ (G30) Alzheimer's disease	รวม	4,741	7.34	4,488	6.91
		ชาย	1,884	5.93	1,760	5.51
		หญิง	2,857	8.70	2,728	8.26

ตาราง 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน(รวมทุการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค)พ.ศ.2556-2557 (ต่อ)

			หน่วยนับ : รายโรค			
รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2556	2557		
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
123	มัลติเปิล สเคลอโรสิส (G35) Multiple sclerosis	รวม	553	0.86	473	0.73
		ชาย	92	0.29	78	0.24
		หญิง	461	1.40	395	1.20
124	ลมบ้าหมู (G40-G41) Epilepsy	รวม	71,495	110.64	67,490	103.90
		ชาย	44,168	139.01	41,713	130.67
		หญิง	27,327	83.19	25,777	78.03
125	โรคไมเกรนและกลุ่มอาการปวดศีรษะอื่นๆ (G43-G44) Migraine and other headache syndromes	รวม	19,676	30.45	16,379	25.22
		ชาย	5,985	18.84	5,081	15.92
		หญิง	13,691	41.68	11,298	34.20
126	โรคเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยชั่วคราวและกลุ่มอาการ ต่อเนื่อง (G45) Transient cerebral ischaemic attacks and related syndromes	รวม	8,890	13.76	8,934	13.75
		ชาย	4,859	15.29	4,997	15.65
		หญิง	4,031	12.27	3,937	11.92
127	ความผิดปกติของเส้นประสาท รากประสาท และปมประสาท (G50-G59) Nerve, nerve root and plexus disorders	รวม	10,505	16.26	9,701	14.93
		ชาย	4,867	15.32	4,383	13.73
		หญิง	5,638	17.16	5,318	16.10
128	สมองพิการและกลุ่มอาการอัมพาตอื่น ๆ (G80-G83) Cerebral palsy and other paralytic syndromes	รวม	41,533	64.27	37,491	57.72
		ชาย	25,619	80.63	23,201	72.68
		หญิง	15,914	48.45	14,290	43.26
129	โรคของระบบประสาทอื่น ๆ (G10-G13, G21-G26, G31-G32, G36-G37, G46-G47, G60-G73, G90-G99) Other diseases of the nervous system	รวม	80,381	124.39	77,651	119.55
		ชาย	44,243	139.25	42,744	133.90
		หญิง	36,138	110.02	34,907	105.67
โรคของตาและส่วนประกอบของตา (H00-H59)						
130	การอักเสบของหนังตา (H00-H01) Inflammation of eyelid	รวม	2,846	4.40	2,483	3.82
		ชาย	1,420	4.47	1,202	3.77
		หญิง	1,426	4.34	1,281	3.88
131	เยื่อบตาอักเสบและความผิดปกติของเยื่อบตาอื่น ๆ (H10-H13) Conjunctivitis and other disorders of conjunctiva	รวม	19,126	29.60	21,414	32.97
		ชาย	8,137	25.61	9,296	29.12
		หญิง	10,989	33.45	12,118	36.68
132	กระจกตาอักเสบและความผิดปกติของตาขาว และ กระจกตาอื่น ๆ (H15-H19) Keratitis and other disorders of sclera and cornea	รวม	10,237	15.84	8,509	13.10
		ชาย	5,946	18.71	4,918	15.41
		หญิง	4,291	13.06	3,591	10.87
133	ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ (H25-H28) Cataract and other disorders of sclera and cornea	รวม	224,536	347.46	200,019	307.93
		ชาย	93,078	292.94	83,033	260.11
		หญิง	131,458	400.20	116,986	354.15
134	จอประสาทตาหลุดออกและรอยฉีกของจอประสาทตา (H33) Retinal detachments and breaks	รวม	6,144	9.51	5,677	8.74
		ชาย	3,640	11.46	3,239	10.15
		หญิง	2,504	7.62	2,438	7.38
135	ต้อหิน (H40-H42) Glaucoma	รวม	18,118	28.04	16,211	24.96
		ชาย	8,343	26.26	7,499	23.49
		หญิง	9,775	29.76	8,712	26.37
136	ตาเหล่ (H49-H50) Strabismus	รวม	2,629	4.07	2,302	3.54
		ชาย	1,277	4.02	1,097	3.44
		หญิง	1,352	4.12	1,205	3.65
137	ความผิดปกติของสายตาและการเพ่งมอง (H52) Disorders of refraction and accommodation	รวม	1,055	1.63	1,084	1.67
		ชาย	493	1.55	517	1.62
		หญิง	562	1.71	567	1.72
138	ตาบอดและสายตาเลือนลาง (H54) Blindness and low vision	รวม	113,032	174.91	179,570	276.45
		ชาย	47,155	148.41	74,146	232.27
		หญิง	65,877	200.55	105,424	319.15

ตาราง 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน(รวมทุการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค)พ.ศ.2556-2557 (ต่อ)

			หน่วยนับ : รายโรค			
รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2556	2557		
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
139	โรคของตาและส่วนประกอบของตาอื่น ๆ (H02-H06, H20-H22, H30-H32, H34-H36, H43-H48, H51, H53, H55-H59) Other diseases of the eye and adnexa	รวม	38,484	59.55	35,230	54.24
		ชาย	18,165	57.17	16,479	51.62
		หญิง	20,319	61.86	18,751	56.76
โรคของหูและปมกกหู (H60-H95)						
140	หูชั้นกลางอักเสบและความผิดปกติของหูชั้นกลาง และปมกกหูอื่น ๆ (H65-H75) Otitis media and other disorders of middle ear and mastoid	รวม	8,284	12.82	7,480	11.52
		ชาย	4,263	13.42	3,852	12.07
		หญิง	4,021	12.24	3,628	10.98
141	การสูญเสียการได้ยิน (H90-H91) Hearing loss	รวม	3,201	4.95	2,933	4.52
		ชาย	1,797	5.66	1,636	5.12
		หญิง	1,404	4.27	1,297	3.93
142	โรคของหูและปมกกหูอื่น ๆ (H60-H62, H80-H83, H92-H95) Other diseases of the ear and mastoid process	รวม	31,514	48.77	26,350	40.57
		ชาย	9,726	30.61	8,138	25.49
		หญิง	21,788	66.33	18,212	55.13
โรคระบบไหลเวียนโลหิต (I00-I99)						
143	ไข้รูมาติกเฉียบพลัน (I00-I02) Acute rheumatic fever	รวม	612	0.95	567	0.87
		ชาย	284	0.89	285	0.89
		หญิง	328	1.00	282	0.85
144	โรคหัวใจรูมาติกเรื้อรัง (I05-I09) Chronic rheumatic heart disease	รวม	25,115	38.86	23,214	35.74
		ชาย	9,697	30.52	9,026	28.27
		หญิง	15,418	46.94	14,188	42.95
145	ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุ (I10) Essential (primary) hypertension	รวม	1,034,039	1,600.15	1,003,121	1,544.32
		ชาย	434,305	1,366.88	423,761	1,327.47
		หญิง	599,734	1,825.79	579,360	1,753.89
146	โรคความดันโลหิตสูงอื่น ๆ (I11-I15) Other hypertensive diseases	รวม	13,940	21.57	11,110	17.10
		ชาย	6,139	19.32	5,032	15.76
		หญิง	7,801	23.75	6,078	18.40
147	กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (I21-I22) Acute myocardial infarction	รวม	67,472	104.41	64,939	99.97
		ชาย	37,946	119.43	36,733	115.07
		หญิง	29,526	89.89	28,206	85.39
148	โรคหัวใจขาดเลือดอื่น ๆ (I20, I23-I25) Other ischaemic heart diseases	รวม	211,637	327.50	199,881	307.72
		ชาย	112,555	354.24	107,176	335.74
		หญิง	99,082	301.64	92,705	280.65
149	ก้อนเลือดอุดตันในหลอดเลือดใหญ่ของปอด (I26) Pulmonary embolism	รวม	3,738	5.78	3,762	5.79
		ชาย	1,321	4.16	1,361	4.26
		หญิง	2,417	7.36	2,401	7.27
150	ความผิดปกติของการนำกระแสไฟฟ้าหัวใจและหัวใจเต้นผิดจังหวะ (I44-I49) Conduction disorders and cardiac arrhythmias	รวม	189,828	293.75	184,268	283.68
		ชาย	89,808	282.65	87,310	273.51
		หญิง	100,020	304.49	96,958	293.52
151	หัวใจล้มเหลว (I50) Heart failure	รวม	171,125	264.81	167,232	257.46
		ชาย	74,336	233.96	72,640	227.55
		หญิง	96,789	294.66	94,592	286.36
152	โรคหัวใจอื่น ๆ (I27-I43, I51-I52) Other heart diseases	รวม	97,976	151.62	93,915	144.58
		ชาย	46,860	147.48	45,522	142.60
		หญิง	51,116	155.61	48,393	146.50
153	เลือดออกในสมอง (I60-I62) Intracranial haemorrhage	รวม	46,266	71.60	43,108	66.37
		ชาย	27,318	85.98	25,694	80.49
		หญิง	18,948	57.68	17,414	52.72
154	เนื้อสมองตาย (I63) Cerebral infraction	รวม	82,253	127.28	80,036	123.22
		ชาย	44,333	139.53	43,688	136.86
		หญิง	37,920	115.44	36,348	110.04

ตาราง 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน(รวมทุการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค)พ.ศ.2556-2557 (ต่อ)

			หน่วยนับ : รายโรค			
รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2556	2557		
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
155	เป็นลมหมดสติที่ไม่จัดกลุ่มว่าเป็นจากเลือดออกในสมองหรือเนื้อสมองตายจากการขาดเลือด (I64) Stroke, not specified as haemorrhage or infarction	รวม	17,384	26.90	17,811	27.42
		ชาย	9,500	29.90	9,666	30.28
		หญิง	7,884	24.00	8,145	24.66
156	โรคหลอดเลือดในสมองอื่น ๆ (I65-I69) Other cerebrovascular diseases	รวม	91,136	141.03	87,881	135.29
		ชาย	49,467	155.69	47,970	150.27
		หญิง	41,669	126.85	39,911	120.82
157	อะเทอโรสเคลอโรสิส (I70) Atherosclerosis	รวม	1,959	3.03	1,843	2.84
		ชาย	983	3.09	954	2.99
		หญิง	976	2.97	889	2.69
158	โรคหลอดเลือดส่วนปลายอื่น ๆ (I73) Other peripheral vascular diseases	รวม	1,451	2.25	1,624	2.50
		ชาย	801	2.52	897	2.81
		หญิง	650	1.98	727	2.20
159	ลิ่มเลือดและก้อนเลือดอุดตันที่หลอดเลือดแดง (I74) Arterial embolism and thrombosis	รวม	5,293	8.19	5,349	8.23
		ชาย	3,052	9.61	2,940	9.21
		หญิง	2,241	6.82	2,409	7.29
160	โรคของหลอดเลือดแดง หลอดเลือดแดงย่อย และแคปิลลารีอื่น ๆ (I71-I72, I77-I79) Other disease of arteries, arterioles and capillaries	รวม	13,118	20.30	12,821	19.74
		ชาย	7,524	23.68	7,333	22.97
		หญิง	5,594	17.03	5,488	16.61
161	หลอดเลือดดำอักเสบ หลอดเลือดดำอักเสบมีลิ่มเลือดก่อนเลือดและลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ (I80-I82) Phlebitis, thrombophlebitis, venous embolism and thrombosis	รวม	19,052	29.48	18,095	27.86
		ชาย	8,076	25.42	7,436	23.29
		หญิง	10,976	33.41	10,659	32.27
162	หลอดเลือดดำขอดของระยางส่วนล่าง (I83) Varicose veins of lower extremities	รวม	1,555	2.41	1,344	2.07
		ชาย	630	1.98	537	1.68
		หญิง	925	2.82	807	2.44
163	ริดสีดวงทวาร (I84) Haemorrhoids	รวม	18,432	28.52	17,022	26.21
		ชาย	10,938	34.43	9,783	30.65
		หญิง	7,494	22.81	7,239	21.91
164	โรคอื่น ๆ ของระบบไหลเวียนโลหิต (I85-I99) Other diseases of the circulatory system	รวม	42,956	66.47	40,120	61.77
		ชาย	25,751	81.05	23,998	75.18
		หญิง	17,205	52.38	16,122	48.81
โรกระบบหายใจ (J00-J99)						
165	คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน (J02-J03) Acute pharyngitis and acute tonsillitis	รวม	91,118	141.00	84,335	129.84
		ชาย	46,604	146.68	44,099	138.14
		หญิง	44,514	135.52	40,236	121.81
166	กล่องเสียงและหลอดลมใหญ่อักเสบเฉียบพลัน (J04) Acute laryngitis and tracheitis	รวม	881	1.36	854	1.31
		ชาย	483	1.52	465	1.46
		หญิง	398	1.21	389	1.18
167	การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ (J00-J01, J05-J06) Other acute upper respiratory infections	รวม	76,107	117.77	76,927	118.43
		ชาย	39,821	125.33	41,178	128.99
		หญิง	36,286	110.47	35,749	108.22
168	ไข้หวัดใหญ่ (J10-J11) Influenza	รวม	19,954	30.88	26,239	40.40
		ชาย	10,278	32.35	13,682	42.86
		หญิง	9,676	29.46	12,557	38.01
169	ปอดบวม (J12-J18) Pneumonia	รวม	392,168	606.87	387,209	596.12
		ชาย	219,810	691.81	217,358	680.89
		หญิง	172,358	524.71	169,851	514.19
170	หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน (J20-J21) Acute bronchitis and acute bronchiolitis	รวม	161,021	249.18	159,198	245.09
		ชาย	89,684	282.26	88,041	275.80
		หญิง	71,337	217.17	71,157	215.41

ตาราง 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน(รวมทุการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค)พ.ศ.2556-2557 (ต่อ)

			หน่วยนับ : รายโรค			
รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2556	2557		
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
171	ไซนัสอักเสบเรื้อรัง (J32) Chronic sinusitis	รวม	5,291	8.19	5,023	7.73
		ชาย	2,854	8.98	2,633	8.25
		หญิง	2,437	7.42	2,390	7.24
172	โรคอื่นของจมูกและไซนัส (J30-J31, J33-J34) Other diseases of nose and nasal sinuses	รวม	12,577	19.46	11,548	17.78
		ชาย	6,863	21.60	6,354	19.90
		หญิง	5,714	17.40	5,194	15.72
173	โรคเรื้อรังของต่อมทอนซิลและต่อมน้ำเหลืองในคอ (J35) Chronic diseases of tonsils and adenoids	รวม	8,041	12.44	7,925	12.20
		ชาย	4,368	13.75	4,408	13.81
		หญิง	3,673	11.18	3,517	10.65
174	โรคอื่น ๆ ของระบบหายใจส่วนบน (J36-J39) Other diseases of upper respiratory tract	รวม	7,529	11.65	6,589	10.14
		ชาย	4,391	13.82	3,769	11.81
		หญิง	3,138	9.55	2,820	8.54
175	โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น (J40-J44) Bronchitis, emphysema and other chronic obstructive pulmonary diseases	รวม	236,521	366.01	226,003	347.94
		ชาย	171,978	541.26	164,204	514.38
		หญิง	64,543	196.49	61,799	187.08
176	โรคหืด (J45-J46) Asthma	รวม	107,818	166.85	95,645	147.25
		ชาย	42,540	133.89	36,571	114.56
		หญิง	65,278	198.73	59,074	178.83
177	โรคหลอดลมเล็กโป่งพอง (J47) Bronchioectasis	รวม	13,426	20.78	12,630	19.44
		ชาย	6,463	20.34	6,173	19.34
		หญิง	6,963	21.20	6,457	19.55
178	โรคฝุ่นสะสมในปอด (J60-J65) Pneumoconiosis	รวม	182	0.28	216	0.33
		ชาย	121	0.38	159	0.50
		หญิง	61	0.19	57	0.17
179	โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินหายใจ (J22, J66-J99) Other diseases of the respiratory system	รวม	282,243	436.76	274,423	422.48
		ชาย	165,328	520.34	160,856	503.90
		หญิง	116,915	355.93	113,567	343.80
โรกระบบย่อยอาหาร (K00-K93)						
180	ฟันผุ (K02) Dental caries	รวม	7,445	11.52	7,001	10.78
		ชาย	4,047	12.74	3,885	12.17
		หญิง	3,398	10.34	3,116	9.43
181	ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง (K00-K01, K03-K08) Other disorders of teeth and supporting structures	รวม	17,623	27.27	15,964	24.58
		ชาย	9,653	30.38	8,926	27.96
		หญิง	7,970	24.26	7,038	21.31
182	โรคอื่น ๆ ของช่องปาก ต่อมน้ำลายและขากรรไกร (K09-K14) Other diseases of the oral cavity, salivary glands and jaws	รวม	20,137	31.16	18,023	27.75
		ชาย	10,156	31.96	9,136	28.62
		หญิง	9,981	30.39	8,887	26.90
183	แผลเปื่อยของกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก (K25-K27) Gastric and duodenal ulcer	รวม	48,075	74.39	40,513	62.37
		ชาย	29,235	92.01	25,547	80.03
		หญิง	18,840	57.36	14,966	45.31
184	กระเพาะอาหารอักเสบและลำไส้เล็กอักเสบ (K29) Gastritis and duodenitis	รวม	82,652	127.90	80,488	123.91
		ชาย	43,460	136.78	42,792	134.05
		หญิง	39,192	119.31	37,696	114.12
185	โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและลำไส้เล็ก (K20-K23, K28, K30-K31) Other diseases of oesophagus, stomach and duodenum	รวม	171,834	265.91	155,337	239.14
		ชาย	73,307	230.72	66,767	209.15
		หญิง	98,527	299.95	88,570	268.13
186	โรคของไส้ติ่ง (K35-K38) Diseases of appendix	รวม	95,100	147.17	83,236	128.14
		ชาย	45,165	142.15	39,706	124.38
		หญิง	49,935	152.02	43,530	131.78

ตาราง 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน(รวมทุการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค)พ.ศ.2556-2557 (ต่อ)

			หน่วยนับ : รายโรค			
รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2556	2557		
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
187	ไส้เลื่อนที่บริเวณขาหนีบ (K40) Inguinal hernia	รวม	31,843	49.28	29,168	44.90
		ชาย	30,077	94.66	27,496	86.13
		หญิง	1,766	5.38	1,672	5.06
188	ไส้เลื่อนอื่น ๆ (K41-K46) Other hernia	รวม	5,098	7.89	4,874	7.50
		ชาย	2,343	7.37	2,226	6.97
		หญิง	2,755	8.39	2,648	8.02
189	โรคโครนและลำไส้ใหญ่อักเสบแผลเป็น (K50-K51) Crohn's disease and ulcerative colitis	รวม	937	1.45	912	1.40
		ชาย	459	1.44	480	1.50
		หญิง	478	1.46	432	1.31
190	ลำไส้ไม่ทำงานและลำไส้เกิดอุดตันแบบไม่มีไส้เลื่อน (K56) Paralytic ileus and intestinal obstruction without hernia	รวม	35,656	55.18	33,904	52.20
		ชาย	21,403	67.36	19,905	62.35
		หญิง	14,253	43.39	13,999	42.38
191	โรคถุงเนื้อของลำไส้ (K57) Diverticular disease of intestine	รวม	5,665	8.77	5,399	8.31
		ชาย	2,801	8.82	2,686	8.41
		หญิง	2,864	8.72	2,713	8.21
192	โรคอื่น ๆ ของลำไส้และเยื่อช่องท้อง (K52-K55, K58-K67) Other diseases of intestine and peritoneum	รวม	97,081	150.23	92,328	142.14
		ชาย	52,718	165.92	50,129	157.03
		หญิง	44,363	135.06	42,199	127.75
193	โรคตับเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ (K70) Alcoholic liver disease	รวม	54,175	83.83	49,127	75.63
		ชาย	42,490	133.73	38,817	121.60
		หญิง	11,685	35.57	10,310	31.21
194	โรคอื่น ๆ ของตับ (K71-K77) Other disease of liver	รวม	135,395	209.52	119,972	184.70
		ชาย	84,504	265.96	75,133	235.36
		หญิง	50,891	154.93	44,839	135.74
195	โรคนิ่วในระบบน้ำดีและถุงน้ำดีอักเสบ (K80-K81) Cholelithiasis and cholecystitis	รวม	58,725	90.88	54,039	83.19
		ชาย	23,275	73.25	21,689	67.94
		หญิง	35,450	107.92	32,350	97.93
196	ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันและโรคอื่น ๆ ของตับอ่อน (K85-K86) Acute pancreatitis and other disease of the pancreas	รวม	16,882	26.12	16,014	24.65
		ชาย	12,360	38.90	11,888	37.24
		หญิง	4,522	13.77	4,126	12.49
197	โรคอื่น ๆ ของระบบย่อยอาหาร (K82-K83, K87-K93) Other diseases of the digestive system	รวม	123,703	191.43	113,074	174.08
		ชาย	77,530	244.01	70,654	221.33
		หญิง	46,173	140.57	42,420	128.42
โรคของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (L00-L99)						
198	โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (L00-L08) Infection of the skin and subcutaneous tissue	รวม	149,545	231.42	129,779	199.80
		ชาย	84,100	264.69	72,884	228.32
		หญิง	65,445	199.24	56,895	172.24
199	โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (L10-L99) Other diseases of the skin and subcutaneous tissue	รวม	103,332	159.90	98,344	151.40
		ชาย	54,749	172.31	52,219	163.58
		หญิง	48,583	147.90	46,125	139.63
โรกระบบกล้ามเนื้อเนื้อร่วมโครงร่างและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (M00-M99)						
200	ข้ออักเสบรูมาตอยด์และข้ออักเสบหลายข้อ (M05-M14) Rheumatoid arthritis and other inflammatory polyarthropathies	รวม	123,641	191.33	121,651	187.28
		ชาย	80,564	253.56	78,364	245.48
		หญิง	43,077	131.14	43,287	131.04
201	โรคข้อเสื่อม (M15-M19) Arthrosis	รวม	30,167	46.68	27,875	42.91
		ชาย	7,054	22.20	6,244	19.56
		หญิง	23,113	70.36	21,631	65.48

ตาราง 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน(รวมทุการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค)พ.ศ.2556-2557 (ต่อ)

			หน่วยนับ : รายโรค			
รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2556		2557	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
202	ความพิการของแขนขา (M20-M21) Acquired deformities of limbs	รวม	1,867	2.89	1,584	2.44
		ชาย	887	2.79	747	2.34
		หญิง	980	2.98	837	2.53
203	ความผิดปกติอื่น ๆ ของข้อ (M00-M03, M22-M25) Other disorders of joints	รวม	20,254	31.34	18,559	28.57
		ชาย	12,181	38.34	11,195	35.07
		หญิง	8,073	24.58	7,364	22.29
204	ความผิดปกติของระบบเนื้อเยื่อประสาน (M30-M36) Systemic connective tissue disorders	รวม	22,219	34.38	20,537	31.62
		ชาย	4,166	13.11	3,909	12.25
		หญิง	18,053	54.96	16,628	50.34
205	กระดูกสันหลังและหมอนรองกระดูกสันหลังอื่น ๆ ผิดปกติ (M50-M51) Cervical and other intervertebral disc disorders	รวม	8,348	12.92	7,720	11.89
		ชาย	4,260	13.41	3,924	12.29
		หญิง	4,088	12.45	3,796	11.49
206	พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ (M40-M49, M53-M54) Other dorsopathies	รวม	58,411	90.39	53,071	81.70
		ชาย	23,560	74.15	21,691	67.95
		หญิง	34,851	106.10	31,380	95.00
207	เนื้อเยื่อผิดปกติ (M60-M79) Soft tissue disorders	รวม	84,385	130.58	74,745	115.07
		ชาย	42,190	132.78	37,418	117.22
		หญิง	42,195	128.46	37,327	113.00
208	ความผิดปกติของความหนาแน่นของเนื้อกระดูก และ โครงสร้าง (M80-M85) Disorders of bone density and structure	รวม	15,104	23.37	13,236	20.38
		ชาย	4,812	15.14	4,129	12.93
		หญิง	10,292	31.33	9,107	27.57
209	กระดูกอักเสบ (M86) Osteomyelitis	รวม	9,301	14.39	8,679	13.36
		ชาย	5,778	18.19	5,358	16.78
		หญิง	3,523	10.73	3,321	10.05
210	โรคอื่น ๆ ของระบบกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อประสาน (M87-M99) Other diseases of the musculoskeletal system and connective tissue	รวม	11,990	18.55	11,142	17.15
		ชาย	6,091	19.17	5,536	17.34
		หญิง	5,899	17.96	5,606	16.97
โรคของระบบสืบพันธุ์และปัสสาวะ (N00-N99)						
211	กลุ่มอาการไตอักเสบเฉียบพลันและชนิดกำเริบเร็ว (N00-N01) Acute and rapidly progressive nephritic syndromes	รวม	3,689	5.71	3,504	5.39
		ชาย	2,178	6.85	2,035	6.37
		หญิง	1,511	4.60	1,469	4.45
212	โรคของหน่วยไตอื่น ๆ (N02-N08) Other glomerular diseases	รวม	38,584	59.71	34,540	53.18
		ชาย	15,444	48.61	13,804	43.24
		หญิง	23,140	70.45	20,736	62.77
213	โรคของท่อและเนื้อเยื่อระหว่างท่อในไต (N10-N16) Renal tubulo-interstitial diseases	รวม	105,330	163.00	92,750	142.79
		ชาย	36,301	114.25	32,810	102.78
		หญิง	69,029	210.15	59,940	181.46
214	ไตวาย (N17-N19) Renal failure	รวม	520,856	806.01	528,702	813.95
		ชาย	261,007	821.47	263,779	826.31
		หญิง	259,849	791.07	264,923	802.00
215	นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ (N20-N23) Urolithiasis	รวม	60,852	94.17	53,294	82.05
		ชาย	37,351	117.55	32,997	103.37
		หญิง	23,501	71.54	20,297	61.44
216	กระเพาะปัสสาวะอักเสบ (N30) Cystitis	รวม	26,320	40.73	23,072	35.52
		ชาย	7,787	24.51	6,862	21.50
		หญิง	18,533	56.42	16,210	49.07
217	โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะ (N25-N29, N31-N39) Other diseases of the urinary system	รวม	198,064	306.50	185,874	286.16
		ชาย	79,040	248.76	74,733	234.11
		หญิง	119,024	362.35	111,141	336.46

ตาราง 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน(รวมทุการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค)พ.ศ.2556-2557 (ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	หน่วยนับ : รายโรค			
			2556		2557	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
218	ต่อมลูกหมากโตจากการเพิ่มจำนวนเซลล์ (N40) Hyperplasia of prostate	รวม	60,826	191.44	57,556	180.30
		ชาย	60,826	191.44	57,556	180.30
		หญิง	0	0.00	0	0.00
219	ความผิดปกติอื่น ๆ ของต่อมลูกหมาก (N41-N42) Other disorders of prostate	รวม	845	2.66	720	2.26
		ชาย	845	2.66	720	2.26
		หญิง	0	0.00	0	0.00
220	ถุงน้ำและถุงที่มีอสุจิที่อักเสบ (N43) Hydrocele and spermatocele	รวม	3,273	10.30	3,006	9.42
		ชาย	3,273	10.30	3,006	9.42
		หญิง	0	0.00	0	0.00
221	หนังหุ้มปลายองคชาตยาวเกินไป ปลายติบรูเปิดไม่ได้ หรือเปิดลำบาก (N47) Redundant prepuce, phimosis and paraphimosis	รวม	4,828	15.20	4,497	14.09
		ชาย	4,828	15.20	4,497	14.09
		หญิง	0	0.00	0	0.00
222	โรคอื่น ๆ ของอวัยวะสืบพันธุ์ชาย (N44-N46, N48-N51) Other disease of male genital organs	รวม	10,301	32.42	9,229	28.91
		ชาย	10,301	32.42	9,229	28.91
		หญิง	0	0.00	0	0.00
223	ความผิดปกติของเต้านม (N60-N64) Disorders of breast	รวม	8,165	12.64	7,419	11.42
		ชาย	555	1.75	511	1.60
		หญิง	7,610	23.17	6,908	20.91
224	ปีกมดลูกและรังไข่อักเสบ (N70) Salpingitis and oophoritis	รวม	2,369	7.21	2,135	6.46
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	2,369	7.21	2,135	6.46
225	ปากมดลูกอักเสบ (N72) Inflammatory disease of cervix uteri	รวม	883	2.69	708	2.14
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	883	2.69	708	2.14
226	การอักเสบอื่น ๆ ของอวัยวะในอุ้งเชิงกรานสตรี (N71, N73-N77) Other inflammatory diseases of female pelvic organs	รวม	18,595	56.61	16,976	51.39
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	18,595	56.61	16,976	51.39
227	เยื่อบุมดลูกอยู่ผิดที่ (N80) Endometriosis	รวม	11,604	35.33	10,282	31.13
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	11,604	35.33	10,282	31.13
228	การหย่อนตัวออกมาของอวัยวะสืบพันธุ์สตรี (N81) Female genital prolapse	รวม	4,978	15.15	4,526	13.70
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	4,978	15.15	4,526	13.70
229	ความผิดปกติอื่นที่ไม่ใช่การอักเสบของรังไข่ท่อรังไข่ และเอ็นยึดมดลูก (N83) Noninflammatory disorder of ovary, fallopian tube and broad ligament	รวม	8,001	24.36	7,348	22.24
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	8,001	24.36	7,348	22.24
230	ความผิดปกติของระดู (N91-N92) Disorder of menstruation	รวม	10,545	32.10	8,491	25.70
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	10,545	32.10	8,491	25.70
231	การหมดประจำเดือนและความผิดปกติอื่นในระยะหมด ประจำเดือน (N95) Menopausal and other perimenopausal disorders	รวม	3,706	11.28	3,478	10.53
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	3,706	11.28	3,478	10.53
232	ภาวะมีบุตรยากในสตรี (N97) Female infertility	รวม	316	0.96	234	0.71
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	316	0.96	234	0.71
233	ความผิดปกติอื่น ๆ ของท่อทางเดินปัสสาวะและสืบพันธุ์ (N82, N84-N90, N93-N94, N96, N98-N99) Other disorders of genitourinary tract	รวม	24065	73.26	20,434	61.86
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	24,065	73.26	20,434	61.86

ตาราง 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน(รวมทุการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค)พ.ศ.2556-2557 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2556		2557	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
การตั้งครรภ์ การคลอดและระยะหลังคลอด (O00-O99)						
234	แท้งเอง (O03) Spontaneous abortion	รวม	17,479	53.21	13,725	41.55
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	17,479	53.21	13,725	41.55
235	การทำแท้งโดยเหตุผลทางการแพทย์ (O04) Medical abortion	รวม	1,591	4.84	1,536	4.65
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	1,591	4.84	1,536	4.65
236	การตั้งครรภ์อื่น ๆ ที่สิ้นสุดโดยการแท้ง (O00-O02, O05-O08) Other pregnancies with abortive outcome	รวม	30,632	93.25	26,464	80.11
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	30,632	93.25	26,464	80.11
237	การบวม การมีโปรตีนในปัสสาวะ และความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ระยะคลอด และระยะหลังคลอด (O10-O16) Oedema, proteinuria and hypertensive disorders in pregnancy, childbirth and the puerperium	รวม	23,237	70.74	19,841	60.06
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	23,237	70.74	19,841	60.06
238	รกเกาะต่ำ รกลอกตัวก่อนกำหนด และตกเลือดก่อนคลอด (O44-O46) Placenta praevia, premature separation of placenta and antepartum haemorrhage	รวม	6,558	19.96	5,454	16.51
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	6,558	19.96	5,454	16.51
239	การดูแล มารดาอื่นๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ์และถุงน้ำคร่ำ และปัญหาที่อาจจะเกิดได้ในระยะคลอด (O30-O43, O47-O48) Other maternal care related to fetus and amniotic cavity and possible delivery problems	รวม	147,586	449.30	126,700	383.56
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	147,586	449.30	126,700	383.56
240	การคลอดติดขัด (O64-O66) Obstructed labour	รวม	34,105	103.83	26,309	79.65
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	34,105	103.83	26,309	79.65
241	ตกเลือดหลังคลอด (O72) Postpartum haemorrhage	รวม	11,562	35.20	9,645	29.20
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	11,562	35.20	9,645	29.20
242	ภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ของการตั้งครรภ์ และการคลอด (O20-O29, O60-O63, O67-O71, O73-O75, O81-O84) Other complications of pregnancy and delivery	รวม	311,943	949.66	257,487	779.49
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	311,943	949.66	257,487	779.49
243	การคลอดของครรภ์เดียว (O80) Single spontaneous delivery	รวม	298,292	908.10	225,927	683.95
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	298,292	908.10	225,927	683.95
244	ภาวะแทรกซ้อนที่ส่วนใหญ่พบในระยะหลังคลอด และภาวะทางสูติกรรมอื่น ๆ ที่มีได้ระบุรายละเอียด (O85-O99) Complications predominantly related to the puerperium and other obstetric conditions, not Elsewhere classified	รวม	66,537	202.56	55,613	168.36
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	66,537	202.56	55,613	168.36
ภาวะบางอย่างที่เกิดในระยะปริกำเนิด (P00-P96)						
245	ทารกในครรภ์และแรกเกิดที่ได้รับผลจากปัจจัยทางมารดา และโรคแทรกในระยะตั้งครรภ์ เจ็บครรภ์และคลอด (P00-P04) Fetus and newborn affected by maternal factors and by complications of pregnancy, labor and delivery	รวม	35,270	54.58	28,922	44.53
		ชาย	18,612	58.58	15,340	48.05
		หญิง	16,658	50.71	13,582	41.12
246	ทารกในครรภ์โตช้าทารกในครรภ์ขาดสารอาหาร และความผิดปกติเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ระยะสั้นและน้ำหนักแรกเกิดน้อย (P05-P07) Slow fetal growth, fetal malnutrition and disorders related to short gestation and low birth weight	รวม	69,635	107.76	63,724	98.10
		ชาย	34,197	107.63	31,400	98.36
		หญิง	35,438	107.88	32,324	97.85

ตาราง 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน(รวมทุการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค)พ.ศ.2556-2557 (ต่อ)

			หน่วยนับ : รายโรค			
รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2556	2557		
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
247	บาดเจ็บจากการคลอด (P10-P15) Birth trauma	รวม	8,554	13.24	7,822	12.04
		ชาย	4,964	15.62	4,581	14.35
		หญิง	3,590	10.93	3,241	9.81
248	ขาดออกซิเจนขณะอยู่ในโพรงมดลูก และภาวะ แอสฟิเซียเมื่อแรกเกิด (P20-P21) Intrauterine hypoxia and birth asphyxia	รวม	14,984	23.19	13,730	21.14
		ชาย	8,333	26.23	7,641	23.94
		หญิง	6,651	20.25	6,089	18.43
249	ภาวะหายใจผิดปกติอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด (P22-P28) Other respiratory disorders originating in the perinatal period	รวม	62,273	96.37	59,997	92.37
		ชาย	36,935	116.25	35,850	112.30
		หญิง	25,338	77.14	24,147	73.10
250	การติดเชื้อแต่กำเนิดและโรคปรสิต (P35-P37) Congenital infectious and parasitic diseases	รวม	30,470	47.15	26,851	41.34
		ชาย	16,528	52.02	14,627	45.82
		หญิง	13,942	42.44	12,224	37.01
251	การติดเชื้อเฉพาะอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด (P38-P39) Other infections specific to the perinatal period	รวม	6,629	10.26	5,254	8.09
		ชาย	3,758	11.83	2,974	9.32
		หญิง	2,871	8.74	2,280	6.90
252	โรคเม็ดเลือดแดงของทารกในครรภ์และแรกเกิด (P55) Haemolytic disease of fetus and newborn	รวม	7,889	12.21	7,257	11.17
		ชาย	3,965	12.48	3,693	11.57
		หญิง	3,924	11.95	3,564	10.79
253	ภาวะอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด (P08, P29, P50-P54, P56-P96) Other conditions originating in the perinatal period	รวม	265,254	410.47	232,679	358.21
		ชาย	144,457	454.65	127,496	399.39
		หญิง	120,797	367.75	105,183	318.42
ความผิดปกติ ความพิการแต่กำเนิด และโครโมโซมผิดปกติ (Q00-Q99)						
254	กระดูกสันหลังแยก (Q05) Spina blfida	รวม	626	0.97	566	0.87
		ชาย	301	0.95	270	0.85
		หญิง	325	0.99	296	0.90
255	ความผิดปกติอื่น ๆ แต่กำเนิดของระบบประสาท (Q00- Q04, Q06-Q07) Other congenital malformations of the nervous system	รวม	3,358	5.20	2,994	4.61
		ชาย	1,741	5.48	1,599	5.01
		หญิง	1,617	4.92	1,395	4.22
256	ความผิดปกติแต่กำเนิดของระบบไหลเวียนโลหิต (Q20-Q28) Congenital malformation of the circulatory system	รวม	32,081	49.64	28,781	44.31
		ชาย	16,079	50.61	14,444	45.25
		หญิง	16,002	48.72	14,337	43.40
257	ปากแหว่งและเพดานโหว่ (Q35-Q37) Cleft lip and cleft palate	รวม	4,838	7.49	4,341	6.68
		ชาย	2,643	8.32	2,299	7.20
		หญิง	2,195	6.68	2,042	6.18
258	ลำไส้เล็กไม่มี ดันและตีบ (Q41) Absence, atresia and stenosis of small intestine	รวม	453	0.70	332	0.51
		ชาย	240	0.76	149	0.47
		หญิง	213	0.65	183	0.55
259	ความผิดปกติแต่กำเนิดอื่น ๆ ของระบบย่อยอาหาร (Q38-Q40, Q42-Q45) Other congenital malformations of the digestive system	รวม	18,124	28.05	21,451	33.02
		ชาย	10,718	33.73	12,802	40.10
		หญิง	7,406	22.55	8,649	26.18
260	อัณฑะไม่ลงถุง (Q53) UndescEnded testicle	รวม	2,226	7.01	2,154	6.75
		ชาย	2,226	7.01	2,154	6.75
		หญิง	0	0.00	0	0.00
261	ความผิดปกติอื่น ๆ ของระบบสืบพันธุ์และทางเดิน ปัสสาวะ (Q50-Q52, Q54-Q64) Other malformations of the genitourinary system	รวม	4,772	7.38	4,322	6.65
		ชาย	3,105	9.77	2,797	8.76
		หญิง	1,667	5.07	1,525	4.62
262	ความพิการแต่กำเนิดของสะโพก (Q65) Congenital deformities of hip	รวม	337	0.52	266	0.41
		ชาย	121	0.38	94	0.29
		หญิง	216	0.66	172	0.52

ตาราง 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน(รวมทุการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค)พ.ศ.2556-2557 (ต่อ)

			หน่วยนับ : รายโรค			
รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2556	2557		
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
263	ความพิการแต่กำเนิดของเท้า (Q66) Congenital deformities of feet	รวม	2,676	4.14	2,425	3.73
		ชาย	1,401	4.41	1,273	3.99
		หญิง	1,275	3.88	1,152	3.49
264	ความผิดปกติและความพิการแต่กำเนิดอื่น ๆ ของระบบ กล้ามเนื้อและโครงร่าง (Q67-Q79) Other congenital malformations and deformations of the musculoskeletal system	รวม	5,659	8.76	5,118	7.88
		ชาย	3,104	9.77	2,861	8.96
		หญิง	2,555	7.78	2,257	6.83
265	ความผิดปกติแต่กำเนิดอื่น ๆ Other congenital malformations (Q10-Q18, Q30-Q34, Q80-Q89)	รวม	9,802	15.17	8,927	13.74
		ชาย	5,229	16.46	4,707	14.75
		หญิง	4,573	13.92	4,220	12.78
266	ความผิดปกติของโครโมโซมที่มีได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น (Q90-Q99) Chromosomal abnormalities, not Elsewhere classified	รวม	6,483	10.03	5,479	8.44
		ชาย	3,450	10.86	2,901	9.09
		หญิง	3,033	9.23	2,578	7.80
อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจทั้งคลินิกและตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มีได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น (R00-R99)						
267	ปวดท้องและปวดอุ้งเชิงกราน (R10) Abdominal and pelvic pain	รวม	30,408	47.06	26,486	40.78
		ชาย	11,894	37.43	10,416	32.63
		หญิง	18,514	56.36	16,070	48.65
268	ไข้ไม่ทราบสาเหตุ (R50) Fever of unknown origin	รวม	72,454	112.12	63,398	97.60
		ชาย	37,046	116.59	33,222	104.07
		หญิง	35,408	107.79	30,176	91.35
269	ชราภาพ (R54) Senility	รวม	5,201	8.05	3,518	5.42
		ชาย	2,016	6.34	1,437	4.50
		หญิง	3,185	9.70	2,081	6.30
270	อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจ ทางคลินิกและตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มีได้มีรหัส ระบุไว้ (R00-R09, R11-R49, R51-R53, R55-R99) Other symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not Elsewhere classified	รวม	663,738	1,027.12	641,877	988.18
		ชาย	337,697	1,062.83	328,038	1,027.61
		หญิง	326,041	992.58	313,839	950.08
การบาดเจ็บ การเป็นพิษและผลติดตามจากเหตุภายนอก (S00-T98)						
271	กระดูกแตกหักบริเวณกระดูกศีรษะและกระดูกหน้า (S02) Fracture of skull and facial bones	รวม	33,114	51.24	29,672	45.68
		ชาย	26,640	83.84	23,998	75.18
		หญิง	6,474	19.71	5,674	17.18
272	กระดูกคอ กระดูกซี่โครง หรือกระดูกเชิงกรานหัก (S12, S22, S32, T08) Fracture of neck, thorax and pelvis	รวม	29,439	45.56	25,548	39.33
		ชาย	19,925	62.71	17,322	54.26
		หญิง	9,514	28.96	8,226	24.90
273	กระดูกต้นขา แตก หัก ร้าว (S72) Fracture of femur	รวม	33,451	51.76	31,073	47.84
		ชาย	15,525	48.86	13,973	43.77
		หญิง	17,926	54.57	17,100	51.77
274	กระดูกแตกหักของแขนขาอื่น ๆ (S42, S52, S62, S82, S92, T10, T12) Fracture of other limb bones	รวม	126,558	195.85	107,849	166.04
		ชาย	87,900	276.65	74,503	233.39
		หญิง	38,658	117.69	33,346	100.95
275	กระดูกแตกหักหลายบริเวณในร่างกาย (T02) Fracture involving multiple body regions	รวม	227	0.35	123	0.19
		ชาย	168	0.53	95	0.30
		หญิง	59	0.18	28	0.08
276	กระดูกเคลื่อน เคล็ด ชัด บริเวณร่างกายหลายแห่งที่ ระบุเฉพาะ (S03, S13, S23, S33, S43,S53, S63, S73, S83, S93, T03) Dislocations, sprains and strains of specified and multiple body regions	รวม	20,326	31.45	16,821	25.90
		ชาย	13,539	42.61	11,345	35.54
		หญิง	6,787	20.66	5,476	16.58
277	การบาดเจ็บของตาและเบ้าตา (S05) Injury of eye and orbi	รวม	13,216	20.45	10,343	15.92
		ชาย	10,492	33.02	8,139	25.50
		หญิง	2,724	8.29	2,204	6.67

ตาราง 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน(รวมทุการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค)พ.ศ.2556-2557 (ต่อ)

			หน่วยนับ : รายโรค			
รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2556	2557		
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
278	การบาดเจ็บภายในกะโหลกศีรษะ (S06) Intracranial injury	รวม	88,691	137.25	71,472	110.03
		ชาย	64,799	203.94	52,219	163.58
		หญิง	23,892	72.74	19,253	58.28
279	การบาดเจ็บของอวัยวะภายในอื่น ๆ (S26-S27, S36-S37) Injury of other internal organs	รวม	25,175	38.96	21,936	33.77
		ชาย	20,418	64.26	18,039	56.51
		หญิง	4,757	14.48	3,897	11.80
280	การบาดเจ็บจากการบดอัดและการบาดเจ็บที่เกิดจาก ตัดขวางบริเวณร่างกายหลายแห่งที่ระบุเฉพาะ (S07-S08, S17-S18, S28, S38, S47-S48, S57-S58, S67-S68, S77-S78, S87-S88, S97-S98, T04-T05) Crushing injuries and traumatic amputations of specified and multiple body regions	รวม	7,408	11.46	5,972	9.19
		ชาย	6,033	18.99	4,828	15.12
		หญิง	1,375	4.19	1,144	3.46
281	การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ ,ไม่ระบุเฉพาะและหลาย บริเวณในร่างกาย (S00-S01, S04, S09-S11, S09-S11, S14-S16, S19-S21, S24-S25, S29-S31, S34-S35, S39-S41, S44-S46, S49-S51, S54-S56, S59-S61, S64-S66, S69-S71, S74-S76, S79-S81, S84-S86, S89-S91, S94-S96, S99, T00-T01, T06-T07, T09, T11, T13-T14) Other injuries of specified, unspecified and multiple body regions	รวม	246,073	380.79	187,242	288.26
		ชาย	179,902	566.20	136,584	427.86
		หญิง	66,171	201.45	50,658	153.36
282	ผลของวัตถุแปลกปลอมผ่านเข้าทางทวารธรรมชาติ ของร่างกาย (T15-T19) Effects of foreign body entering through natural orifice	รวม	6,496	10.05	5,695	8.77
		ชาย	3,849	12.11	3,383	10.60
		หญิง	2,647	8.06	2,312	7.00
283	แผลถูกความร้อนและถูกสารกัดกร่อน (T20-T32) Burns and corrosions	รวม	23,233	35.95	20,713	31.89
		ชาย	15,609	49.13	13,726	43.00
		หญิง	7,624	23.21	6,987	21.15
284	การเป็นพิษจากยา เครื่องยาและชีววัตถุ (T36-T50) Poisoning by drugs and biological substances	รวม	34,738	53.76	28,555	43.96
		ชาย	13,944	43.89	12,191	38.19
		หญิง	20,794	63.30	16,364	49.54
285	การเป็นพิษจากสารที่โดยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ใช้ เป็นยา (T51-T65) Toxic effects of substances chiefly nonmedicinal as to source	รวม	49,391	76.43	45,179	69.55
		ชาย	28,533	89.80	26,360	82.58
		หญิง	20,858	63.50	18,819	56.97
286	กลุ่มอาการจากการทารุณ (T74) Maltreatment syndromes	รวม	522	0.81	394	0.61
		ชาย	102	0.32	73	0.23
		หญิง	420	1.28	321	0.97
287	อื่น ๆ และที่ไม่ได้ระบุผลของสาเหตุภายนอก (T33-T35, T66-T73, T75-T78) Other and unspecified effects of external causes	รวม	27,555	42.64	27,268	41.98
		ชาย	15,597	49.09	15,595	48.85
		หญิง	11,958	36.40	11,673	35.34
288	ภาวะแทรกซ้อนระยะแรกของการบาดเจ็บบางชนิด และภาวะแทรกซ้อนของการรักษาทางศัลยกรรม และอายุรกรรมที่ไม่ได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น (T79-T88) Certain early complications of trauma and complications of surgical and medical care, note Elsewhere classified	รวม	110,240	170.59	104,340	160.63
		ชาย	63,861	200.99	60,046	188.10
		หญิง	46,379	141.19	44,294	134.09
289	ผลระยะล่าของการบาดเจ็บ การเป็นพิษและผลที่ตาม มาจากสาเหตุภายนอกอื่น ๆ (T90-T98) Sequela of injuries, of poisoning and of other consequences of external causes	รวม	2,032	3.14	1,793	2.76
		ชาย	1,473	4.64	1,287	4.03
		หญิง	559	1.70	506	1.53
ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อสถานะสุขภาพและการเข้ารับบริการสุขภาพ (Z00-Z99)						
290	บุคคลขอรับบริการเพื่อการตรวจและชันสูตร (Z00-Z13) Persons encountering health services for examination and investigation	รวม	47,797	73.96	40,301	62.04
		ชาย	20,564	64.72	16,608	52.03
		หญิง	27,233	82.91	23,693	71.73

ตาราง 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน(รวมทุกรายวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค)พ.ศ.2556-2557 (ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	หน่วยนับ : รายโรค			
			2556		2557	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
291	การติดเชื้อไวรัสโดยไม่มีอาการ (Z21) Asymptomatic human immunodeficiency virus (HIV) infection status	รวม	2,587	4.00	2,098	3.23
		ชาย	1,021	3.21	978	3.06
		หญิง	1,566	4.77	1,120	3.39
292	บุคคลที่มีอาการที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ เกี่ยวข้องกับโรคติดต่อ (Z20, Z22-Z29) Other persons with potential health hazards related to communicable diseases	รวม	123,204	190.66	111,314	171.37
		ชาย	62,853	197.82	56,975	178.48
		หญิง	60,351	183.73	54,339	164.50
293	การรับบริการคุมกำเนิด (Z30) Contraceptive management	รวม	48,759	75.45	44,607	68.67
		ชาย	39	0.12	45	0.14
		หญิง	48,720	148.32	44,562	134.90
294	การตรวจคัดกรองก่อนการคลอด และการให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการตั้งครรภ์อื่น ๆ (Z34-Z36) Antenatal screening and other supervision of pregnancy	รวม	17,560	53.46	15,490	46.89
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	17,560	53.46	15,490	46.89
295	การเกิดของทารกตามสถานที่เกิด (Z38) Liveborn infants according to place of birth	รวม	623,577	964.97	540,334	831.85
		ชาย	321,355	1,011.40	279,134	874.41
		หญิง	302,222	920.06	261,200	790.73
296	การดูแลและการตรวจหลังคลอด (Z39) Postpartum care and examination	รวม	2,690	8.19	1,796	5.44
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	2,690	8.19	1,796	5.44
297	บุคคลขอรับบริการสุขภาพ เพื่อหัตถการหรือการ บริการสุขภาพที่ระบุเฉพาะ (Z40-Z54, Z40-Z54) Persons encountering health services for specific procedures and health care	รวม	241,270	373.36	238,573	367.29
		ชาย	118,388	372.60	118,545	371.35
		หญิง	122,882	374.09	120,028	363.36
298	บุคคลขอรับบริการสุขภาพด้วยเหตุผลอื่น (Z31-Z33, Z37, Z55-Z99) Persons encountering health services for other reasons	รวม	526,500	814.75	428,304	659.38
		ชาย	43,467	136.80	43,679	136.83
		หญิง	483,033	1,470.51	384,625	1,164.37

รวมรวม / วิเคราะห์ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน สวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการและครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สภส.)

ตาราง 23 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน ตามกลุ่มสาเหตุภายนอกของการบาดเจ็บ จำแนกเพศ รายภาค/กรุงเทพมหานคร ตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 พ.ศ.2557

กลุ่มสาเหตุภายนอกของการบาดเจ็บ		เพศ	ภาคเหนือ		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.)		ภาคใต้		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพมหานคร		รวมทั้งประเทศ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
รวมทุกกลุ่ม		รวม	88,631	748.81	99,237	603.28	63,363	690.98	143,304	657.05	19,827	348.50	414,362	637.92
		ชาย	57,412	985.81	62,849	784.68	40,687	899.79	94,859	872.50	13,103	486.16	268,910	842.38
		หญิง	31,219	519.24	36,388	431.14	22,676	487.85	48,445	442.90	6,724	224.58	145,452	440.33
คนเดินเท้าที่บาดเจ็บในอุบัติเหตุการขนส่ง (V01-V09) Pedestrian injured in transport accident		รวม	399	3.37	743	4.52	516	5.63	921	4.22	283	4.97	2,862	4.41
		ชาย	255	4.38	450	5.62	306	6.77	608	5.59	177	6.57	1,796	5.63
		หญิง	144	2.40	293	3.47	210	4.52	313	2.86	106	3.54	1,066	3.23
ผู้ใช้จักรยานบาดเจ็บในอุบัติเหตุจากการขนส่ง (V10 - V19) Pedal cyclist injured in transport accident		รวม	1,645	13.90	1,226	7.45	717	7.82	2,455	11.26	221	3.88	6,264	9.64
		ชาย	1,062	18.24	849	10.60	485	10.73	1,699	15.63	161	5.97	4,256	13.33
		หญิง	583	9.70	377	4.47	232	4.99	756	6.91	60	2.00	2,008	6.08
ผู้ไรด์จักรยานยนต์บาดเจ็บในอุบัติเหตุจากการขนส่ง (V20-V29) Motorcycle rider injured in transport accident		รวม	9,852	83.24	14,043	85.37	9,303	101.45	17,588	80.64	3,213	56.47	53,999	83.13
		ชาย	7,391	126.91	10,332	129.00	6,500	143.75	13,444	123.66	2,658	98.62	40,325	126.32
		หญิง	2,461	40.93	3,711	43.97	2,803	60.30	4,144	37.89	555	18.54	13,674	41.40
ผู้โดยสารสามล้อเครื่องบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการขนส่ง (V30-V39) Occupant of three-wheeled motor vehicle injured in transport accident		รวม	181	1.53	172	1.05	110	1.20	237	1.09	32	0.56	732	1.13
		ชาย	119	2.04	113	1.41	76	1.68	166	1.53	25	0.93	499	1.56
		หญิง	62	1.03	59	0.70	34	0.73	71	0.65	7	0.23	233	0.71
ผู้โดยสารรถยนต์บาดเจ็บจากอุบัติเหตุการขนส่ง (V40-V49) Car occupant injured in transport accident		รวม	456	3.85	770	4.68	417	4.55	595	2.73	150	2.64	2,388	3.68
		ชาย	311	5.34	518	6.47	271	5.99	405	3.73	108	4.01	1,613	5.05
		หญิง	145	2.41	252	2.99	146	3.14	190	1.74	42	1.40	775	2.35
ผู้โดยสารรถกระบะหรือรถตู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุการขนส่ง (V50-V59) Occupant of pick-up truck or van injured in transport accident		รวม	487	4.11	640	3.89	504	5.50	857	3.93	53	0.93	2,541	3.91
		ชาย	354	6.08	453	5.66	345	7.63	584	5.37	43	1.60	1,779	5.57
		หญิง	133	2.21	187	2.22	159	3.42	273	2.50	10	0.33	762	2.31
ผู้โดยสารรถบรรทุกหนักบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการขนส่ง (V60-V69) Occupant of heavy transport vehicle injured in transport accident		รวม	82	0.69	156	0.95	34	0.37	153	0.70	15	0.26	440	0.68
		ชาย	70	1.20	123	1.54	30	0.66	127	1.17	14	0.52	364	1.14
		หญิง	12	0.20	33	0.39	4	0.09	26	0.24	1	0.03	76	0.23
ผู้โดยสารเมสโดยสาธารณะบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการขนส่ง (V70-V79) Bus occupant injured in transport accident		รวม	23	0.19	27	0.16	6	0.07	44	0.20	15	0.26	115	0.18
		ชาย	13	0.22	14	0.17	3	0.07	20	0.18	6	0.22	56	0.18
		หญิง	10	0.17	13	0.15	3	0.06	24	0.22	9	0.30	59	0.18

ตาราง 23 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน ตามกลุ่มสาเหตุภายนอกของการบาดเจ็บ จำแนกเพศ ภูมิภาค/กรุงเทพมหานคร ตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 พ.ศ.2557 (ต่อ)

กลุ่มสาเหตุภายนอกของการบาดเจ็บ	เพศ	ภาคเหนือ		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.)		ภาคใต้		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพมหานคร		รวมทั้งประเทศ	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
อุบัติเหตุการขนส่งทางบกอื่น (V80-V89)	รวม	595	5.03	166	1.01	53	0.58	894	4.10	19	0.33	1,727	2.66
Other land transport accidents	ชาย	484	8.31	130	1.62	48	1.06	734	6.75	15	0.56	1,411	4.42
	หญิง	111	1.85	36	0.43	5	0.11	160	1.46	4	0.13	316	0.96
อุบัติเหตุการขนส่งทางน้ำ (V90-V94)	รวม	5	0.04	34	0.21	35	0.38	6	0.03	6	0.11	86	0.13
Water transport accidents	ชาย	3	0.05	24	0.30	28	0.62	5	0.05	3	0.11	63	0.20
	หญิง	2	0.03	10	0.12	7	0.15	1	0.01	3	0.10	23	0.07
อุบัติเหตุการขนส่งทางอากาศและอวกาศ (V95-V97)	รวม		0.00	5	0.03	2	0.02	1	0.00	2	0.04	10	0.02
Air and space transport accidents	ชาย		0.00	3	0.04	2	0.04	1	0.01	2	0.07	8	0.03
	หญิง		0.00	2	0.02		0.00		0.00		0.00	2	0.01
อุบัติเหตุการขนส่งอื่นและที่ไม่ระบุ (V98-V99)	รวม	5	0.04	13	0.08	10	0.11	2	0.01	28	0.49	58	0.09
Other and unspecified transport accidents	ชาย	5	0.09	10	0.12	7	0.15	2	0.02	20	0.74	44	0.14
	หญิง		0.00	3	0.04	3	0.06		0.00	8	0.27	14	0.04
การพลัดตกหกล้ม (W00-W19)	รวม	25,235	213.20	20,999	127.66	12,058	131.49	32,129	147.31	4,818	84.69	95,239	146.62
Falls	ชาย	14,227	244.29	11,538	144.05	6,787	150.09	19,054	175.26	2,467	91.53	54,073	169.39
	หญิง	11,008	183.09	9,461	112.10	5,271	113.40	13,075	119.54	2,351	78.52	41,166	124.62
บาดเจ็บจากการถูกแรงเชิงกลของวัตถุสิ่งของ (W20-W49)	รวม	15,784	133.35	14,857	90.32	9,702	105.80	25,413	116.52	2,258	39.69	68,014	104.71
Exposure to inanimate mechanical forces	ชาย	12,535	215.24	11,363	141.87	7,551	166.99	19,888	182.93	1,785	66.23	53,122	166.41
	หญิง	3,249	54.04	3,494	41.40	2,151	46.28	5,525	50.51	473	15.80	14,892	45.08
สัมผัสแรงเชิงกลของคน/สัตว์ (W50-W64)	รวม	3,664	30.96	6,101	37.09	4,020	43.84	6,732	30.87	403	7.08	20,920	32.21
Exposure to animate mechanical forces	ชาย	2,103	36.11	3,335	41.64	2,444	54.05	4,008	36.86	231	8.57	12,121	37.97
	หญิง	1,561	25.96	2,766	32.77	1,576	33.91	2,724	24.90	172	5.74	8,799	26.64
อุบัติเหตุจมน้ำตายและการตก จมน้ำ (W65-W74)	รวม	152	1.28	326	1.98	207	2.26	413	1.89	56	0.98	1,154	1.78
Accidental drowning and submersion	ชาย	90	1.55	219	2.73	125	2.76	274	2.52	39	1.45	747	2.34
	หญิง	62	1.03	107	1.27	82	1.76	139	1.27	17	0.57	407	1.23
อุบัติเหตุอื่นที่คุกคามต่อการหายใจ (W75-W84)	รวม	124	1.05	93	0.57	73	0.80	159	0.73	33	0.58	482	0.74
Other accidental threats to breathing	ชาย	78	1.34	47	0.59	40	0.88	103	0.95	20	0.74	288	0.90
	หญิง	46	0.77	46	0.55	33	0.71	56	0.51	13	0.43	194	0.59

หน่วยนับ : ราย

ตาราง 23 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน ตามกลุ่มสาเหตุภายนอกของการบาดเจ็บ จำแนกเพศ รายภาค/กรุงเทพมหานคร ตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 พ.ศ.2557 (ต่อ)

กลุ่มสาเหตุภายนอกของการบาดเจ็บ	เพศ	ภาคเหนือ		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.)		ภาคใต้		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพมหานคร		รวมทั้งประเทศ	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
อุบัติเหตุจากกระแสไฟฟ้า รังสี อุณหภูมิอากาศและความกดอากาศ ที่มากผิดปกติ (W85-W99) Exposure to electric current, radiation and extreme ambient air temperature and pressure	รวม	733	6.19	1,292	7.85	781	8.52	2,182	10.00	136	2.39	5,124	7.89
	ชาย	555	9.53	914	11.41	521	11.52	1,382	12.71	110	4.08	3,482	10.91
	หญิง	178	2.96	378	4.48	260	5.59	800	7.31	26	0.87	1,642	4.97
การสัมผัสควัน ไฟ และเปลวไฟ (X00-X09) Exposure to smoke, fire and flames	รวม	396	3.35	417	2.54	258	2.81	834	3.82	80	1.41	1,985	3.06
	ชาย	275	4.72	277	3.46	185	4.09	550	5.06	55	2.04	1,342	4.20
	หญิง	121	2.01	140	1.66	73	1.57	284	2.60	25	0.83	643	1.95
การถูกความร้อนและสิ่งของร้อน (X10-X19) Contact with heat and hot substances	รวม	813	6.87	999	6.07	714	7.79	1,612	7.39	188	3.30	4,326	6.66
	ชาย	487	8.36	573	7.15	397	8.78	956	8.79	102	3.78	2,515	7.88
	หญิง	326	5.42	426	5.05	317	6.82	656	6.00	86	2.87	1,811	5.48
สัมผัสกับสัตว์หรือพืชมีพิษ (X20-X29) Contact with venomous animals and plants	รวม	5,423	45.82	8,519	51.79	8,060	87.90	10,806	49.55	428	7.52	33,236	51.17
	ชาย	3,397	58.33	5,006	62.50	4,926	108.94	6,604	60.74	240	8.90	20,173	63.19
	หญิง	2,026	33.70	3,513	41.62	3,134	67.43	4,202	38.42	188	6.28	13,063	39.55
สัมผัสกับแรงหรือพลังงานธรรมชาติ (X30-X39) Exposure to forces of nature	รวม	57	0.48	109	0.66	36	0.39	154	0.71	20	0.35	376	0.58
	ชาย	43	0.74	90	1.12	29	0.64	118	1.09	18	0.67	298	0.93
	หญิง	14	0.23	19	0.23	7	0.15	36	0.33	2	0.07	78	0.24
การเป็นพิษโดยอุบัติเหตุจากการสัมผัสกับสารเป็นพิษ (X40-X49) Accidental poisoning by and exposure to noxious substances	รวม	2,958	24.99	3,834	23.31	2,552	27.83	4,839	22.19	431	7.58	14,614	22.50
	ชาย	1,669	28.66	2,127	26.56	1,309	28.95	2,538	23.34	223	8.27	7,866	24.64
	หญิง	1,289	21.44	1,707	20.23	1,243	26.74	2,301	21.04	208	6.95	6,748	20.43
การออกกำลังกายมากเกินไป การเดินทางและการขาดน้ำ หรืออาหาร (X50-X57) Overexertion, travel and privation	รวม	285	2.41	370	2.25	166	1.81	410	1.88	76	1.34	1,307	2.01
	ชาย	165	2.83	223	2.78	97	2.15	251	2.31	52	1.93	788	2.47
	หญิง	120	2.00	147	1.74	69	1.48	159	1.45	24	0.80	519	1.57
สัมผัสกับปัจจัยอื่นหรือปัจจัยที่ไม่ได้ระบุโดยอุบัติเหตุ (X58-X59) Accidental exposure to other and unspecified factors	รวม	1,455	12.29	1,999	12.15	911	9.93	4,155	19.05	225	3.95	8,745	13.46
	ชาย	884	15.18	1,047	13.07	505	11.17	2,417	22.23	120	4.45	4,973	15.58
	หญิง	571	9.50	952	11.28	406	8.73	1,738	15.89	105	3.51	3,772	11.42

ตาราง 23 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน ตามกลุ่มสาเหตุภายนอกของการบาดเจ็บ จำแนกเพศ รายภาค/กรุงเทพมหานคร ตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 พ.ศ.2557 (ต่อ)

กลุ่มสาเหตุภายนอกของการบาดเจ็บ	เพศ	ภาคเหนือ		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.)		ภาคใต้		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพมหานคร		รวมทั้งประเทศ	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
การมีเจตนาทำร้ายตนเอง (X60-X84) Intentional self-harm	รวม	3,681	31.10	4,998	30.38	2,092	22.81	3,565	16.35	669	11.76	15,005	23.10
	ชาย	1,825	31.34	2,131	26.61	858	18.97	1,687	15.52	273	10.13	6,774	21.22
	หญิง	1,856	30.87	2,867	33.97	1,234	26.55	1,878	17.17	396	13.23	8,231	24.92
การทำร้ายผู้อื่น (X85-Y09) Assault	รวม	5,061	42.76	7,950	48.33	4,919	53.64	11,559	53.00	2,602	45.74	32,091	49.40
	ชาย	3,941	67.67	6,466	80.73	3,919	86.67	9,269	85.25	2,298	85.26	25,893	81.11
	หญิง	1,120	18.63	1,484	17.58	1,000	21.51	2,290	20.94	304	10.15	6,198	18.76
เหตุการณ์ที่ไม่สามารถระบุเจตนา (Y10-Y34) Event of undetermined intent	รวม	1,335	11.28	1,056	6.42	735	8.02	1,679	7.70	262	4.61	5,067	7.80
	ชาย	761	13.07	585	7.30	436	9.64	978	9.00	152	5.64	2,912	9.12
	หญิง	574	9.55	471	5.58	299	6.43	701	6.41	110	3.67	2,155	6.52
ปฏิบัติการทางกฎหมายและสงคราม (Y35-Y36) Legal intervention and operations of war	รวม		0.00	6	0.04	60	0.65	11	0.05	61	1.07	138	0.21
	ชาย		0.00	6	0.07	52	1.15	11	0.10	57	2.11	126	0.39
	หญิง		0.00		0.00	8	0.17		0.00	4	0.13	12	0.04
ยา เครื่องยา และชีววัตถุ ทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนเมื่อใช้ในการรักษา (Y40-Y59) Drugs, medicaments and biological substances causing adverse effects in therapeutic use	รวม	2,103	17.77	2,209	13.43	1,406	15.33	3,696	16.95	411	7.22	9,825	15.13
	ชาย	988	16.96	969	12.10	656	14.51	1,653	15.20	180	6.68	4,446	13.93
	หญิง	1,115	18.54	1,240	14.69	750	16.14	2,043	18.68	231	7.72	5,379	16.28
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยขณะให้การรักษาทันทีกรรมและอายุกรรม (Y60-Y69) Misadventures to patients during surgical and medical care	รวม	221	1.87	183	1.11	185	2.02	336	1.54	189	3.32	1114	1.72
	ชาย	141	2.42	96	1.20	123	2.72	203	1.87	101	3.75	664	2.08
	หญิง	80	1.33	87	1.03	62	1.33	133	1.22	88	2.94	450	1.36
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับความผิดพลาดในการวินิจฉัยและการรักษา (Y70-Y82) Medical devices associated with adverse incidents in diagnostic and therapeutic use	รวม	602	5.09	496	3.02	127	1.38	458	2.10	492	8.65	2,175	3.35
	ชาย	375	6.44	309	3.86	90	1.99	308	2.83	289	10.72	1,371	4.29
	หญิง	227	3.78	187	2.22	37	0.80	150	1.37	203	6.78	804	2.43
การรักษาทางศัลยกรรม และอายุกรรมที่เป็นเหตุให้เกิดปฏิกิริยาผิดปกติในผู้ป่วย หรือมีอาการแทรกซ้อนภายหลัง โดยไม่มีการกล่าวถึงความผิดพลาดขณะดำเนินการ (Y83-Y84) Surgical and other medical procedures as the cause of abnormal reaction of the patient, or of later complication, without mention of misadventure at the time of the procedure	รวม	4,276	36.13	4,044	24.58	2,213	24.13	7,535	34.55	1,840	32.34	19,908	30.65
	ชาย	2441	41.91	2264	28.27	1287	28.46	4227	38.88	972	36.06	11191	35.06
	หญิง	1,835	30.52	1,780	21.09	926	19.92	3,308	30.24	868	28.99	8,717	26.39

ตาราง 23 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน ตามกลุ่มสาเหตุภายนอกของการบาดเจ็บ จำแนกเพศ รายภาค/กรุงเทพมหานคร ตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 พ.ศ.2557 (ต่อ)

กลุ่มสาเหตุภายนอกของการบาดเจ็บ	เพศ	ภาคเหนือ		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.)		ภาคใต้		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพมหานคร		รวมทั้งประเทศ	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
ผลระยะล่าช้าจากสาเหตุภายนอกของการป่วยและตาย (Y85-Y89)	รวม	370	3.13	199	1.21	293	3.20	539	2.47	55	0.97	1,456	2.24
Sequelae of external causes of morbidity and mortality	ชาย	245	4.21	131	1.64	175	3.87	338	3.11	40	1.48	929	2.91
	หญิง	125	2.08	68	0.81	118	2.54	201	1.84	15	0.50	527	1.60
ปัจจัยเสริมที่มีความเกี่ยวข้องกับสาเหตุการป่วยและตายที่ระบุไว้แล้ว	รวม	173	1.46	186	1.13	88	0.96	335	1.54	57	1.00	839	1.29
ที่อื่น (Y90-Y98)	ชาย	120	2.06	114	1.42	74	1.64	247	2.27	47	1.74	602	1.89
Supplementary factors related to causes of morbidity and mortality classified elsewhere	หญิง	53	0.88	72	0.85	14	0.30	88	0.80	10	0.33	237	0.72

รวบรวม / วิเคราะห์ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน สวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการและครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สภส.)

ภาคผนวก



ผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (21กลุ่มโรค)

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค)	รหัสโรค
01	โรคติดเชื้อและปรสิตอื่น ๆ Certain infectious and parasitic diseases	A00 - A99 B00 - B99
02	เนื้องอก (รวมมะเร็ง) Neoplasms	C00 - C97 D00 - D48
03	โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน Diseases of the blood and blood forming organs and certain disorders involving the immune mechanism	D50 - D89
04	โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมแทบอลิซึม Endocrine, nutritional and metabolic diseases	E00 - E90
05	ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม Mental and behavioural disorders	F00 - F99
06	โรกระบบประสาท Diseases of the nervous system	G00 - G99
07	โรคตาบางส่วนประกอบของตา Diseases of the eye and adnexa	H00 - H59
08	โรคหูและปุ่มกกหู Disease of the ear and mastoid process	H60 - H95
09	โรกระบบไหลเวียนเลือด Diseases of the circulatory system	I00 - I99
10	โรกระบบหายใจ Diseases of the respiratory system	J00 - J99
11	โรกระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก Diseases of the digestive system	K00 - K93

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค)	รหัสโรค
12	โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง Diseases of the skin and subcutaneous tissue	L00 - L99
13	โรกระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อเยื่อเสริม Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue	M00 - M99
14	โรกระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ Diseases of the genitourinary system	N00 - N99
15	ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด Complication of pregnancy, childbirth and the puerperium	O00 - O99 ยกเว้น O80 O84
16	ภาวะผิดปกติของทารกแรกเกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด (อายุครรภ์ 22 สัปดาห์ขึ้นไป จนถึง 7 วันหลังคลอด) Certain conditions originating in the perinatal period	P00 - P96
17	รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กำเนิดและโครโมโซมผิดปกติ Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities	Q00 - Q99
18	อาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นๆ ได้ Symptoms, signs and abnormal clinical and labooratory findings, not elsewhere classified	R00 - R99
19	การเป็นพิษและผลที่ตามมา Poisoning, toxic effect, and their sequelae	X40 - X49 X60 - X69 X85 - X90 Y10 - Y19
20	อุบัติเหตุจากการขนส่ง และผลที่ตามมา Transport accidents and their sequelae	V01 - V99, Y85

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค)	รหัสโรค
21	สาเหตุภายนอกอื่น ๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตาย	W00 - W99
	Other external causes of morbidity and mortality (eg: accidents, injuries,	X00 - X19
	intentional self-harm, assault, animals and plants, complications of medical and	X20 - X29
	surgical care and other unspecified causes)	X30 - X39
		X50 - X59
		X70 - X84
		X91 - X99
		Y00 - Y09
		Y20 - Y36
		Y40 - Y84
		Y86 - Y89

- หมายเหตุ - รหัส S00-T98 ไม่ใช้รายงานนี้ เพราะให้ใช้รหัส V01-V89 แล้ว
- กลุ่มโรคลำดับที่ 19 ไม่รวมการถูกพิษจากสัตว์และพืช
 - ประมวลผลจากฐานข้อมูลผู้ป่วยนอกรายบุคคล 21 แฟ้ม สำนักรับนโยบายและยุทธศาสตร์

Tabulation list for morbidity (ตารางสาเหตุการป่วย)

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค)	รหัสโรค
001	Cholera อหิวาตกโรค	A00
002	Typhoid and paratyphoid fevers ไข้รากสาดน้อยและไข้รากสาดเทียม	A01
003	Shigellosis โรคบิดจากเชื้อชิเกลลา	A03
004	Amoebiasis โรคบิดมีตัว	A06
005	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ	A09
006	Other intestinal infectious diseases โรคลำไส้อักเสบอื่น ๆ	A02, A04-A05, A07-A08
007	Respiratory tuberculosis วัณโรคทางเดินหายใจ	A15-A16
008	Other tuberculosis วัณโรคอื่น ๆ	A17-A19
009	Plague กาฬโรค	A20
010	Brucellosis โรคติดเชื้อบรูเซลลา	A23
011	Leprosy โรคเรื้อน	A30
012	Tetanus neonatorum บาดทะยักในเด็กแรกเกิด	A33
013	Other tetanus บาดทะยักอื่น ๆ	A34-A35
014	Diphtheria โรคคอตีบ	A36
015	Whooping cough โรคไอกรน	A37
016	Meningococcal infection การติดเชื้อเมนิงโกคอคคัส	A39

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค)	รหัสโรค
017	Septicaemia โลหิตเป็นพิษ	A40-A41
018	Other bacterial diseases โรคจากแบคทีเรียอื่น ๆ	A21-A22, A24-A28, A31-A32, A38, A42-A49
019	Congenital syphilis ซิฟิลิสแต่กำเนิด	A50
020	Early syphilis ซิฟิลิสระยะเริ่ม	A51
021	Other syphilis ซิฟิลิสอื่น ๆ	A52-A53
022	Gonococcal infection การติดเชื้อหนองใน	A54
023	Sexually transmitted chlamydial diseases โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จากเชื้อคลามัยเดีย	A55-A56
024	Other infections with a predominantly sexual mode of transmission โรคติดเชื้ออื่น ๆ ที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นส่วนใหญ่	A57-A64
025	Relapsing fevers โรคไขกลับซ้ำ	A68
026	Trachoma โรคสีดวงตา	A71
027	Typhus fever ไข้รากสาดใหญ่	A75
028	Acute poliomyelitis โรคโปลิโอเฉียบพลัน	A80
029	Rabies โรคพิษสุนัขบ้า	A82
030	Viral encephalitis สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส	A83-A86
031	Yellow fever ไข้เหลือง	A95
032	Other arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers ไข้จากไวรัสที่นำโดยแมลงและไข้เลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่น ๆ	A90-A94, A96-A99

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค)	รหัสโรค
033	Herpesviral infections เริม	B00
034	Varicella and zoster อีสุกอีใสและงูสวัด	B01-B02
035	Measles หัด	B05
036	Rubella หัดเยอรมัน	B06
037	Acute hepatitis B ตับอักเสบเฉียบพลันชนิดบี	B16
038	Other viral hepatitis ตับอักเสบจากไวรัสอื่น ๆ	B15, B17-B19
039	Human immunodeficiency virus [HIV] disease ภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากไวรัส (HIV)	B20-B24
040	Mumps คางทูม	B26
041	Other viral diseases โรคจากไวรัสอื่น	A81, A87-A89, B03-B04, B07-B09, B25, B27-B34
042	Mycoses โรคติดเชื้อรา	B35-B49
043	Malaria มาลาเรีย	B50-B54
044	Leishmaniasis โรคไลชมาเนีย	B55
045	Trypanosomiasis โรคทริพาโนโซม	B56-B57
046	Schistosomiasis โรคติดเชื้อชิสโตโซม	B65
047	Other fluke infections โรคพยาธิใบไม้อื่น ๆ	B66
048	Echinococcosis โรคพยาธิเอคคิโนคอกคัส	B67

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค)	รหัสโรค
049	Dracunculiasis โรคพยาธิควั่นคุลัส	B72
050	Onchocerciasis โรคพยาธิออนโคเซอร์คา	B73
051	Filariasis โรคพยาธิฟิลาเรีย	B74
052	Hookworm diseases โรคพยาธิปากขอ	B76
053	Other helminthiasis โรคพยาธิตัวตืดอื่น ๆ	B68-B71, B75, B77-B83
054	Sequelae of tuberculosis ผลตามหลังวัณโรค	B90
055	Sequelae of poliomyelitis ผลตามหลังโรคโปลิโอ	B91
056	Sequelae of leprosy ผลตามหลังโรคเรื้อน	B92
057	Other infectious and parasitic diseases โรคติดเชื้อและปรสิตอื่น ๆ	A65-A67, A69-A70, A74, A77-A79, B58-B64, B85-B89, B94, B99
058	Malignant neoplasm of lip, oral cavity and pharynx เนื้องอกร้ายของริมฝีปาก ช่องปากและคอหอย	C00-C14
059	Malignant neoplasm of oesophagus เนื้องอกร้ายที่หลอดอาหาร	C15
060	Malignant neoplasm of stomach เนื้องอกร้ายที่กระเพาะอาหาร	C16
061	Malignant neoplasm of colon เนื้องอกร้ายของลำไส้ใหญ่	C18
062	Malignant neoplasm of rectosigmoid junction, rectum, anus and anal canal เนื้องอกร้ายที่รอยต่อลำไส้ใหญ่เร็คตัมและซิกมอยด์ เร็คตัม ทวารหนักและช่องทวารหนัก	C19-C21
063	Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts เนื้องอกร้ายที่ตับและท่อน้ำดีในตับ	C22

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค)	รหัสโรค
064	Malignant neoplasm of pancreas เนื้องอกร้ายที่ตับอ่อน	C25
065	Other malignant neoplasms of digestive organs เนื้องอกร้ายที่อวัยวะย่อยอาหารอื่น ๆ	C17, C23-C24, C26
066	Malignant neoplasms of larynx เนื้องอกร้ายที่กล่องเสียง	C32
067	Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung เนื้องอกร้ายที่หลอดคอ หลอดลม และปอด	C33-C34
068	Other malignant neoplasms of respiratory and intrathoracic organs เนื้องอกร้ายที่อวัยวะหายใจและอวัยวะที่ช่องอก	C30-C31, C37-C39
069	Malignant neoplasm of bone and articular cartilage เนื้องอกร้ายที่กระดูกและกระดูกอ่อนผิวข้อ	C40-C41
070	Malignant melanoma of skin เนื้องอกร้ายที่เมลาโนมาของผิวหนัง	C43
071	Other malignant neoplasms of skin เนื้องอกร้ายที่ผิวหนังอื่น ๆ	C44
072	Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue เนื้องอกร้ายที่เมโสซีเรียลและเนื้อเยื่ออ่อน	C45-C49
073	Malignant neoplasm of breast เนื้องอกร้ายที่เต้านม	C50
074	Malignant neoplasm of cervix uteri เนื้องอกร้ายที่ปากมดลูก	C53
075	Malignant neoplasm of other and unspecified parts of uterus เนื้องอกร้ายอื่น ๆ ที่มีได้ระบุส่วนของมดลูก	C54-C55
076	Other malignant neoplasms of female genital organs เนื้องอกร้ายของอวัยวะสืบพันธุ์หญิง	C51-C52, C56-C58
077	Malignant neoplasm of prostate เนื้องอกร้ายที่ต่อมลูกหมาก	C61
078	Other malignant neoplasms of male genital organs เนื้องอกร้ายของอวัยวะสืบพันธุ์ชาย	C60, C62-C63
079	Malignant neoplasm of bladder เนื้องอกร้ายที่กระเพาะปัสสาวะ	C67

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค)	รหัสโรค
080	Other malignant neoplasm of urinary tract เนื้องอกร้ายอื่น ๆ ที่ท่อปัสสาวะ	C64-C66, C68
081	Malignant neoplasm of eye and adnexa เนื้องอกร้ายของตาและส่วนประกอบ	C69
082	Malignant neoplasm of brain เนื้องอกร้ายของสมอง	C71
083	Malignant neoplasm of other parts of central nervous system เนื้องอกร้ายที่ส่วนอื่น ๆ ของระบบประสาทส่วนกลาง	C70, C72
084	Malignant neoplasm of other, ill-defined, secondary, unspecified and multiple sites เนื้องอกอื่น ๆ และที่ไม่ทราบสาเหตุ เนื้องอกทุติยภูมิที่มีได้ระบุรายละเอียด และเกิดขึ้นหลายแห่ง	C73-C80, C97
085	Hodgkin's disease โรคฮอดกินส์	C81
086	Non-Hodgkin's lymphoma เนื้องอกร้ายลิมโฟมาที่มีโรคฮอดกินส์	C82-C85
087	Leukaemia ลิวคีเมีย	C91-C95
088	Other malignant neoplasms of lymphoid, haematopoietic and related tissue เนื้องอกร้ายอื่น ๆ ของลิมโฟยด์อื่น ๆ ระบบสร้างเม็ดเลือดและเนื้อเยื่อ	C88-C90, C96
089	Carcinoma in situ of cervix uteri มะเร็งจำกัดเฉพาะที่ของปากมดลูก	D06
090	Benign neoplasm of skin เนื้องอกไม่ร้ายของผิวหนัง	D22-D23
091	Benign neoplasm of breast เนื้องอกไม่ร้ายของเต้านม	D24
092	Leiomyoma of uterus ไลโอไมโอมาที่มดลูก	D25
093	Benign neoplasm of ovary เนื้องอกไม่ร้ายที่รังไข่	D27
094	Benign neoplasm of urinary organs เนื้องอกไม่ร้ายที่ระบบปัสสาวะ	D30

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค)	รหัสโรค
095	Benign neoplasm of brain and other parts of central nervous system เนื้องอกไม่ร้ายของสมองและส่วนอื่นของระบบประสาทส่วนกลาง	D33
096	Other in situ and benign neoplasms and neoplasms of uncertain and unknown behaviour เนื้องอกไม่ร้ายจำกัดเฉพาะที่อื่น ๆ และเนื้องอกบางชนิดที่ไม่ทราบพฤติกรรม	D00-D05, D07-D21, D26, D28-D29, D31-D32, D34-D48
097	Iron deficiency anaemia โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก	D50
098	Other anaemias โลหิตจางอื่น ๆ	D51-D64
099	Haemorrhagic conditions and other diseases of blood and blood - forming organs ภาวะเลือดออกอื่น ๆ โรคเลือดและอวัยวะที่สร้างเลือด	D65-D77
100	Certain disorders involving the immune mechanism ความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับกลไกของภูมิคุ้มกัน	D80-D89
101	Iodine-deficiency-related thyroid disorders การขาดไอโอดีนที่มีความสัมพันธ์กับต่อมธัยรอยด์	E00-E02
102	Thyrotoxicosis โรคพิษธัยรอยด์	E05
103	Other disorders of thyroid ความผิดปกติของต่อมธัยรอยด์อื่น ๆ	E03-E04, E06-E07
104	Diabetes mellitus เบาหวาน	E10-E14
105	Malnutrition ทุพโภชนาการ	E40-E46
106	Vitamin A deficiency การขาดวิตามินเอ	E50
107	Other vitamin deficiencies การขาดวิตามินอื่น ๆ	E51-E56
108	Sequelae of malnutrition and other nutritional deficiencies ผลที่ตามมาของภาวะทุพโภชนาการและภาวะพร่องโภชนาการอื่น ๆ	E64
109	Obesity โรคอ้วน	E66

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค)	รหัสโรค
110	Volume depletion การขาดปริมาณของเหลวในร่างกาย	E86
111	Other endocrine, nutritional and metabolic disorders ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิซึมอื่น ๆ	E15-E35, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E90
112	Dementia สมองเสื่อม	F00-F03
113	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol ความผิดปกติของพฤติกรรมและจิตประสาทที่เกิดจากการเสพแอลกอฮอล์	F10
114	Mental and behavioural disorders due to other psychoactive substance use ความผิดปกติทางพฤติกรรมและจิตประสาทที่เกิดจากการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทอื่น ๆ	F11-F19
115	Schizophrenia, schizotypal, and delusional disorders จิตเภท พฤติกรรมแบบจิตเภทและความหลงผิด	F20-F29
116	Mood [affective] disorders ความผิดปกติทางอารมณ์	F30-F39
117	Neurotic, stress-related, and somatoform disorders โรคประสาท อาการทางกายที่เกิดจากจิตใจและความเครียด	F40-F48
118	Mental retardation ภาวะปัญญาอ่อน	F70-F79
119	Other mental and behavioural disorders ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมอื่น ๆ	F04-F09, F50-F69, F80-F99
120	Inflammatory diseases of the central nervous system การอักเสบของระบบประสาทส่วนกลาง	G00-G09
121	Parkinson's disease โรคพาคินสัน	G20
122	Alzheimer's disease โรคอัลไซเมอร์	G30
123	Multiple sclerosis มัลติเปิล สเคลอโรสิส	G35
124	Epilepsy ลมบ้าหมู	G40-G41

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค)	รหัสโรค
125	Migraine and other headache syndromes โรคไมเกรนและกลุ่มอาการปวดศีรษะอื่น ๆ	G43-G44
126	Transient cerebral ischaemic attacks and related syndromes โรคเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยชั่วคราวและกลุ่มอาการต่อเนื่อง	G45
127	Nerve, nerve root and plexus disorders ความผิดปกติของเส้นประสาท รากประสาทและปมประสาท	G50-G59
128	Cerebral palsy and other paralytic syndromes สมองพิการและกลุ่มอาการอัมพาตอื่น ๆ	G80-G83
129	Other diseases of the nervous system โรคของระบบประสาทอื่น ๆ	G10-G13, G21-G26, G31-G32, G36-G37, G46-G47, G60-G73, G90-G99
130	Inflammation of eyelid การอักเสบของหนังตา	H00-H01
131	Conjunctivitis and other disorders of conjunctiva เยื่อบุตาอักเสบและความผิดปกติของเยื่อบุตาอื่น ๆ	H10-H13
132	Keratitis and other disorders of sclera and cornea กระจกตาอักเสบและความผิดปกติของตาขาวและกระจกตาอื่น ๆ	H15-H19
133	Cataract and other disorders of lens ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ	H25-H28
134	Retinal detachments and breaks จอประสาทตาหลุดออกและรอยฉีกของจอประสาทตา	H33
135	Glaucoma ต้อหิน	H40-H42
136	Strabismus ตาเหล่	H49-H50
137	Disorders of refraction and accommodation ความผิดปกติของสายตาและการเพ่งมอง	H52
138	Blindness and low vision ตาบอดและสายตาเลือนลาง	H54
139	Other diseases of the eye and adnexa โรคของตาและส่วนประกอบของตาอื่น ๆ	H02-H06, H20-H22, H30-H32, H34-H36, H43-H48, H51, H53, H55-H59

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค)	รหัสโรค
140	Otitis media and other disorders of middle ear and mastoid หูชั้นกลางอักเสบและความผิดปกติของหูชั้นกลางและปุ่มกกหูอื่น ๆ	H65-H75
141	Hearing loss การสูญเสียการได้ยิน	H90-H91
142	Other diseases of the ear and mastoid process โรคของหูและปุ่มกกหูอื่น ๆ	H60-H62, H80-H83, H92-H95
143	Acute rheumatic fever ไข้รูมาติกเฉียบพลัน	I00-I02
144	Chronic rheumatic heart disease โรคหัวใจรูมาติกเรื้อรัง	I05-I09
145	Essential (primary) hypertension ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุ	I10
146	Other hypertensive diseases โรคความดันโลหิตสูงอื่น ๆ	I11-I15
147	Acute myocardial infarction กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน	I21-I22
148	Other ischaemic heart diseases โรคหัวใจขาดเลือดอื่น ๆ	I20, I23-I25
149	Pulmonary embolism ก้อนเลือดอุดตันในหลอดเลือดใหญ่ของปอด	I26
150	Conduction disorders and cardiac arrhythmias ความผิดปกติของการนำกระแสไฟฟ้าหัวใจและหัวใจเต้นผิดจังหวะ	I44-I49
151	Heart failure หัวใจล้มเหลว	I50
152	Other heart diseases โรคหัวใจอื่น ๆ	I27-I43, I51-I52
153	Intracranial haemorrhage เลือดออกในสมอง	I60-I62
154	Cerebral infarction เนื้อสมองตาย	I63
155	Stroke, not specified as haemorrhage or infarction เป็นลมหมดสติที่ไม่จัดกลุ่มว่าเป็นจากเลือดออกในสมองหรือเนื้อสมองตาย จากการขาดเลือด	I64

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค)	รหัสโรค
156	Other cerebrovascular diseases โรคหลอดเลือดในสมองอื่น ๆ	I65-I69
157	Atherosclerosis อะเทโรสเคลอโรซิส	I70
158	Other peripheral vascular diseases โรคหลอดเลือดส่วนปลายอื่น ๆ	I73
159	Arterial embolism and thrombosis ลิ่มเลือดและก้อนเลือดอุดตันที่หลอดเลือดแดง	I74
160	Other diseases of arteries, arterioles and capillaries โรคของหลอดเลือดแดง หลอดเลือดแดงย่อยและแคปิลลารีอื่น ๆ	I71-I72, I77-I79
161	Phlebitis, thrombophlebitis, venous embolism and thrombosis หลอดเลือดดำอักเสบ หลอดเลือดดำอักเสบมีลิ่มเลือดก้อนเลือดและลิ่มเลือด ในหลอดเลือดดำ	I80-I82
162	Varicose veins of lower extremities หลอดเลือดดำขอดของระยางส่วนล่าง	I83
163	Haemorrhoids ริดสีดวงทวาร	I84
164	Other diseases of the circulatory system โรคอื่น ๆ ของระบบไหลเวียนโลหิต	I85-I99
165	Acute pharyngitis and acute tonsillitis คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน	J02-J03
166	Acute laryngitis and tracheitis กล่องเสียงและหลอดลมใหญ่อักเสบเฉียบพลัน	J04
167	Other acute upper respiratory infections การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ	J00-J01, J05-J06
168	Influenza ไข้หวัดใหญ่	J10-J11
169	Pneumonia ปอดบวม	J12-J18
170	Acute bronchitis and acute bronchiolitis หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน	J20-J21
171	Chronic sinusitis ไซนัสอักเสบเรื้อรัง	J32

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค)	รหัสโรค
172	Other diseases of nose and nasal sinuses โรคอื่นของจมูกและไซนัส	J30-J31, J33-J34
173	Chronic disease of tonsils and adenoids โรคเรื้อรังของต่อมทอนซิลและต่อมน้ำเหลืองในคอ	J35
174	Other diseases of upper respiratory tract โรคอื่น ๆ ของระบบหายใจส่วนบน	J36-J39
175	Bronchitis, emphysema and other chronic obstructive pulmonary diseases โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น	J40-J44
176	Asthma โรคหืด	J45-J46
177	Bronchiectasis โรคหลอดลมเล็กโป่งพอง	J47
178	Pneumoconiosis โรคฝุ่นสะสมในปอด	J60-J65
179	Other diseases of the respiratory system โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินหายใจ	J22, J66-J99
180	Dental caries ฟันผุ	K02
181	Other disorders of teeth and supporting structures ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง	K00-K01, K03-K08
182	Other diseases of the oral cavity, salivary glands and jaws โรคอื่น ๆ ของช่องปาก ต่อมน้ำลายและขากรรไกร	K09-K14
183	Gastric and duodenal ulcer แผลเปื่อยของกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น	K25-K27
184	Gastritis and duodenitis กระเพาะอาหารอักเสบและลำไส้เล็กส่วนต้นอักเสบ	K29
185	Other diseases of oesophagus, stomach and duodenum โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและลำไส้เล็กส่วนต้น	K20-K23, K28, K30-K31
186	Diseases of appendix โรคของไส้ติ่ง	K35-K38
187	Inguinal hernia ไส้เลื่อนที่บริเวณขาหนีบ	K40

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค)	รหัสโรค
188	Other hernia ไส้เลื่อนอื่น ๆ	K41-K46
189	Crohn's disease and ulcerative colitis โรคโครห์นและลำไส้ใหญ่อักเสบแผลเป็น	K50-K51
190	Paralytic ileus and intestinal obstruction without hernia ลำไส้ไม่ทำงานและลำไส้เกิดอุดตันแบบไม่มีไส้เลื่อน	K56
191	Diverticular disease of intestine โรคถุงเนื้อของลำไส้	K57
192	Other diseases of intestines and peritoneum โรคอื่น ๆ ของลำไส้และเยื่อช่องท้อง	K52-K55, K58-K67
193	Alcoholic liver disease โรคตับเกี่ยวกับแอลกอฮอล์	K70
194	Other diseases of liver โรคอื่น ๆ ของตับ	K71-K77
195	Cholelithiasis and cholecystitis โรคนิ่วในระบบน้ำดีและถุงน้ำดีอักเสบ	K80-K81
196	Acute pancreatitis and other diseases of the pancreas ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันและโรคอื่น ๆ ของตับอ่อน	K85-K86
197	Other diseases of the digestive system โรคอื่น ๆ ของระบบย่อยอาหาร	K82-K83, K87-K93
198	Infections of the skin and subcutaneous tissue โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	L00-L08
199	Other diseases of the skin and subcutaneous โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	L10-L99
200	Rheumatoid arthritis and other inflammatory polyarthropathies ข้ออักเสบรูมาตอยด์และข้ออักเสบหลายข้อ	M05-M14
201	Arthrosis โรคข้อเสื่อม	M15-M19
202	Acquired deformities of limbs ความพิการของแขนขา	M20-M21
203	Other disorders of joints ความผิดปกติอื่น ๆ ของข้อ	M00-M03, M22-M25
204	Systemic connective tissue disorders ความผิดปกติของระบบเนื้อเยื่อประสาน	M30-M36

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค)	รหัสโรค
205	Cervical and other intervertebral disc disorders กระดูกสันหลังและหมอนรองกระดูกสันหลังอื่น ๆ ผิดปกติ	M50-M51
206	Other dorsopathies พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ	M40-M49, M53-M54
207	Soft tissue disorders เนื้อเยื่อผิดปกติ	M60-M79
208	Disorders of bone density and structure ความผิดปกติของความหนาแน่นของเนื้อกระดูกและโครงสร้าง	M80-M85
209	Osteomyelitis กระดูกอักเสบ	M86
210	Other diseases of the musculoskeletal system and connective tissue โรคอื่น ๆ ของระบบกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อประสาน	M87-M99
211	Acute and rapidly progressive nephritic syndromes กลุ่มอาการไตอักเสบเฉียบพลันและชนิดกำเริบเร็ว	N00-N01
212	Other glomerular diseases โรคของหน่วยไตอื่น ๆ	N02-N08
213	Renal tubulo-interstitial diseases โรคของท่อและเนื้อเยื่อระหว่างท่อในไต	N10-N16
214	Renal failure ไตวาย	N17-N19
215	Urolithiasis นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ	N20-N23
216	Cystitis กระเพาะปัสสาวะอักเสบ	N30
217	Other diseases of the urinary system โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะ	N25-N29, N31-N39, N40
218	Hyperplasia of prostate ต่อมลูกหมากโตจากการเพิ่มจำนวนเซลล์	
219	Other disorders of prostate ความผิดปกติอื่น ๆ ของต่อมลูกหมาก	N41-N42
220	Hydrocele and spermatocele ถุงน้ำและถุงที่มีอสุจิที่อัณฑะ	N43

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค)	รหัสโรค
221	Redundant prepuce, phimosis and paraphimosis หนังหุ้มปลายองคชาตยาวเกินไป ปลายติบรูเปิดไม่ได้หรือเปิดลำบาก	N47
222	Other diseases of male genital organs โรคอื่น ๆ ของอวัยวะสืบพันธุ์ชาย	N44-N46, N48-N51
223	Disorders of the breast ความผิดปกติของเต้านม	N60-N64
224	Salpingitis and oophoritis ปีกมดลูกและรังไข่อักเสบ	N70
225	Inflammatory disease of cervix uteri ปากมดลูกอักเสบ	N72
226	Other inflammatory diseases of female pelvic organs การอักเสบอื่น ๆ ของอวัยวะในอุ้งเชิงกรานสตรี	N71, N73-N77
227	Endometriosis เยื่อบุมดลูกอยู่ผิดที่	N80
228	Female genital prolapse การหย่อนตัวของอวัยวะสืบพันธุ์สตรี	N81
229	Noninflammatory disorders of ovary, fallopian tube and broad ligament ความผิดปกติอื่นที่ไม่ใช่การอักเสบของรังไข่ท่อรังไข่และเอ็นยึดมดลูก	N83
230	Disorders of menstruation ความผิดปกติของระดู	N91-N92
231	Menopausal and other perimenopausal disorders การหมดประจำเดือนและความผิดปกติอื่นในระยะหมดประจำเดือน	N95
232	Female infertility ภาวะมีบุตรยากในสตรี	N97
233	Other disorders of genitourinary tract ความผิดปกติอื่น ๆ ของท่อทางเดินปัสสาวะและสืบพันธุ์	N82, N84-N90, N93-N94, N96, N98-N99
234	Spontaneous abortion แท้งเอง	O03
235	Medical abortion การทำแท้งโดยเหตุผลทางการแพทย์	O04
236	Other pregnancies with abortive outcome การตั้งครรภ์อื่น ๆ ที่สิ้นสุดโดยการแท้ง	O00-O02, O05-O08

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค)	รหัสโรค
237	Oedema, proteinuria and hypertensive disorders in pregnancy, childbirth and the puerperium การบวม การมีโปรตีนในปัสสาวะ และความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ระยะคลอด และระยะหลังคลอด	O10-O16
238	Placenta praevia, premature separation of placenta and antepartum haemorrhage รกเกาะต่ำ รกลอกตัวก่อนกำหนด และตกเลือดก่อนคลอด	O44-O46
239	Other maternal care related to fetus and amniotic cavity and possible delivery problems การดูแล มารดาอื่น ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ์ และถุงน้ำคร่ำ และปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในระยะคลอด	O30-O43, O47-O48
240	Obstructed labour การคลอดติดขัด	O64-O66
241	Postpartum haemorrhage ตกเลือดหลังคลอด	O72
242	Other complications of pregnancy and delivery ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ของการตั้งครรภ์ และการคลอด	O20-O29, O60-O63, O67-O71, O73-O75, O81-O84
243	Single spontaneous delivery การคลอดของครรภ์เดียว	O80
244	Complications predominantly related to the puerperium and other obstetric conditions, not elsewhere classified ภาวะแทรกซ้อนที่ส่วนใหญ่พบในระยะหลังคลอด และภาวะทางสูติกรรมอื่น ๆ ที่มิได้ระบุรายละเอียด	O85-O99
245	Fetus and newborn affected by maternal factors and by complications of pregnancy, labour and delivery ทารกในครรภ์และแรกเกิดที่ได้รับผลจากปัจจัยทางมารดา และโรคแทรกใน ระยะตั้งครรภ์ เจ็บครรภ์ และคลอด	P00-P04
246	Slow fetal growth, fetal malnutrition and disorders related to short gestation and low birth weight ทารกในครรภ์โตช้า ทารกในครรภ์ขาดสารอาหาร และความผิดปกติเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ระยะสั้นและน้ำหนักทารกแรกเกิดน้อย	P05-P07

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค)	รหัสโรค
247	Birth trauma บาดเจ็บจากการคลอด	P10-P15
248	Intrauterine hypoxia and birth asphyxia ขาดออกซิเจนขณะอยู่ในโพรงมดลูก และภาวะแอสฟิกเซียเมื่อแรกเกิด	P20-P21
249	Other respiratory disorders originating in the perinatal period ภาวะหายใจผิดปกติอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด	P22-P28
250	Congenital infectious and parasitic diseases การติดเชื้อแต่กำเนิดและโรคปรสิต	P35-P37
251	Other infections specific to the perinatal period การติดเชื้อเฉพาะอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด	P38-P39
252	Haemolytic disease of fetus and newborn โรคเม็ดเลือดแดงของทารกในครรภ์และแรกเกิด	P55
253	Other conditions originating in the perinatal period ภาวะอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด	P08, P29, P50-P54, P56-P96
254	Spina bifida กระดูกสันหลังแยก	Q05
255	Other congenital malformations of the nervous system ความผิดปกติอื่น ๆ แต่กำเนิดของระบบประสาท	Q00-Q04, Q06-Q07
256	Congenital malformations of the circulatory system ความผิดปกติแต่กำเนิดของระบบไหลเวียนโลหิต	Q20-Q28
257	Cleft lip and cleft palate ปากแหว่งและเพดานโหว่	Q35-Q37
258	Absence, atresia and stenosis of small intestine ลำไส้เล็กไม่มี ตันและตีบ	Q41
259	Other congenital malformations of the digestive system ความผิดปกติแต่กำเนิดอื่น ๆ ของระบบย่อยอาหาร	Q38-Q40, Q42-Q45
260	Undescended testicle อัณฑะไม่ลงถุง	Q53
261	Other malformations of the genitourinary system ความผิดปกติอื่น ๆ ของระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ	Q50-Q52, Q54-Q64
262	Congenital deformities of hip ความพิการแต่กำเนิดของสะโพก	Q65
263	Congenital deformities of feet ความพิการแต่กำเนิดของเท้า	Q66

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค)	รหัสโรค
264	Other congenital malformations and deformations of the musculoskeletal system ความผิดปกติและความพิการแต่กำเนิดอื่น ๆ ของระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง	Q67-Q79
265	Other congenital malformations ความผิดปกติแต่กำเนิดอื่น ๆ	Q10-Q18, Q30-Q34, Q80-Q89
266	Chromosomal abnormalities, not elsewhere classified ความผิดปกติของโครโมโซมที่ไม่ได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น	Q90-Q99
267	Abdominal and pelvic pain ปวดท้องและปวดอุ้งเชิงกราน	R10
268	Fever of unknown origin ไข้ไม่ทราบสาเหตุ	R50
269	Senility ชราภาพ	R54
270	Other symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจทางคลินิกและตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ไม่ได้มีรหัสระบุไว้	R00-R09, R11-R49, R51-R53, R55-R99
271	Fracture of skull and facial bones กระดูกแตกหักบริเวณกะโหลกศีรษะและกระดูกหน้า	S02
272	Fracture of neck, thorax or pelvis กระดูกคอ กระดูกซี่โครง หรือกระดูกเชิงกรานหัก	S12, S22, S32, T08
273	Fracture of femur กระดูกต้นขา แตก หัก ร้าว	S72
274	Fractures of other limb bones กระดูกแตกหักของแขนขาอื่น ๆ	S42, S52, S62, S82, S92, T10, T12
275	Fractures involving multiple body regions กระดูกแตกหักหลายบริเวณในร่างกาย	T02
276	Dislocations, sprains and strains of specified and multiple body regions กระดูกเคลื่อน เคล็ด ชัด บริเวณร่างกายหลายแห่งที่ระบุเฉพาะ	S03, S13, S23, S33, S43, S53, S63, S73, S83, S93, T03
277	Injury of eye and orbit การบาดเจ็บของตาและเบ้าตา	S05

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค)	รหัสโรค
278	Intracranial injury การบาดเจ็บภายในกะโหลกศีรษะ	S06
279	Injury of other internal organs การบาดเจ็บของอวัยวะภายในอื่น ๆ	S26-S27, S36-S37
280	Crushing injuries and traumatic amputations of specified and multiple body regions การบาดเจ็บจากการบดอัดและการบาดเจ็บที่เกิดจากการตัดขาดบริเวณร่างกายหลายแห่งที่ระบุเฉพาะ	S07-S08, S17-S18, S28, S38, S47-S48, S57-S58, S67-S68, S77-S78, S87-S88, S97-S98, T04-T05
281	Other injuries of specified, unspecified and multiple body regions การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย	S00-S01, S04, S09-S11, S14-S16, S19-S21, S24-S25, S29-S31, S34-S35, S39-S41, S44-S46, S49-S51, S54-S56, S59-S61, S64-S66, S69-S71, S74-S76, S79-S81, S84-S86, S89-S91, S94-S96, S99, T00-T01, T06-T07, T09, T11, T13-T14
282	Effects of foreign body entering through natural orifice ผลของวัตถุแปลกปลอมผ่านเข้าทางวารธรรมชาติของร่างกาย	T15-T19
283	Burns and corrosions แผลจากความร้อนและถูกสารกัดกร่อน	T20-T32
284	Poisoning by drugs and biological substances การเป็นพิษจากยา เครื่องยาและชีววัตถุ	T36-T50
285	Toxic effects of substances chiefly nonmedicinal as to source การเป็นพิษจากสารที่โดยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ใช้เป็นยา	T51-T65
286	Maltreatment syndrome กลุ่มอาการจากการทารุณ	T74

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค)	รหัสโรค
287	Other and unspecified effects of external causes อื่น ๆ และที่มีได้ระบุผลของสาเหตุภายนอก	T33-T35, T66-T73, T75-T78
288	Certain early complications of trauma and complications of surgical and medical care, not elsewhere classified ภาวะแทรกซ้อนระยะแรกของการบาดเจ็บบางชนิด และภาวะแทรกซ้อนของการรักษาทางศัลยกรรมและอายุรกรรมที่มีได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น	T79-T88
289	Sequelae of injuries, poisoning and of other consequences of external causes ผลระยะล่าของการบาดเจ็บ การเป็นพิษและผลที่ตามมาจากสาเหตุภายนอกอื่น ๆ	T90-T98
290	Persons encountering health services for examination and investigation บุคคลขอรับบริการเพื่อการตรวจและชันสูตร	Z00-Z13
291	Asymptomatic human immunodeficiency virus [HIV] infection status การติดเชื้อไวรัสโดยไม่มีอาการ	Z21
292	Other persons with potential health hazards related to communicable disease บุคคลที่มีอาการที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่อ	Z20, Z22-Z29
293	Contraceptive management การรับบริการคุมกำเนิด	Z30
294	Antenatal screening and other supervision of pregnancy การตรวจคัดกรองก่อนการคลอด และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งครรภ์อื่น ๆ	Z34-Z36
295	Liveborn infants according to place of birth การเกิดของทารกตามสถานที่เกิด	Z38
296	Postpartum care and examination การดูแลและการตรวจหลังคลอด	Z39
297	Persons encountering health services for specific procedures and health care บุคคลขอรับบริการสุขภาพ เพื่อหัตถการหรือการบริการสุขภาพที่ระบุเฉพาะ	Z40-Z54
298	Persons encountering health services for other reasons บุคคลขอรับบริการสุขภาพด้วยเหตุผลอื่น	Z31-Z33, Z37, Z55-Z99

Global Burden of Disease

รหัสโรค/กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค)
1.communicable,maternal ,perinatal and nutritional conditions	
A00-B99	โรคติดเชื้อและโรคปรสิตบางโรค
D50-D53	โลหิตจางจากการขาดสารอาหาร
D64	โลหิตจางแบบอื่น
E00	กลุ่มอาการขาดไอโอดีนแต่กำเนิด
E01	ความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ที่เกี่ยวกับการขาดไอโอดีนและภาวะสืบเนื่อง
E02	ภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยจากการขาดไอโอดีนระยะไม่ปรากฏอาการ
E40-E46	ภาวะทุพโภชนาการ
E50-E64	ภาวะขาดอาหารอื่น
G00	โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากแบคทีเรีย มีได้จำแนกไว้ที่ใด
G01	เยื่อหุ้มสมองอักเสบในโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่จำแนกไว้ที่อื่น
G02	เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากโรคติดเชื้อและโรคปรสิตที่จำแนกไว้ที่อื่น
G03	เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากสาเหตุอื่นและไม่ระบุสาเหตุ
G04	โรคสมองอักเสบ โรคไขสันหลังอักเสบ และโรคสมองกับไขสันหลังอักเสบ
H65	หูชั้นกลางอักเสบไม่เป็นหนอง
H66	หูชั้นกลางอักเสบแบบเป็นหนองและที่ไม่ระบุรายละเอียด
J00-J06	การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนเฉียบพลัน
J10	ไข้หวัดใหญ่ที่เกิดจากไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดอื่น
J11	ไข้หวัดใหญ่ ไม่ระบุชนิดไวรัส
J12	ปอดบวมที่เกิดจากไวรัส มีได้จำแนกไว้ที่ใด
J13	ปอดบวมที่เกิดจากสเตรปโตค็อกคัส นิวโมเนียอี
J14	ปอดบวมที่เกิดจากฮีโมฟิลัส อินฟลูเอนซา
J15	ปอดบวมที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย มีได้จำแนกไว้ที่ใด
J16	ปอดบวมที่เกิดจากเชื้ออื่น มีได้จำแนกไว้ที่ใด
J17	ปอดบวมในโรคที่จำแนกไว้ที่อื่น
J18	ปอดบวม ไม่ระบุเชื้อต้นเหตุ
J20-J22	การติดเชื้อเฉียบพลันแบบอื่นที่ทางเดินหายใจส่วนล่าง
N70	ท่อนำไข่อักเสบและรังไข่อักเสบ
N71	การอักเสบของมดลูก ยกเว้นปากมดลูก

รหัสโรค/กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค)
1.communicable,maternal ,perinatal and nutritional conditions (ต่อ)	
N72	การอักเสบของปากมดลูก
N73	การอักเสบแบบอื่นในอุ้งเชิงกรานสตรี
O00-O99	การตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด
P00-P96	ภาวะบางอย่างที่เริ่มต้นในระยะเวลาปริกำเนิด
2.noncommunicable diseases	
C00-D48	เนื้องอก
D55-D59	โลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงแตก
D60	ภาวะไม่มีการสร้างเฉพาะเม็ดเลือดแดงที่เกิดภายหลัง (อีริโทรบลาสโตพีเนีย)
D61	โลหิตจางจากไขกระดูกฝ่อแบบอื่น
D62	โลหิตจางหลังการเสียเลือดเฉียบพลัน
D63	โลหิตจางในโรคเรื้อรังที่จำแนกไว้ที่อื่น
D65-D69	ภาวะแข็งตัวของเลือดผิดปกติ จำเลือด และภาวะเลือดออกอื่น
D70-D77	โรคอื่นของเลือดและอวัยวะสร้างเลือด
D80-D89	ความผิดปกติบางอย่างของกลไกภูมิคุ้มกัน
E03	ภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยแบบอื่น
E04	คอพอกชนิดไม่เป็นพิษแบบอื่น
E05	ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ (ภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานมากเกินไป)
E06	ต่อมไทรอยด์อักเสบ
E07	ความผิดปกติอื่นของต่อมไทรอยด์
E10-E16	ตับอ่อน / อินซูลิน, กลูคาگون
E20-E21	ต่อมพาราไทรอยด์ / พาราไทรอยด์ฮอร์โมน
E22-E23	ต่อมใต้สมอง / เอ็ดเอช, ออกซิโทซิน, โกรท ฮอร์โมน, เอชทีเอช, ทีเอสเอช, แอลเอช, เอฟเอสเอช, โพรแล็กติน
E24-E27	ต่อมหมวกไต / อัลโดสเตอโรน, คอร์ติซอล, อีพินเฟริน, นอร์อีพินเฟริน
E28-E30	ต่อมเพศ / เอสโตรเจน, แอนโดรเจน, เทสโทสเตอโรน ฯลฯ
E31	การทำหน้าที่ผิดปกติของหลายต่อม
E32	โรคของต่อมไทมัส
E34	ความผิดปกติอื่นของต่อมไร้ท่อ
E65-E68	โรคอ้วนและภาวะโภชนาการเกิน

รหัสโรค/กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค)
2.noncommunicable diseases (ต่อ)	
E70-E79	ความผิดปกติทางเมตาบอลิกของโปรตีน ไชมัน และคาร์โบไฮเดรต
E80	ความผิดปกติของเมตาบอลิซึมของพอร์ไฟรินและบิลิรูบิน
E83	ความผิดปกติของเมตาบอลิซึมของแร่ธาตุ
E84	ซิสติก ไฟโบรซิส
E85	โรคแอมิลอยด์
E86	ของเหลวในร่างกายพร่อง
E87	ความผิดปกติอื่นของสารน้ำ อิเล็กโทรไลต์ และสมดุลกรดต่าง
E88	ความผิดปกติทางเมตาบอลิกแบบอื่น
E89	ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมหลังทำหัตถการ มิได้จำแนกไว้ที่ใด
F00-F99	ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรม
G06	ฝีและแกรนูโลมาในสมองและไขสันหลัง
G07	ฝีและแกรนูโลมาในสมองและไขสันหลังในโรคที่จำแนกไว้ที่อื่น
G08	หลอดเลือดดำอักเสบและหลอดเลือดดำอักเสบมีลิ่มเลือดในสมองและไขสันหลัง
G09	ผลที่ตามมาของโรคอักเสบของระบบประสาทส่วนกลาง
G10-G13	การฟ่อทั้งร่างกายที่ส่งผลเบื้องต้นต่อระบบประสาทส่วนกลาง
G20-G26	ความผิดปกติทางเอกซ์ตราพีระมิดและการเคลื่อนไหว
G30-G32	โรคเสื่อมอื่นของระบบประสาท
G35-G37	โรคเยื่อหุ้มไมอีลินของระบบประสาทส่วนกลางถูกทำลาย
G40-G47	ความผิดปกติที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวและเป็นพักๆ
G50-G59	ความผิดปกติของเส้นประสาท รากประสาท และข่ายประสาท
G60-G64	โรคเส้นประสาทหลายเส้นและความผิดปกติอื่นของระบบประสาทส่วนปลาย
G70-G73	โรคของกล้ามเนื้อและรอยต่อกล้ามเนื้อกับประสาท
G80-G83	อัมพาตสมองใหญ่และกลุ่มอาการอัมพาตอื่น
G90-G99	ความผิดปกติอื่นของระบบประสาท
H00-H59	โรคของตาและอวัยวะเคียงลูกตา
H60	หูชั้นนอกอักเสบ
H61	ความผิดปกติแบบอื่นที่หูชั้นนอก
H68	ท่อยูสเตเชียนอักเสบและอุดตัน
H69	ความผิดปกติแบบอื่นของท่อยูสเตเชียน
H70	โพรงกระดูกกหูอักเสบและภาวะที่เกี่ยวข้อง

รหัสโรค/กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค)
2.noncommunicable diseases (ต่อ)	
H71	ก้อนไคลของหูชั้นกลาง
H72	แก้วหูทะลุ
H73	ความผิดปกติแบบอื่นของแก้วหู
H74	ความผิดปกติแบบอื่นที่หูชั้นกลางและโพรงกระดูกกกหู
H75	ความผิดปกติแบบอื่นที่หูชั้นกลางและโพรงกระดูกกกหูในโรคที่จำแนกไว้ที่อื่น
H80-H83	โรคหูชั้นใน
H90-H95	ความผิดปกติแบบอื่นที่หู
I00-I99	ระบบไหลเวียนโลหิต
J30-J39	โรคแบบอื่นของทางเดินหายใจส่วนบน
J40-J47	โรคเรื้อรังของทางเดินหายใจส่วนล่าง
J60-J70	โรคปอดจากสารภายนอก
J80-J84	โรคแบบอื่นของระบบหายใจที่มีผลหลักต่อเนื้อปอด
J85-J86	ภาวะมีหนองและเนื้อตายที่ทางเดินหายใจส่วนล่าง
J90-J94	โรคเยื่อหุ้มปอดแบบอื่น
J95-J99	โรกระบบหายใจแบบอื่น
K00-K93	ระบบย่อยอาหาร
L00-L99	ผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
M00-M99	กล้ามเนื้อโครงร่างและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
N00-N08	โรคของโกลเมอรูลัส
N10-N16	โรคของหลอดไตฝอยและเนื้อเยื่อระหว่างหลอดไตฝอย
N17-N19	ไตวาย
N20-N23	นิ่วในทางเดินปัสสาวะ
N25-N29	ความผิดปกติอื่นของไตและท่อไต
N30-N39	โรคอื่นของระบบปัสสาวะ
N40-N51	โรคของอวัยวะสืบพันธุ์ชาย
N60-N64	ความผิดปกติของเต้านม
N75	โรคของต่อมบาร์โกลิน
N76	การอักเสบแบบอื่นของช่องคลอดและอวัยวะสืบพันธุ์สตรีด้านนอก
N77	แผลและการอักเสบที่ช่องคลอดและอวัยวะเพศสตรีด้านนอกในโรคที่ได้จำแนกไว้ที่อื่น
N80-N98	ความผิดปกติของอวัยวะสืบพันธุ์สตรีที่ไม่เกิดจากการอักเสบ

รหัสโรค/กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค)
------------------	-------------------------

2.noncommunicable diseases (ต่อ)

N99	ความผิดปกติแบบอื่นของระบบสืบพันธุ์และระบบปัสสาวะ
Q00-Q99	รูปพิการและความผิดปกติของโครโมโซม

3.injuries

S00-T98	การบาดเจ็บ การเป็นพิษ และอุบัติเหตุ
V01-Y98	สาเหตุภายนอก