



สรุปรายงานการป่วย

พ.ศ.2559



กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สรุปรายงานการป่วย พ.ศ. 2559

ที่ปรึกษา

นายแพทย์พงศธร พอกเพิ่มดี
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
แพทย์หญิงมานิตา พรรณวดี
รองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

คณะผู้จัดทำ

กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โทร 0 2590 1497
โทรสาร 0 2591 8627



สรุปรายงานการป่วย พ.ศ. 2559
จัดทำโดย: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2560
216 หน้า, ตาราง, แผนภูมิ
สถิติ - - เจ็บป่วย
สุขภาพ
การเจ็บป่วย



คำนำ

สรุปรายงานการป่วย พ.ศ. 2559 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลการรับบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน สำหรับใช้ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข และติดตามสถานการณ์ด้านสุขภาพของประชาชนนั้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลรายบุคคล ประกอบด้วย ฐานข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (43 แฟ้ม) จากหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และฐานข้อมูลการเบิกจ่ายเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์จาก 2 กองทุน ได้แก่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (ผ่านสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ) การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความชุก (Prevalence) ของการมารับบริการรักษาพยาบาลในสถานบริการ และการนำเสนอจำนวนและอัตราตามสาเหตุการป่วยรายกลุ่มโรค สาเหตุภายนอก ในระดับประเทศ ภูมิภาค และจังหวัด สามารถแยกตามเพศ และกลุ่มอายุ

ข้อมูลการป่วยที่นำเสนอในเอกสารนี้ ได้รับความร่วมมือ จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (ผ่านสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ) และ สถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล จึงขอขอบคุณหน่วยงานดังกล่าวข้างต้นมา ณ โอกาสนี้

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ธันวาคม 2560

สารบัญ	
คำนำ	
สารบัญ	ก
สารบัญตาราง	ข
สารบัญรูปภาพ	ง
บทนำ	1
ข้อมูลการป่วยของผู้ป่วยนอก	
- สถานการณ์ผู้ป่วยผู้ป่วยนอก	6
ข้อมูลการป่วยของผู้ป่วยใน	
- สถานการณ์ผู้ป่วยผู้ป่วยใน	14
- สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี	19
- สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยในเด็กกลุ่มอายุระหว่าง แรกเกิด-4 ปี	20
- สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยในกลุ่มอายุระหว่าง 5-14 ปี	21
- สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยในกลุ่มอายุระหว่าง 15-24 ปี	21
- สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยในกลุ่มอายุระหว่าง 15-59 ปี	23
- สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยในกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป	23
- ภาพรวมของสถานการณ์ผู้ป่วยในด้วยสาเหตุภายนอก	25
- การให้บริการด้านการรักษาพยาบาล	
- สัดส่วนการนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยใน	31
- จำนวนวันนอนเฉลี่ยของผู้ป่วยใน	32
- จำนวนโรคเฉลี่ยที่ป่วยต่อครั้งของการนอนในโรงพยาบาล	32
- ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของผู้ป่วยใน	33

สารบัญตาราง		
ตาราง		หน้า
1	10 ลำดับแรก อัตราผู้ป่วยนอก ต่อประชากร 1,000 คน ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย (ไม่รวม กรุงเทพมหานคร) พ.ศ. 2555 – 2559	8
2	10 ลำดับแรก อัตราผู้ป่วยนอก ต่อประชากร 1,000 คน ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย (ไม่รวม กรุงเทพมหานคร) พ.ศ. 2559	8
3	จำนวนและอัตราผู้ป่วยนอกต่อประชากร 1,000 คน ทั้งประเทศและรายภาค (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) พ.ศ. 2559	9
4	10 ลำดับแรกอัตราป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2559	17
5	10 ลำดับแรก อัตราป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ทั้งประเทศและรายภาค พ.ศ. 2559	17
6	10 ลำดับแรก อัตราป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) พ.ศ.2555 - 2559	18
7	10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน กลุ่มอายุต่ำกว่า 1ปี (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2559	20
8	10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน กลุ่มอายุแรกเกิด - 4 ปี (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2559	21
9	10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน กลุ่มอายุ 5-14 ปี (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2559	22
10	10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน กลุ่มอายุ 15-24 ปี (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2559	22
11	10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน กลุ่มอายุ 15-59 ปี (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2559	23
12	10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ พ.ศ.2559	24
13	10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน จากสาเหตุภายนอก พ.ศ.2559	26
14	10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน จากสาเหตุภายนอก กลุ่มอายุแรกเกิด – 14 ปี พ.ศ. 2559	28
15	10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คนจากสาเหตุภายนอกกลุ่มอายุ 15-59 ปี พ.ศ.2559	29
16	10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน จากสาเหตุภายนอก กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป พ.ศ. 2559	30
17	จำนวนวันนอนเฉลี่ยผู้ป่วยใน จำแนกประเภทโรงพยาบาลและสิทธิการประกันสุขภาพ พ.ศ.2559	32
18	จำนวนโรคเฉลี่ยที่ป่วยต่อครั้งของการนอนโรงพยาบาล จำแนกตามประเภทโรงพยาบาลและสิทธิการประกันสุขภาพ พ.ศ.2559	32

สารบัญตาราง		
ตาราง		หน้า
19	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยผู้ป่วยใน จำแนกตามประเภทโรงพยาบาลและสิทธิการประกันสุขภาพ พ.ศ. 2559	33
20	จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2559	35
21	จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2559	89
22	จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2558 - 2559	146
23	จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตาม เพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 - 2559	178
24	จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน ตามกลุ่มสาเหตุภายนอกของการบาดเจ็บ จำแนกเพศ รายภาค/กรุงเทพมหานคร (ตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10) พ.ศ. 2559	210

สารบัญภาพ		
ตาราง		หน้า
1	อัตราป่วยผู้ป่วยนอกทั้งประเทศ อัตราต่อประชากร 1,000 คน	6
2	อัตราการป่วยของผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2559	14
3	อัตราการป่วยของผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามภาค พ.ศ. 2559	15
4	อัตราการป่วยของผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) พ.ศ. 2555 - 2559	15
5	อัตราการป่วยของผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ พ.ศ. 2559	16
6	อัตราการป่วยของผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วยที่สำคัญ พ.ศ. 2555 - 2559	19
7	อัตราการป่วยของผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน จากสาเหตุภายนอก จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2555 - 2559	25
8	อัตราการป่วยของผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน จากสาเหตุภายนอก จำแนกตามภาคและกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2559	25
9	อัตราการป่วยของผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน จากสาเหตุภายนอก จำแนกตามกลุ่มอายุ พ.ศ. 2559	27
10	สัดส่วนการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล จำแนกตามประเภทโรงพยาบาลและ สิทธิ การประกันสุขภาพ พ.ศ. 2559	31

บทนำ

ความเป็นมา

รายงานการป่วย เป็นข้อมูลที่แสดงความชุกของโรคต่างๆ ที่มีผู้มารับบริการรักษาพยาบาลในสถานบริการทุกระดับ ในอดีตได้รวบรวมข้อมูลการป่วยจากระบบรายงาน ตามแบบรายงานผู้ป่วยนอก (รง.504) ตามกลุ่มสาเหตุ (21กลุ่มโรค) แบบรายงานผู้ป่วยในรายโรค (รง.505) ตามกลุ่มสาเหตุ (75กลุ่มโรค) เนื่องจากปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยเป็นฐานข้อมูลรายบุคคลเพื่อใช้ทดแทนระบบทะเบียนรายงานแบบเดิม ดังนั้น ปีพ.ศ. 2556 เป็นต้นมา กองยุทธศาสตร์และแผนงานได้ยกเลิกการจัดเก็บข้อมูลการป่วยจากระบบรายงานดังกล่าว ต่อมาในปีพ.ศ. 2558 กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนารูปแบบการจัดเก็บฐานข้อมูลผู้มารับบริการสาธารณสุขทุกแห่งรายบุคคล ตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ (43 แฟ้ม) จึงมีการปรับเปลี่ยนการนำฐานข้อมูลผู้ป่วยรายบุคคลมาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยกลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ซึ่งการนำเสนอข้อมูลแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 รายงานการป่วยผู้ป่วยนอกจากฐานข้อมูลผู้ป่วยนอกรายบุคคลตามรูปแบบโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (43แฟ้ม) โดยยังคงรายละเอียดกลุ่มโรคตามแบบรายงานเดิมแบ่งเป็น 21 กลุ่มโรค โดยนำเสนอรายงานผู้ป่วยนอก เป็นภาพรวมประเทศ จำแนกรายภาค ทั้งจำนวนและ อัตราการป่วยต่อประชากร 1,000 คน รวมทั้งการจัดลำดับโรค 10 ลำดับแรก ในภาพรวมทั้งประเทศ และจำแนกรายภาค ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ

ส่วนที่ 2 รายงานผู้ป่วยในจากฐานข้อมูลรายบุคคลระบบประกันสุขภาพ ได้นำเสนอตารางหลักๆ ได้แก่ จำนวนและอัตราผู้ป่วยในรวมทุกการวินิจฉัยโรค ต่อประชากร 100,000 คน (**นับทุกการวินิจฉัยโรคในการมารับบริการรักษาพยาบาล 1 ครั้ง**) จำนวนและอัตราผู้ป่วยในเฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก ต่อประชากร 100,000 คน (**นับการวินิจฉัยโรคหลักเพียง 1 โรคในการมารับบริการรักษาพยาบาล 1 ครั้ง**) ภาพรวมประเทศ จำแนกเพศ โรค/กลุ่มโรค การจัดลำดับโรค 10 โรค/กลุ่มโรค จำแนกตามกลุ่มอายุ รวมถึงจำนวนและอัตราผู้ป่วยในรวมทุกการวินิจฉัยโรคต่อประชากร 100,000 คน กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป และเปรียบเทียบข้อมูลปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558) จำแนกเพศ โรค/กลุ่มโรค ซึ่งการจัดกลุ่มโรค จัดตามตารางการป่วยของบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 โดยแบ่งออกเป็น 298 โรค/กลุ่มโรค

ส่วนที่ 3 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในจากสาเหตุภายนอก ต่อประชากร 100,000 คน (**นับการวินิจฉัยโรคจากสาเหตุภายนอกเพียง 1 สาเหตุในการมารับบริการรักษาพยาบาล 1 ครั้ง**) จำแนกกลุ่มสาเหตุภายนอกหลัก ๆ 35 กลุ่มสาเหตุ ภาพรวมประเทศ จำแนกเพศ รวมทั้งการจัดลำดับ 10 ลำดับสาเหตุภายนอก

นอกจากนี้ ยังแสดงข้อมูลอื่นๆ เช่น วันนอนเฉลี่ยของการมารับบริการต่อปี สัดส่วนการนอนโรงพยาบาล เป็นต้น รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญๆ

การจัดเก็บ และรวบรวมข้อมูล

1. ระบบข้อมูลผู้ป่วยนอก

กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนารูปแบบการจัดเก็บฐานข้อมูลผู้มารับบริการของสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งจากระบบทะเบียนรายงาน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมาได้ยกเลิกการส่งรายงานข้อมูลผู้ป่วยนอกตามแบบรายงาน รง.504 และข้อมูลผู้ป่วยในตามแบบรายงาน รง.505 จากสำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด โดยนำฐานข้อมูลผู้ป่วยนอกรายบุคคลตามรูปแบบ 21 เพิ่มมาตรฐาน ในปี พ.ศ. 2559 ได้มีการพัฒนารูปแบบการจัดเก็บและจัดส่งข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (43 แฟ้ม) ซึ่งปัจจุบันฐานข้อมูลรายบุคคลดังกล่าวสามารถนำมาใช้ประมวลผลเพื่อทดแทนระบบรายงานเดิมมาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรคสำคัญ ฐานข้อมูลดังกล่าวรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยนอกที่มารับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลศูนย์ โดยสำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัดจัดส่งฐานข้อมูลเป็นรายเดือนมายัง กระทรวงสาธารณสุข เพื่อประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลตามปีปฏิทิน

2. ระบบข้อมูลผู้ป่วยใน

ข้อมูลผู้ป่วยในรายบุคคล พ.ศ. 2559 รวบรวมข้อมูลจากระบบประกันสุขภาพของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ฐานข้อมูลผู้ป่วยในหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการและครอบครัวจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ) เป็นฐานข้อมูลผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลส่งตรงให้กับหน่วยงานดังกล่าว ซึ่งครอบคลุมสถานบริการสุขภาพที่เข้าร่วมโครงการนั้น ๆ และแสดงรายละเอียดข้อมูลมากขึ้น เช่น เพศ กลุ่มอายุ โรค ระดับสถานบริการสุขภาพ แต่ยังมีข้อจำกัดของข้อมูล ไม่ครอบคลุมผู้ป่วยทุกรายที่เข้ามารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยในของสถานบริการสุขภาพแต่ละแห่ง โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้ประสานข้อมูลจากหน่วยงานดังกล่าว เฉพาะรายการข้อมูล ที่จำเป็น ในการบริหารงานสาธารณสุขเท่านั้น

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากฐานข้อมูลผู้ป่วยรายบุคคล

1) ตรวจสอบข้อมูลราย Record โดยตรวจสอบความครบถ้วนของรายการข้อมูลสำคัญๆ (วันเดือนปีเกิด วันเดือนปีที่มารับบริการ เป็นต้น) ความถูกต้องของรหัสโรค ความสัมพันธ์และความเป็นไปได้ ของรหัสโรคที่สำคัญๆ กับเพศ อายุ ความถูกต้องของข้อมูลการให้รหัสโรคที่ต้องเฝ้าระวัง ที่สำคัญ เช่น ใช้รหัส ภาวะโรค เป็นต้น

2) การให้รหัสสาเหตุภายนอกต้องใช้ร่วมกับรหัสการบาดเจ็บ

การประมวลผล

1. รายงานผู้ป่วยนอก ประมวลผลรายปีปฏิทิน ปีละ 1 ครั้ง

- 1) จำนวน และอัตรา ผู้ป่วยนอกต่อประชากร 1,000 คน ภาพรวมประเทศ และจำแนกรายภาค
- 2) สาเหตุการป่วย โรค/กลุ่มโรค จัดกลุ่มตามแบบรายงานผู้ป่วยนอก หน่วยนับเป็น **รายโรค** สำหรับการนับโรคจากการวินิจฉัยโรคของการมารับบริการในแต่ละครั้ง

2. รายงานผู้ป่วยใน ประมวลผลรายปีปฏิทิน ปีละ 1 ครั้ง

- 1) จำนวน และอัตรา ผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน ภาพรวมประเทศ จำแนกรายภาค และ เพศ
- 2) สาเหตุการป่วย โรค/กลุ่มโรค จัดกลุ่มตามตารางสาเหตุการป่วย (Tabulation list for morbidity) ของ บัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 (ICD-10) จำแนกเป็น 298 โรค/กลุ่มโรค หน่วยนับเป็น **ราย** สำหรับการนับโรคจากการวินิจฉัยโรคหลัก และหน่วยนับเป็น **รายโรค** สำหรับการนับโรคจากการวินิจฉัยโรคของการมารับบริการในแต่ละครั้ง
- 3) จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน ภาพรวมประเทศ จำแนกรายภาค เพศ และกลุ่มสาเหตุภายนอกของการบาดเจ็บ หน่วยนับเป็น **ราย**

การจัดลำดับ 10 ลำดับโรคของรายงานการป่วย

ในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้นำสาเหตุการป่วยบางโรค / กลุ่มโรค มาจัดลำดับ 10 ลำดับโรค

1. รายงานผู้ป่วยนอก การจัดลำดับโรค ไม่นำกลุ่มโรคดังต่อไปนี้มา จัดลำดับโรค กลุ่มโรคอาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการฯ (R00-R99) และสาเหตุภายนอกอื่นๆที่ทำให้ป่วยหรือตาย (W00-W99, X00-X39, X50-X59, X70-X74, X91-X99, Y00-Y84, Y86-Y89)

2. รายงานผู้ป่วยใน นำสาเหตุการป่วย ตามกลุ่มโรค ของบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ครั้งที่ 10 มาจัดลำดับโรค โดยไม่นำกลุ่มโรคดังต่อไปนี้มาจัดลำดับโรค ได้แก่ การคลอดของครรภ์เดียว (O80), อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการฯ (R00-R99) และกลุ่มบุคคลขอรับบริการเพื่อการตรวจและการชันสูตร (Z00-Z99) และกลุ่มโรคอื่นๆ ที่เหลือของแต่ละบท

การคำนวณอัตราป่วย

ใช้จำนวนประชากรกลางปีปฏิทิน ของส่วนการทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียนโดยแบ่งการคำนวณอัตราป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม ส่วนการคำนวณวันนอนเฉลี่ยจะใช้จำนวนผู้ป่วยที่จำหน่ายทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน

Formula
01

$$\text{สูตรในการคำนวณอัตราผู้ป่วยนอก} = \frac{\text{จำนวนผู้ป่วยนอกช่วงปีหนึ่ง} \times 1,000}{\text{ประชากรกลางปีในปีเดียวกัน}}$$



Formula
02

$$\text{สูตรในการคำนวณอัตราผู้ป่วยใน} = \frac{\text{จำนวนผู้ป่วยในช่วงปีหนึ่ง} \times 100,000}{\text{ประชากรกลางปีในปีเดียวกัน}}$$



Formula
03

$$\frac{\text{จำนวนวันโดยเฉลี่ยที่ผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล}}{\text{จำนวนผู้ป่วยที่จำหน่ายทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน}} = \frac{\text{จำนวนวันที่ผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล}}{\text{จำนวนผู้ป่วยที่จำหน่ายทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน}}$$



คำจำกัดความ

ราย	หมายถึง	จำนวนครั้งของการมารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน สำหรับในรายงานนี้รวบรวมจากการวินิจฉัยโรคหลักผู้มารับบริการในแต่ละครั้ง
รายโรค	หมายถึง	จำนวนของโรคที่ได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยด้วยโรคนั้นๆ ในแต่ละครั้งที่มารับบริการ สำหรับในรายงานนี้ รวบรวมจากทุกการวินิจฉัยโรคของผู้มารับบริการในแต่ละครั้ง
จำนวนวันโดยเฉลี่ยที่ผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล (วันนอนเฉลี่ย)	หมายถึง	จำนวนวันโดยเฉลี่ยต่อผู้ป่วยใน 1 คน ที่อยู่รักษาในโรงพยาบาลจนจำหน่ายในระยะเวลาที่กำหนด โดยเฉลี่ยจากวันอยู่ของผู้ป่วยจำหน่ายทุกคน ต่อจำนวนผู้ป่วยที่จำหน่ายทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน
การวินิจฉัยโรคหลัก	หมายถึง	การวินิจฉัยโรคหลัก โรคที่ทำให้ผู้ป่วยต้องมารับการรักษาพยาบาลไม่นับรวมการวินิจฉัยโรคอื่น ๆ ที่เป็นโรคร่วมด้วยในครั้งนั้น
รวมทุกการวินิจฉัยโรค	หมายถึง	การวินิจฉัยโรคทั้งหมด ที่ผู้ป่วยมารับบริการรักษาพยาบาลในครั้งนั้น ได้แก่ การวินิจฉัยโรคหลัก (Principle) การวินิจฉัยโรคร่วม (Co-morbidity) การวินิจฉัยโรคแทรกซ้อน (Complication) และการวินิจฉัยโรคอื่นๆ (Other)

¹ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน, ศัพทานุกรมข้อมูลสุขภาพ, 2547, โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุ, กรุงเทพฯ


ข้อมูลการป่วยของผู้ป่วยนอก

ข้อมูลการป่วยของผู้ป่วยนอก

กระทรวงสาธารณสุขได้มีการพัฒนารูปแบบการจัดเก็บฐานข้อมูลผู้มารับบริการของสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 เป็นต้นมาได้ยกเลิกการส่งรายงานข้อมูลผู้ป่วยนอกตามแบบรายงานร.504 และข้อมูลผู้ป่วยในตามแบบรายงาน ร.505 จากสำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด โดยนำฐานข้อมูลผู้ป่วยนอกรายบุคคลตามรูปแบบ 21 แฟ้มมาตรวจมาตรฐาน มาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรคสำคัญ ในปี พ.ศ. 2558 การนำเสนอข้อมูลการป่วยของผู้ป่วยนอกได้ประมวลผลจากฐานข้อมูลผู้ป่วยนอกรายบุคคล ตามรูปแบบโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข (43 แฟ้ม) แต่การจำแนกกลุ่มโรคยังคงแบ่งเป็นกลุ่มสาเหตุการป่วย (21 กลุ่มโรค) โดยแสดงข้อมูลการป่วย ของผู้มารับบริการรักษาพยาบาลในภาพรวมระดับประเทศ และภาคตามกลุ่มโรคต่าง ๆ ซึ่งสถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยนอก พ.ศ. 2555 – 2559 พบว่า มีแนวโน้มโรคที่เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ ยอดรวมของอัตราป่วยขึ้นเพิ่มขึ้นเนื่องจากพบว่าบางกลุ่มโรค มีอัตราป่วยลดลงซึ่งอาจเนื่องจากเดิมใช้รูปแบบการรายงานที่สำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัดรวบรวมหรือประมวลผลส่งเป็นรายเดือนมาเป็นส่วนกลาง นำฐานข้อมูลมาตรวจสอบและประมวลผล นอกจากนี้ข้อจำกัดของข้อมูลผู้ป่วยนอก คือได้รับข้อมูลเฉพาะสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไม่มีข้อมูลผู้ป่วยของสถานบริการสังกัดอื่น ๆ และกรุงเทพมหานคร

สถานการณ์การป่วยผู้ป่วยนอก

ภาพ 1 อัตราผู้ป่วยนอก ต่อประชากร 1,000 คน พ.ศ. 2555 – 2559



อัตราผู้ป่วยนอกในภาพรวมประเทศ ในช่วงปี พ.ศ. 2555 - 2557 มีอัตราลดลงเล็กน้อย ซึ่งอาจมีผลจากการเปลี่ยนรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการนำข้อมูลผู้ป่วยนอกรายบุคคลจากฐานข้อมูล 21 แฟ้มมาประมวลผลที่ส่วนกลางแทนการวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานที่สำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด รวบรวมจัดส่งเป็นรายเดือนจากสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งในสังกัดเท่านั้น ในปี พ.ศ. 2558 ได้มีการพัฒนาการเก็บและจัดส่งข้อมูลในรูปแบบโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลสุขภาพ (43 แฟ้ม) จากสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง สำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัดรวบรวมจัดส่งเป็นรายเดือนมายัง Health Data Center กระทรวงสาธารณสุข อัตรารายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุการป่วยภาพรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2557 และในปี พ.ศ. 2559 อัตรารายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2558 (ภาพที่ 1)

จากตารางที่ 1 อัตราผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ 10 ลำดับแรกในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา กลุ่มโรคที่มีอัตราผู้ป่วยนอกสูงเป็น ลำดับที่ 1 อันดับที่ 2 และ ลำดับที่ 3 จะอยู่ในกลุ่มโรคกลุ่มเดียวกัน ซึ่งเป็น โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบไหลเวียนเลือด และกลุ่มโรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม

เมื่อพิจารณาตารางที่ 2 อัตราผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ 10 ลำดับแรก รายงาน พ.ศ. 2559 พบว่า โรคระบบไหลเวียนเลือดเป็นลำดับแรกในภาพรวมประเทศ เช่นเดียวกับ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต้ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม สูงเป็นลำดับแรก

ตาราง 1 10 ลำดับแรก อัตราผู้ป่วยนอก ต่อประชากร 1,000 คน ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย (ไม่รวม กรุงเทพมหานคร) พ.ศ. 2555 – 2559

ลำดับ กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย(ชื่อโรค)	2555		2556		2557		2558		2559	
		ลำดับ	อัตรา	ลำดับ	อัตรา	ลำดับ	อัตรา	ลำดับ	อัตรา	ลำดับ	อัตรา
9	โรกระบบไหลเวียนเลือด (I00-I99)	2	425.72	2	4140.1	1	438.34	1	489.89	1	610.93
4	โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม(E00-E90)	3	385.76	3	462.87	2	414.58	2	462.23	2	567.13
10	โรกระบบหายใจ (J00-J99)	1	473.34	1	418.25	3	409.98	3	408.14	3	499.58
11	โรกระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก(K00-K93)	5	337.35	5	354.83	5	323.44	5	362.53	4	440.42
13	โรกระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อเยื่อเสริม (M00-M99)	4	354.91	4	351.66	4	345.13	4	371.76	5	438.54
12	โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (L00-L99)	7	104.93	8	98.64	6	92.26	8	98.25	6	114.56
1	โรคติดเชื้อและปรสิต(A00-A99, B00-B99)	6	127.53	6	116.71	8	86.97	7	115.17	7	110.98
14	โรกระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ (N00-N99)	8	103.33	7	104.7	9	81.25	6	141.67	8	108.69
7	โรคตาารวมส่วนประกอบของตา(H00-H59)	9	80.67	9	75.62	7	88.88	9	86.06	9	104.42
5	ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม(F00-F99)	10	62.35	10	59.77	10	50.76	10	72.09	10	76.36

ตาราง 2 10 ลำดับแรก อัตราผู้ป่วยนอก ต่อประชากร 1,000 คน ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย (ไม่รวม กรุงเทพมหานคร) พ.ศ. 2559

ลำดับ กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย(ชื่อโรค)	ภาคกลาง		ภาคใต้		ภาคเหนือ		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		รวมทั้งประเทศ	
		ลำดับ	อัตรา	ลำดับ	อัตรา	ลำดับ	อัตรา	ลำดับ	อัตรา	ลำดับ	อัตรา
9	โรกระบบไหลเวียนเลือด (I00-I99)	1	820.81	1	631.36	3	510.24	1	547.94	1	610.93
4	โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม(E00-E90)	2	676.16	2	586.84	1	529.07	3	484.46	2	567.13
10	โรกระบบหายใจ (J00-J99)	4	502.33	3	479.91	2	512.35	2	501.20	3	499.58
11	โรกระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก(K00-K93)	5	477.23	5	409.49	4	458.85	4	405.90	4	440.42
13	โรกระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อเยื่อเสริม (M00-M99)	3	537.52	4	409.52	5	455.14	5	326.63	5	438.54
12	โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (L00-L99)	7	121.69	6	115.53	6	107.57	6	120.37	6	114.56
1	โรคติดเชื้อและปรสิต(A00-A99, B00-B99)	8	119.82	8	106.73	7	106.33	7	118.46	7	110.98
14	โรกระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ (N00-N99)	6	133.97	9	99.39	9	101.82	8	109.76	8	108.69
7	โรคตาารวมส่วนประกอบของตา(H00-H59)	9	112.75	7	107.36	8	105.63	9	85.82	9	104.42
5	ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม(F00-F99)	10	102.20	10	65.80	10	70.08	10	77.54	10	76.36

ตาราง 3 จำนวนและอัตราผู้ป่วยนอกทั้งประเทศและรายภาค (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) พ.ศ. 2559 (อัตราต่อประชากร 1,000 คน)

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย	ทั่วประเทศ		ภาคกลาง		ภาคใต้		ภาคเหนือ		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
	รวม	221,786,620	3,732.86	51,058,491	4,375.83	61,034,232	3,678.91	77,792,501	3,553.56	31,901,396	3,443.36
1	โรคติดเชื้อและปรสิต(A00-A99, B00-B99)Certain infectious and parasitic diseases	6,593,971	110.98	1,398,125	119.82	1,770,689	106.73	2,327,663	106.33	1,097,494	118.46
2	เนื้องอก (รวมมะเร็ง) (C00-C97, D00-D48) Neoplasms	2,586,374	43.53	633,965	54.33	785,495	47.35	858,684	39.22	308,230	33.27
3	โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน(D50-D89) Diseases of the blood and blood forming organs and certain disorders	1,582,891	26.64	373,282	31.99	419,326	25.28	571,203	26.09	219,080	23.65
4	โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม(E00-E90) Endocrine, nutritional and metabolic diseases	33,695,849	567.13	7,889,678	676.16	9,735,788	586.84	11,582,010	529.07	4,488,373	484.46
5	ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม (F00-F99) Mental and behavioural	4,536,752	76.36	1,192,520	102.20	1,091,622	65.80	1,534,204	70.08	718,406	77.54
6	โรคระบบประสาท (G00-G99) Diseases of the nervous system	3,781,151	63.64	888,485	76.15	1,167,774	70.39	1,217,859	55.63	507,033	54.73
7	โรคตาบางส่วนประกอบของตา(H00-H59) Diseases of the eye and adnexa	6,204,240	104.42	1,315,658	112.75	1,781,114	107.36	2,312,399	105.63	795,069	85.82
8	โรคหูและปุ่มกกหู (H60-H95) Disease of the ear and mastoid process	1,844,947	31.05	499,337	42.79	497,817	30.01	560,288	25.59	287,505	31.03

ตาราง 3 จำนวนและอัตราผู้ป่วยนอกต่อประชากร 100,000 คน ทั้งประเทศและรายภาค (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) พ.ศ. 2559

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย	ทั่วประเทศ		ภาคกลาง		ภาคใต้		ภาคเหนือ		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
9	โรคระบบไหลเวียนเลือด (I00-I99) Diseases of the circulatory system	36,298,204	610.93	9,577,445	820.81	10,474,447	631.36	11,169,840	510.24	5,076,472	547.94
10	โรคระบบหายใจ (J00-J99) Diseases of the respiratory system	29,682,626	499.58	5,861,348	502.33	7,961,786	479.91	11,216,057	512.35	4,643,435	501.20
11	โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก (K00-K93) Diseases of the digestive system	26,167,346	440.42	5,568,455	477.23	6,793,623	409.49	10,044,784	458.85	3,760,484	405.90
12	โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (L00-L99) Diseases of the skin and subcutaneous tissue	6,806,630	114.56	1,419,887	121.69	1,916,618	115.53	2,354,900	107.57	1,115,225	120.37
13	โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อเยื่อเสริม (M00-M99) Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue	26,055,746	438.54	6,271,998	537.52	6,794,038	409.52	9,963,625	455.14	3,026,085	326.63
14	โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ (N00-N99) Diseases of the genitourinary system	6,458,019	108.69	1,563,162	133.97	1,648,992	99.39	2,228,939	101.82	1,016,926	109.76
15	ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด (O00-O99) ยกเว้น (080-084)	937,002	15.77	135,598	11.62	281,751	16.98	277,750	12.69	241,903	26.11

ตาราง 3 จำนวนและอัตราผู้ป่วยนอกต่อประชากร 100,000 คน ทั้งประเทศและรายภาค (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) พ.ศ. 2559

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย	ทั่วประเทศ		ภาคกลาง		ภาคใต้		ภาคเหนือ		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
16	ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด (อายุครรภ์ 22 สัปดาห์ขึ้นไปจนถึง 7 วันหลังคลอด) (P00-P96) Certain conditions originating in the perinatal period	275,828	4.64	57,752	4.95	72,374	4.36	108,890	4.97	36,812	3.97
17	รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิด การพิการจนผิดปกติแต่กำเนิดและโครโมโซม ผิดปกติ (Q00-Q99) Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities	288,080	4.85	57,583	4.93	77,000	4.64	100,300	4.58	53,197	5.74
18	อาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้ (R00-R99) Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified	21,862,779	367.97	5,083,953	435.71	5,992,791	361.22	7,254,295	331.38	3,531,740	381.21
19	การเป็นพิษและผลที่ตามมา (X40-X49, X60-X69, X85-X90) Poisoning, toxic effect, and their sequelae	72,026	1.21	17,630	1.51	21,129	1.27	22,682	1.04	10,585	1.14

ตาราง 3 จำนวนและอัตราผู้ป่วยนอกต่อประชากร 100,000 คน ทั้งประเทศและรายภาค (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) พ.ศ. 2559

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย	ทั่วประเทศ		ภาคกลาง		ภาคใต้		ภาคเหนือ		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
20	อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา (V01-V99, Y85) Transport accidents and their sequelae	1,413,341	23.79	265,639	22.77	438,573	26.44	482,123	22.02	227,006	24.50
21	สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตาย (W00-W99, X00-X19, X20-X29, X30- X39, X50-X59, X70-X84, X91-X99, Y00- Y09, Y20-Y36, Y40-Y84, Y86-Y89) Other external causes of morbidity and mortality (eg: accidents, injuries, intentional self-harm, assault, animals and plants, complications of medical and surgical care and other unspecified causes)	4,642,818	78.14	986,991	84.59	1,311,485	79.05	1,604,006	73.27	740,336	79.91

แหล่งข้อมูล : ปี พ.ศ. 2559 ฐานข้อมูลผู้ป่วยนอกรายบุคคลตามรูปแบบโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (43 แฟ้ม)


ข้อมูลการป่วยของผู้ป่วยใน

สถานการณ์การป่วย พ.ศ. 2559 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลการป่วยของประชาชนไทย จากข้อมูลผู้ป่วยในที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลและมีสิทธิการรักษาพยาบาลในระบบประกันสุขภาพของประเทศไทย ได้แก่ สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว สำหรับการสรุปผลการรายงานของการวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลผู้ป่วยใน เป็นการจำแนก สาเหตุการป่วยตามกลุ่มโรค/การจัดลำดับโรคในแต่ละกลุ่มอายุ จำแนกตามเพศ และภูมิภาคต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

สถานการณ์การป่วยผู้ป่วยใน

รูปแบบการเจ็บป่วยของประชาชน พ.ศ. 2559 ประมวลผลและวิเคราะห์จากข้อมูลการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมีอัตราการป่วย 30,364.23 ต่อประชากร 100,000 คน และจากการวิเคราะห์ พบว่า เพศหญิงมีอัตราการป่วยสูงกว่าเพศชาย (31,355.48 และ 29,334.94) (ภาพที่ 2) และเมื่อพิจารณาตามภูมิภาคต่าง ๆ พบว่า ภาคเหนือมีอัตราการป่วยมากเป็นอันดับ 1 รองลงมาเป็นกรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง (32518.48 , 32439.69 , 30586.92, 30074.56, 28016.61) ต่อประชากร 100,000 คน ตามลำดับ (ภาพ 3)

ภาพ 2 อัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2559




รวบรวม / วิเคราะห์ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สทส.)

ภาพ 3 อัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามภาค พ.ศ. 2559




รวบรวม / วิเคราะห์ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แหล่งข้อมูล: ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)

ภาพ 4 อัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) พ.ศ. 2555 - 2559



รวบรวม /

วิเคราะห์ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แหล่งข้อมูล: ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)


จากภาพที่ 4 จะเห็นได้ว่าอัตราผู้ป่วยใน ปี พ.ศ. 2556 เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2555 แต่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่มาก เมื่อพิจารณาข้อมูลในปี พ.ศ. 2557 พบว่าอัตราผู้ป่วยในลดลง แต่ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าว ไม่สามารถสรุปได้ว่า แนวโน้มการป่วยของผู้ป่วยในลดลง เนื่องจากยังขาดข้อมูลของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุขบางแห่ง และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปี 2558 และปี 2559

ใน พ.ศ. 2559 สาเหตุการป่วยที่พบสูงที่สุด มีสาเหตุมาจากโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุ นำ รองลงมาได้แก่ เบาหวาน และโลหิตจางอื่นๆ ตามลำดับ (ตาราง 4) เมื่อจำแนกรายภาค พบว่า ผู้ป่วยในมี สาเหตุการป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุเป็นลำดับแรก โดยภาคเหนือมีอัตราป่วยสูงสุด รองลงมาเป็นภาคกลาง (ไม่รวม กทม.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โรคเบาหวานเป็นสาเหตุการป่วย ลำดับที่สอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราป่วยสูงสุด รองลงมาภาคกลาง (ไม่รวม กทม.) ภาคเหนือ และ ภาคใต้ ส่วนสาเหตุการป่วยจากโลหิตจางอื่น ๆ ภาคเหนือมีอัตราป่วยสูงสุด รองลงมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.) และภาคใต้ ตามลำดับ (ตาราง 5)

สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน 10 ลำดับแรก เปรียบเทียบ พ.ศ. 2555 – 2559 พบว่า โรคที่พบในผู้ป่วยใน ลำดับแรกเป็นโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุ นำ โรคเบาหวาน ในปี พ.ศ. 2555 – 2556 พบอัตราป่วยเป็น ลำดับสาม ในปี พ.ศ. 2557 – 2559 พบอัตราป่วยเป็นลำดับสอง ส่วนของโรคโลหิตจางอื่นๆ ในปี พ.ศ. 2555 – 2556 มีอัตราป่วยเป็นลำดับสอง และในปี พ.ศ. 2557 – 2559 มีอัตราป่วยเป็นลำดับสาม (ตาราง 6)

เมื่อพิจารณาการเจ็บป่วยของผู้ป่วยในตามกลุ่มอายุ พบว่า ในกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไปมีอัตราป่วยสูงที่สุด รองลงมากลุ่มเด็กอายุ 0 – 4 ปี และอัตราป่วยน้อยที่สุดในกลุ่มอายุ 15 – 24 ปี โดยเปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่างเพศ จะเห็นว่าผู้ป่วยเพศชายสูงกว่าเพศหญิง ยกเว้นในกลุ่มอายุ 15 – 24 ปีและ 15 – 59 ปี ที่ผู้ป่วย เพศหญิงสูงกว่าเพศชาย (ภาพ 5)

ภาพ 5 อัตราป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามกลุ่ม อายุ และเพศ พ.ศ. 2559



ร ว บ ร ร ม /

วิเคราะห์ : กอง

ยุทธศาสตร์และแผนงาน

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สภส.)

ตาราง 4 10 ลำดับแรกอัตราป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค)
จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2559

ลำดับ	กลุ่มโรค/รหัสกลุ่มโรค	รวม	ชาย	หญิง
1	ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุ (I10)	1993.38	1751.03	2226.78
2	เบาหวาน (E10-E14)	1292.79	1042.83	1533.51
3	โลหิตจางอื่น ๆ (D51-D64)	1192.32	1108.53	1273.02
4	ไตวาย (N17-N19)	1092.81	1111.63	1074.7
5	ปอดบวม (J12-J18)	791.87	906.55	681.43
6	อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ (A09)	687.03	650.24	722.46
7	ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ของการตั้งครรภ์ และการคลอด (O20-O29, O60-O63, O67-O71, O73-O75, O81-O84)	451.03	-	885.38
8	โรคหลอดเลือดอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น (J40-J44)	391.47	586.71	203.45
9	โรคหัวใจขาดเลือดอื่น ๆ (I20, I23-I25)	376.88	432.59	323.24
10	โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะ (N25-N29, N31-N39)	364.04	304.27	421.6

หมายเหตุ: อันดับที่ 7 กลุ่มโรคภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ของการตั้งครรภ์ และการคลอด (O20-O29, O60-O63, O67-O71, O73-O75, O81-O84)

อัตราป่วยเพศหญิงใช้จำนวนประชากรรวมเป็นตัวหาร

รวบรวม / วิเคราะห์ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แหล่งข้อมูล : สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สทส.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ตาราง 5 10 ลำดับแรก อัตราป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค)
ทั้งประเทศและรายภาค พ.ศ. 2559

ลำดับ	กลุ่มโรค/รหัสกลุ่มโรค	รวม	ภาคกลางไม่รวม กทม.	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคเหนือ	ภาคใต้
1	ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุ (I10)	1,993.38	2,072.68	1,815.34	2,232.29	1,756.32
2	เบาหวาน (E10-E14)	1,292.79	1,251.77	1,471.53	1,214.44	1,005.27
3	โลหิตจางอื่น ๆ (D51-D64)	1,192.32	1,072.43	1,356.24	1,358.50	869.70
4	ไตวาย (N17-N19)	1,092.81	940.89	1,318.38	1,227.06	784.80
5	ปอดบวม (J12-J18)	791.87	718.19	910.36	787.85	817.05
6	อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ (A09)	687.03	581.70	811.62	688.04	820.86
7	ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ของการตั้งครรภ์ และการคลอด (O20-O29, O60-O63, O67-O71, O73-O75, O81-O84)	451.03	748.94	860.50	739.47	1,561.64
8	โรคหลอดเลือดอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น (J40-J44)	391.47	325.78	315.63	621.43	521.16
9	โรคหัวใจขาดเลือดอื่น ๆ (I20, I23-I25)	376.88	453.18	258.59	344.06	384.10
10	โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะ (N25-N29, N31-N39)	364.04	374.90	325.44	466.60	292.03

รวบรวม / วิเคราะห์ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แหล่งข้อมูล : สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สทส.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ตาราง 6 10 ลำดับแรก อัตราป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค)

พ.ศ.2555 - 2559


ลำดับ	กลุ่มโรค/รหัสกลุ่มโรค	2555	2556	2557	2558	2559
1	ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุ(I10)	1,546.18	1,600.15	1,544.32	1,882.32	1,993.38
2	เบาหวาน (E10-E14)	1,050.05	1,081.25	1,032.50	1,233.46	1,292.79
3	โลหิตจางอื่น ๆ (D51-D64)	1,132.42	1,127.94	1,030.73	1,156.98	1,192.32
4	ไตวาย (N17-N19)	743.46	806.01	813.95	993.89	1,092.81
5	ปอดบวม (J12-J18)	626.53	606.87	596.12	702.44	791.87
6	อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ(A09)	636.68	645.74	579.96	617.45	687.03
	ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ของการตั้งครรภ์ และการคลอด					
7	(O20-O29, O60-O63, O67-O71, O73-O75, O81-O84)	994.66	949.66	779.49	886.87	451.03
8	โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น (J40-J44)	390.73	366.01	347.94	384.06	391.47
9	โรคหัวใจขาดเลือดอื่น ๆ (I20, I23-I25)	326.58	327.50	307.72	375.48	376.88
10	โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะ (N25-N29, N31-N39)	305.93	306.50	286.16	346.82	364.04

รวบรวม / วิเคราะห์ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แหล่งข้อมูล : สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สทส.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ภาพ 6 อัตราป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกสาเหตุ

การป่วยที่สำคัญ พ.ศ. 2555 – 2559



รวบรวม / วิเคราะห์ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สทส.)

อัตราผู้ป่วยในจำแนกตามสาเหตุการป่วยที่สำคัญ ได้แก่ ไตวาย โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มโรคเรื้อรัง (ภาพ 6) พบว่าตั้งแต่ปี 2555 - 2559 โรคหัวใจ โรคเบาหวาน ไตวาย และโรคมะเร็งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง อัตราการป่วยเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก ส่วนโรคความดันโลหิตสูง ในปี 2555 – 2559 มีอัตราที่ลดลงอย่างชัดเจน

สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี

การเจ็บป่วยในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากภาวะหายใจผิดปกติอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด เมื่อจำแนกตามเพศตามสาเหตุการป่วย พบว่า เพศชายมีอัตราป่วยสูงกว่าเพศหญิง ยกเว้นสาเหตุจากทารกในครรภ์โตช้า ทารกในครรภ์ขาดสารอาหารและความผิดปกติเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ระยะสั้นและน้ำหนักทารกแรกเกิดน้อยที่เพศหญิงมีอัตราป่วยสูงกว่าเพศชาย (ตาราง 7)

ตาราง 7 10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน กลุ่มอายุต่ำกว่า 1 ปี
(รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2559

ลำดับ	กลุ่มโรค/รหัสกลุ่มโรค	รวม	ชาย	หญิง
1	ภาวะหายใจผิดปกติอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด(P22-P28)	10,871.56	12,584.52	9,061.21
2	ทารกในครรภ์โตช้า ทารกในครรภ์ขาดสารอาหาร และความผิดปกติเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ระยะสั้น และน้ำหนักทารกแรกเกิดน้อย(P05-P07)	10,373.96	10,046.90	10,719.61
3	ปอดบวม (J12-J18)	7,229.37	8,730.49	5,642.90
4	อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ (A09)	6,775.75	7,816.61	5,675.72
5	การติดเชื้อแต่กำเนิดและโรคปาราสิต(P35-P37)	5,404.62	5,794.40	1,992.67
6	ทารกในครรภ์และแรกเกิดที่ได้รับผลจากปัจจัยทางมารดา และโรคแทรกในระหว่างตั้งครรภ์ เจริญครรภ์ และคลอด(P00-P04)	4,520.50	4,621.94	4,413.29
7	หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน(J20-J21)	4,398.82	5,406.10	3,334.27
8	ความผิดปกติแต่กำเนิดอื่น ๆ ของระบบย่อยอาหาร(Q38-Q40, Q42-Q45)	3,993.70	4,379.03	3,175.09
9	โลหิตจางอื่น ๆ (D51-D64)	3,137.73	4,386.00	1,818.50
10	ความผิดปกติแต่กำเนิดของระบบไหลเวียนโลหิต(Q20-Q28)	2,244.52	2,287.75	2,198.82

รวบรวม / วิเคราะห์ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สภส.)

สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยในเด็ก กลุ่มอายุแรกเกิด - 4 ปี

ในเด็กกลุ่มอายุแรกเกิด - 4 ปี พบว่า ส่วนใหญ่สาเหตุการเจ็บป่วยลำดับต้นๆ เกิดจากปอดบวม รองลงมาสาเหตุจากอาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ ซึ่งสาเหตุดังกล่าวอัตราการป่วยในเพศชายมากกว่าในเพศหญิง (ตาราง 8)

ตาราง 8 10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน กลุ่มอายุแรกเกิด - 4 ปี
(รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2559

ลำดับ	กลุ่มโรค/รหัสกลุ่มโรค	รวม	ชาย	หญิง
1	ปอดบวม (J12-J18)	4,147.93	4,715.15	3,547.32
2	อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ(A09)	3,970.79	4,464.37	3,448.18
3	ภาวะหายใจผิดปกติอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด(P22-P28)	1,981.27	2,291.34	1,652.95
4	ทารกในครรภ์โตช้า ทารกในครรภ์ขาดสารอาหาร และความผิดปกติเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ระยะสั้น และน้ำหนักทารกแรกเกิดน้อย(P05-P07)	1,890.58	1,829.30	1,955.47
5	โลหิตจางอื่น ๆ(D51-D64)	1,349.87	1,669.98	1,010.91
6	การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ(J00-J01, J05-J06)	1,240.46	1,452.07	1,016.40
7	การขาดปริมาณของเหลวในร่างกาย(E86)	1,240.08	1,347.81	1,126.01
8	คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน(J02-J03)	1,194.64	1,330.80	1,050.47
9	การติดเชื้อแต่กำเนิดและโรคปาลาสิต(P35-P37)	984.95	1,055.02	910.76
10	ทารกในครรภ์และแรกเกิดที่ได้รับผลจากปัจจัยทางมารดา และโรคแทรกในระหว่างตั้งครรภ์ เจ็บครรภ์ และคลอด(P00-P04)	823.83	841.54	805.07

รวบรวม / วิเคราะห์ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สภส.)

สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยในกลุ่มอายุระหว่าง 5-14 ปี

ในกลุ่มอายุ 5 – 14 ปี สาเหตุสำคัญของผู้ป่วยในลำดับแรก ได้แก่ โรคโลหิตจางอื่น ๆ รองลงสาเหตุมาจากอาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ โดยอัตราป่วยพบในเพศชายสูงกว่าเพศหญิง (ตาราง 9)

สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยในกลุ่มอายุระหว่าง 15-24 ปี

สำหรับกลุ่มโรคที่เป็นปัญหาสำคัญในกลุ่มอายุนี้ 5 ลำดับแรก ได้แก่ การดูแลมารดาอื่น ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ์ และถุงน้ำคร่ำ และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระยะคลอด, โลหิตจางอื่น ๆ, ภาวะแทรกซ้อนที่ส่วนใหญ่พบในระยะหลังคลอด และภาวะทางสูติกรรมอื่น ๆ ที่มีได้ระบุรายละเอียด, อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ และกระดูกแตกหักของแขนขาอื่น ๆ

เมื่อเปรียบเทียบระหว่างเพศ พบความแตกต่างของการเจ็บป่วยในเพศชายและเพศหญิง โดยเพศชายการเจ็บป่วย ลำดับแรก ได้แก่ กระดูกแตกหักของแขนขาอื่น ๆ รองลงมาคือ โลหิตจางอื่น ๆ และการบาดเจ็บภายในกะโหลกศีรษะ ส่วนเพศหญิง ซึ่งจัดว่าเป็นช่วงวัยรุ่นและสตรีวัยเจริญพันธุ์ สาเหตุที่พบลำดับแรกๆจึงเกี่ยวกับการดูแลมารดาอื่น ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ์ และถุงน้ำคร่ำ และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระยะคลอด รองลงมาคือ ภาวะแทรกซ้อนที่ส่วนใหญ่พบในระยะหลังคลอด และภาวะทางสูติกรรมอื่น ๆ ที่มีได้ระบุรายละเอียด และโลหิตจางอื่น ๆ ตามลำดับ (ตาราง 10)

ตาราง 9 10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน กลุ่มอายุ 5-14 ปี
(รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2559

ลำดับ	กลุ่มโรค/รหัสกลุ่มโรค	รวม	ชาย	หญิง
1	โลหิตจางอื่น ๆ (D51-D64)	777.80	789.58	765.34
2	อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ (A09)	660.25	702.42	615.64
3	ปอดบวม (J12-J18)	315.19	337.29	291.81
4	หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน(J20-J21)	308.16	348.95	265.00
5	คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน(J02-J03)	288.42	303.18	272.80
6	กระเพาะอาหารอักเสบและดูโอเดนิมอักเสบ(K29)	262.07	261.96	262.19
7	การขาดปริมาณของเหลวในร่างกาย(E86)	245.28	249.09	241.25
8	โรคของไส้ติ่ง (K35-K38)	230.99	245.15	216.01
9	โรคหืด (J45-J46)	215.29	265.04	162.66
10	การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ(J00-J01, J05-J06)	188.08	203.32	171.97

รวบรวม / วิเคราะห์ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สภส.)

ตาราง 10 10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน กลุ่มอายุ 15-24 ปี
(รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2559

ลำดับ	กลุ่มโรค/รหัสกลุ่มโรค	รวม	ชาย	หญิง
1	การดูแลมารดาอื่น ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ์ และถุงน้ำคร่ำ และปัญหาที่อาจเกิดได้ในระยะคลอด (O30-O43, O47-O48)	620.04	0.00	1,268.94
2	โลหิตจางอื่น ๆ(D51-D64)	484.88	353.19	622.71
3	ภาวะแทรกซ้อนที่ส่วนใหญ่พบในระยะหลังคลอด และภาวะทางสูติกรรมอื่น ๆ ที่มิได้ระบุรายละเอียด (O85-O99)	337.83	0.00	691.38
4	อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ(A09)	277.54	186.09	373.23
5	กระดูกแตกหักของแขนขาอื่น ๆ(S42, S52, S62, S82, S92, T10, T12)	230.98	375.42	79.81
6	โรคของไส้ติ่ง (K35-K38)	223.67	197.54	251.02
7	การบาดเจ็บภายในกระโหลกศีรษะ (S06)	164.36	257.27	67.13
8	โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนิม(K20-K23, K28, K30-K31)	123.17	92.88	154.88
9	การคลอดติดขัด(O64-O66)	119.27	0.00	244.10
10	กระดูกแตกหักบริเวณกระโหลกศีรษะและกระดูกหน้า(S02)	115.94	192.28	36.04

หมายเหตุ : อันดับ 1 การดูแลมารดาอื่น ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ์ และถุงน้ำคร่ำ และปัญหาที่อาจเกิดได้ในระยะคลอด (O30-O43, O47-O48) และอันดับ 9 การคลอดติดขัด (O64-O66) อัตราป่วยใช้ประชากรรวมเป็นตัวหาร

รวบรวม / วิเคราะห์ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สภส.)

สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยในกลุ่มอายุระหว่าง 15-59 ปี

การเจ็บป่วยของประชากรในช่วงวัย 15 – 59 ปี ครอบคลุม 3 กลุ่มวัย คือ วัยรุ่น วัยเจริญพันธุ์ และวัยทำงานจะเห็นว่าสาเหตุการป่วย 5 ลำดับแรก ได้แก่ โลหิตจางอื่น ๆ ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ของการตั้งครรภ์ และการคลอด (สาเหตุการป่วยที่พบเฉพาะในเพศหญิง) เบาหวาน ไตวาย และอาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ ในเพศชายสาเหตุการป่วยสำคัญที่พบ ได้แก่ โลหิตจางอื่น ๆ เบาหวาน ไตวาย ความผิดปกติของพฤติกรรมและจิตประสาทที่เกิดจากการเสพแอลกอฮอล์ และกระดูกแตกหักของแขนขาอื่น ๆ สำหรับเพศหญิงสาเหตุการป่วยที่สำคัญ ได้แก่ ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ของการตั้งครรภ์ และการคลอด โลหิตจางอื่น ๆ เบาหวาน ไตวาย และอาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ (ตาราง 11)

ตาราง 11 10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน กลุ่มอายุ 15-59 ปี (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2559

ลำดับ	กลุ่มโรค/รหัสกลุ่มโรค	รวม	ชาย	หญิง
1	โลหิตจางอื่น ๆ (D51-D64)	681.35	631.65	729.98
2	ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ของการตั้งครรภ์ และการคลอด(O20-O29, O60-O63, O67-O71, O73-O75, O81-O84)	668.93	0.00	1,323.39
3	เบาหวาน (E10-E14)	647.37	583.07	710.27
4	ไตวาย (N17-N19)	454.03	510.68	398.61
5	อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ	277.82	221.87	332.56
6	ปอดบวม (J12-J18)	232.03	280.74	184.38
7	ความผิดปกติของพฤติกรรมและจิตประสาทที่เกิดจากการเสพแอลกอฮอล์(F10)	222.75	410.10	39.46
8	กระดูกแตกหักของแขนขาอื่น ๆ (S42, S52, S62, S82, S92, T10, T12)	190.23	281.14	101.29
9	โรคอื่น ๆ ของตับ (K71-K77)	188.67	274.22	104.97
10	ภาวะเลือดออกอื่น ๆ โรคเลือดและอวัยวะที่สร้างเลือด(D65-D77)	185.19	233.40	138.02

หมายเหตุ : ลำดับ 2 ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ของการตั้งครรภ์ และการคลอด (O20-O29, O60-O63, O67-O71, O73-O75, O81-O84)

อัตราป่วยใช้ประชากรรวมเป็นตัวหาร

รวบรวม / วิเคราะห์ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สภส.)

สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยในกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป

ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป สาเหตุการป่วยใน 2 ลำดับแรก เป็นสาเหตุการป่วยด้วยโรคเรื้อรังสำคัญ ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูงไม่สาเหตุุน่า และเบาหวาน ซึ่งพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย สาเหตุการป่วยที่พบรองลงมาคือ ไตวาย พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง โลหิตจางอื่น ๆ พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย และปอดบวม พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง ตามลำดับ (ตาราง 12)

**ตาราง 12 10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป
(รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ พ.ศ.2559**

ลำดับ	กลุ่มโรค/รหัสกลุ่มโรค	รวม	ชาย	หญิง
1	ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุ (I10)	9,610.75	9,059.38	10,054.03
2	เบาหวาน (E10-E14)	5,627.00	4,677.94	6,390.03
3	ไตวาย (N17-N19)	5,152.44	5,507.14	4,867.28
4	โลหิตจางอื่น ๆ (D51-D64)	3,713.55	3,490.21	3,893.12
5	ปอดบวม (J12-J18)	2,388.14	2,852.32	2,014.95
6	โรคหลอดเลือดสมอง อัมพาต และโรคหลอดเลือดหัวใจ แบบเรื้อรังอื่น (I40-I44)	2,144.81	3,552.02	1,013.45
7	โรคหัวใจขาดเลือดอื่น ๆ (I20, I23-I25)	1,881.50	2,245.77	1,588.63
8	ต่อกระเจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ (H25-H28)	1,788.70	1,658.95	1,893.01
9	ความผิดปกติของการนำกระแสไฟฟ้าหัวใจและหัวใจ เต้นผิดจังหวะ (I44-I49)	1,734.97	1,814.42	1,671.10
10	ตาบอดและสายตาสั้น (H54)	1,727.33	1,594.01	1,834.52

รวบรวม / วิเคราะห์ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน


แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สภส.)

ภาพรวมของสถานการณ์ป่วยของผู้ป่วยในจากสาเหตุภายนอก

เมื่อนำข้อมูลจากฐานข้อมูลผู้ป่วยในรายบุคคลของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และสวัสดิการ รักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว ซึ่งครอบคลุมผู้ป่วยใน ตามสิทธิการรักษา นั้น ๆ และเฉพาะโรงพยาบาล ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว มาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลการป่วยจากสาเหตุภายนอก สามารถจำแนก ได้มากกว่าระบบรายงาน เช่น สาเหตุภายนอกของการบาดเจ็บ เพศ กลุ่มอายุ ค่าใช้จ่าย วันนอนเฉลี่ย เป็นต้น ทั้งนี้ข้อมูลผู้ป่วยใน พ.ศ. 2559 ไม่รวมข้อมูลผู้ป่วยในสิทธิการรักษาประกันสังคม ซึ่งในปีนี้มีผู้ป่วยในบาดเจ็บ จากสาเหตุภายนอกเพิ่มจาก พ.ศ. 2558 จาก อัตรา 707.09 เป็น 733.28 เพศชาย อัตรา 922.86 เพิ่มขึ้นเป็น 949.89 เพศหญิง อัตรา 498.90 เพิ่มขึ้นเป็น 524.68 ต่อประชากร 100,000 คน (ภาพ 7)

ภาพที่ 7 อัตราป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน จากสาเหตุภายนอก จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2555 - 2559




รวบรวม / วิเคราะห์ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สภส.)

ภาพ 8 อัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน จากสาเหตุภายนอก จำแนกตาม ภาคและกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2559



รวบรวม / วิเคราะห์ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สภส.)

สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยในจากสาเหตุภายนอก ภาพรวมทั้งประเทศ เมื่อนำมาจัดลำดับ 10 ลำดับแรก พ.ศ. 2559 สาเหตุของการป่วย ที่พบสูงที่สุดคือ การพลัดตกหกล้ม, บาดเจ็บจากการถูกวัตถุ กลไกที่ไม่มีชีวิตและผู้ขับขี่จักรยานยนต์บาดเจ็บในอุบัติเหตุจากการขนส่ง (ตาราง 13) เมื่อพิจารณาเป็น รายกลุ่มอายุ พบว่า อัตราการป่วยสูงสุด ได้แก่ กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นอัตราต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 1,153.30 รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 15 - 24 ปี อัตรา 781.84 กลุ่มอายุแรกเกิด - 4 ปี อัตรา 781.68 กลุ่มอายุ 15 - 59 ปี อัตรา 654.72 กลุ่มอายุ 5-14 ปี อัตรา 645.79 และกลุ่มอายุ ต่ำกว่า 1 ปี อัตรา 450.48 ตามลำดับ (ภาพ 9)

ตาราง 13 10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน จากสาเหตุ ภายนอก พ.ศ.2559


ลำดับ	รหัสกลุ่มโรค/ กลุ่มโรค	รวม
1	Falls การพลัดตกหกล้ม(W00 - W19)	182.36
2	Exposure to inanimate mechanical forces บาดเจ็บจากการถูกวัตถุกลไกที่ไม่มีชีวิต(W20 - W49)	117.97
3	Motorcycle rider injured in transport accident คนขี่รถจักรยานยนต์บาดเจ็บในอุบัติเหตุจากการขนส่ง(V20 - V29)	96.24
4	Contact with venomous animals and plants สัมผัสกับสัตว์หรือพืชมีพิษ(X20 - X29)	49.32
5	Assault การถูกทำร้าย (X85 - Y09)	47.07
6	Surgical and other medical procedures as the cause of abnormal reaction of the patient, or of later complication, without mention of misadventure at the time of the procedure วิธีการรักษาทางศัลยกรรมและอายุรกรรมที่มีผลทำให้เกิดความผิดปกติของผู้ป่วย(Y83 - Y84)	39.50
7	Exposure to animate mechanical forces บาดเจ็บจากการถูกกระทำจากสิ่งมีชีวิต(W50 - W64)	34.23
8	Accidental poisoning by and exposure to noxious substances การเป็นพิษโดยอุบัติเหตุ(X40 - X49)	26.63
9	Intentional self-harm การทำร้ายตัวเอง (X60 - X84)	24.93
10	Accidental exposure to other and unspecified factors ภัยอันตรายจากปัจจัยอื่นหรือปัจจัยที่ไม่ได้ระบุโดยบังเอิญ(X58 - X59)	24.45

รวบรวม / วิเคราะห์ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สภส.)

ภาพ 9 อัตราป่วยการของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน จากสาเหตุภายนอกจำแนกตามกลุ่มอายุ พ.ศ.2559



รวบรวม / วิเคราะห์ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกลส.)

สถานการณ์ป่วยของผู้ป่วยในด้วยสาเหตุภายนอก กลุ่มอายุ แรกเกิด – 14 ปี

สาเหตุภายนอกที่เป็นสาเหตุการป่วยสำคัญในกลุ่มอายุนี้นี้ ได้แก่ การพลัดตกหกล้ม บาดเจ็บจากการถูกรถยนต์ถูกลูกไฟที่ไม่มีชีวิต และสัมผัสกับสัตว์หรือพืชมีพิษ เมื่อเปรียบเทียบในกลุ่มอายุ พบว่า การพลัดตกหกล้มเป็นสาเหตุที่พบมากที่สุดในทุกกลุ่มอายุและสูงสุดในกลุ่มอายุ 1-4 ปี โดยการบาดเจ็บจากสาเหตุภายนอกในกลุ่มอายุ ต่ำกว่า 1 ปี ได้แก่ การพลัดตกหกล้ม สาเหตุรองลงมา คือ การถูกความร้อนและสารร้อน ในกลุ่มอายุ 1-4 ปี การป่วยจากสาเหตุภายนอก ได้แก่ การพลัดตกหกล้ม เช่นกัน สาเหตุรองลงมา คือ บาดเจ็บจากการถูกรถยนต์ถูกลูกไฟที่ไม่มีชีวิต ในกลุ่มอายุ 5-14 ปี ได้แก่ การพลัดตกหกล้ม สาเหตุรองลงมา คือ บาดเจ็บจากการถูกรถยนต์ถูกลูกไฟที่ไม่มีชีวิต (ตารางที่ 14)

ตาราง 14 10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน จากสาเหตุภายนอก กลุ่มอายุแรกเกิด – 14 ปี พ.ศ. 2559

ลำดับ	รหัสกลุ่มโรค/กลุ่มโรค	< 1 ปี	1 - 4 ปี	5 - 14 ปี	แรกเกิด- 14 ปี
1	Falls การพลัดตกหกล้ม(W00 - W19)	130.03	225.31	192.00	197.07
2	Exposure to inanimate mechanical forces บาดเจ็บจากการถูกวัตถุกลไกที่ไม่มีชีวิต(W20 - W49)	33.10	145.99	104.88	111.41
3	Contact with venomous animals and plants สัมผัสกับสัตว์หรือพืชมีพิษ(X20 - X29)	21.92	52.61	62.13	57.32
4	Accidental poisoning by and exposure to noxious substances การเป็นพิษโดยอุบัติเหตุ(X40 - X49)	45.33	90.16	33.31	48.79
5	Motorcycle rider injured in transport accident คนขี่รถจักรยานยนต์บาดเจ็บในอุบัติเหตุจากการขนส่ง (V20 - V29)	9.54	17.35	63.59	48.43
6	Exposure to animate mechanical forces บาดเจ็บจากการถูกกระทำจากสิ่งมีชีวิต(W50 -W64)	11.33	47.82	42.01	41.74
7	Pedal cyclist injured in transport accident ผู้ขี่จักรยานบาดเจ็บในอุบัติเหตุจากการขนส่ง(V10 - V19)	0.89	22.83	34.44	29.48
8	Contact with heat and hot substances การถูกความร้อนและสารร้อน(X10 - X19)	73.51	51.11	5.66	21.41
9	Accidental exposure to other and unspecified factors ภัยอันตรายจากปัจจัยอื่นหรือปัจจัยที่ไม่ได้ระบุโดยบังเอิญ (X58 - X59)	17.45	22.23	18.30	19.27
10	Surgical and other medical procedures as the cause of abnormal reaction of the patient, or of later complication, without mention of misadventure at the time of the procedure วิธีการรักษาทางศัลยกรรมและอายุรกรรมที่มีผลทำให้ เกิดความผิดปกติของผู้ป่วย(Y83 - Y84)	26.10	13.99	13.04	14.04

รวบรวม / วิเคราะห์ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สภส.)

สถานการณ์ป่วยของผู้ป่วยในด้วยสาเหตุภายนอก กลุ่มอายุ 15-59 ปี และ 60 ปี ขึ้นไป

กลุ่มอายุ 15-59 ปี เป็นกลุ่มวัยทำงาน สาเหตุภายนอกที่เป็นสาเหตุการป่วยที่สำคัญ ในกลุ่มอายุนี้ ได้แก่ ผู้ที่ขี่รถจักรยานยนต์บาดเจ็บในอุบัติเหตุจากการขนส่ง รองลงมา คือ สาเหตุจากการบาดเจ็บจากการถูกวัตถุกลไกที่ไม่มีชีวิตและการพลัดตกหกล้ม (ตาราง 15) ส่วนกลุ่มอายุ 60 ปี ขึ้นไป พบว่า สาเหตุภายนอกที่สำคัญลำดับแรก ได้แก่ การพลัดตกหกล้ม รองลงมา สาเหตุจากการบาดเจ็บจากการถูกวัตถุกลไกที่ไม่มีชีวิต และวิธีการรักษาทางศัลยกรรมและอายุรกรรมมีผลทำให้เกิดความผิดปกติของผู้ป่วย (ตารางที่ 16)

ตารางที่ 15 10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คนจากสาเหตุภายนอกกลุ่มอายุ 15-59 ปี พ.ศ.2559

ลำดับ	รหัสกลุ่มโรค/กลุ่มโรค	จำนวน	อัตรา
1	Motorcycle rider injured in transport accident คนขี่รถจักรยานยนต์บาดเจ็บในอุบัติเหตุจากการขนส่ง(V20-V29)	51,015	117.14
2	Exposure to inanimate mechanical forces บาดเจ็บจากการถูกวัตถุกลไกที่ไม่มีชีวิต(W20-W49)	49,680	114.08
3	Falls การพลัดตกหกล้ม(W00-W19)	48,471	111.30
4	Assault การถูกทำร้าย(X85-Y09)	27,181	62.42
5	Contact with venomous animals and plants สัมผัสกับสัตว์หรือพืชมีพิษ(X20-X29)	19,471	44.71
6	Intentional self-harm การทำร้ายตัวเอง(X60-X84)	14,061	32.29
7	Surgical and other medical procedures as the cause of abnormal reaction of the patient, or of later complication, without mention of misadventure at the time of the procedure วิธีการรักษาทางศัลยกรรมและอายุรกรรมที่มีผลทำให้เกิดความผิดปกติของผู้ป่วย	13,875	31.86
8	Exposure to animate mechanical forces บาดเจ็บจากการถูกกระทำจากสิ่งมีชีวิต(W50-W64)	12,378	28.42
9	Accidental poisoning by and exposure to noxious substances การเป็นพิษโดยอุบัติเหตุ(X40-X49)	8,849	20.32
10	Accidental exposure to other and unspecified factors ภัยอันตรายจากปัจจัยอื่นหรือปัจจัยที่มีได้ระบุโดยบังเอิญ(Y10-Y34)	8,045	18.47

รวบรวม / วิเคราะห์ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สภส.)

ตาราง 16 10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน จากสาเหตุภายนอกกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป พ.ศ. 2558


ลำดับ	รหัสกลุ่มโรค/กลุ่มโรค	จำนวน	อัตรา
1	Falls การพลัดตกหกล้ม(W00-W19)	47,282	477.91
2	Exposure to inanimate mechanical forces บาดเจ็บจากการถูกวัตถุกลไกที่ไม่มีชีวิต(W20-W49)	14,122	142.74
3	Surgical and other medical procedures as the cause of abnormal reaction of the patient, or of later complication, without mention of misadventure at the time of the procedure วิธีการรักษาทางศัลยกรรมและอายุรกรรมที่มีผลทำให้เกิดความผิดปกติของผู้ป่วย (Y83-Y84)	10,178	102.88
4	Contact with venomous animals and plants สัมผัสกับสัตว์หรือพืชมีพิษ(X20-X29)	5,962	60.26
5	Motorcycle rider injured in transport accident คนขี่รถจักรยานยนต์บาดเจ็บในอุบัติเหตุจากการขนส่ง(V20-V29)	5,949	60.13
6	Accidental exposure to other and unspecified factors อันตรายจากปัจจัยอื่นหรือปัจจัยที่มีได้ระบุโดยบังเอิญ(X58-X59)	5,623	56.84
7	Exposure to animate mechanical forces บาดเจ็บจากการถูกกระทำจากสิ่งมีชีวิต(W50-W64)	5,048	51.02
8	Drugs, medicaments and biological substances causing adverse effects in therapeutic use ยา เครื่องยาและชีววัตถุที่เป็นสาเหตุให้เกิดอาการแทรกซ้อนเมื่อใช้ในการรักษา (Y40-Y59)	3,054	30.87
9	Accidental poisoning by and exposure to noxious substances การเป็นพิษโดยอุบัติเหตุ(X40-X49)	2,815	28.45
10	Assault การถูกทำร้าย (X85-Y09)	1,861	18.81

รวบรวม / วิเคราะห์ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สทส.)

ภาพ 10 สัดส่วนการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล จำแนกตามประเภทโรงพยาบาลและสิทธิการประกันสุขภาพ พ.ศ.2559



รวบรวม / วิเคราะห์ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สทส.)

ภาพ 10 จากการวิเคราะห์พบว่า สัดส่วนการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยใน ที่มีสิทธิการรักษาพยาบาลหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ส่วนใหญ่เข้ารับการรักษาในระดับ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลศูนย์ ตามลำดับ โดยที่ผู้ป่วยในที่ใช้สิทธิการรักษาพยาบาลสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ มีสัดส่วนการเข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาลรัฐสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและโรงพยาบาลรัฐอื่น มากกว่าผู้ป่วยในที่ใช้สิทธิอื่นๆ

ตาราง 17 จำนวนวันนอนเฉลี่ยผู้ป่วยใน จำแนกประเภทโรงพยาบาลและสิทธิการประกันสุขภาพ พ.ศ.2559

ประเภทโรงพยาบาล	รวม	หลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า	สวัสดิการ รักษายาบาล ข้าราชการ	อื่นๆ
โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
โรงพยาบาลศูนย์	5.08	4.96	5.97	6.12
โรงพยาบาลทั่วไป	4.47	4.36	5.62	5.04
โรงพยาบาลชุมชน	3.09	3.08	3.54	3.67
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอื่นๆ	11.76	13.20	9.73	7.76
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ	6.63	6.60	6.74	7.59
โรงพยาบาลรัฐ อื่นๆ	6.71	6.76	7.43	7.25
โรงพยาบาลเอกชน	3.49	3.19	16.46	5.12
รวม	4.38	4.22	5.78	5.56

ตาราง 17 จำนวนวันนอนเฉลี่ยของผู้ป่วยใน รวมเฉลี่ย 4.38 วัน สิทธิการรักษาสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ มีจำนวนวันเฉลี่ย สูงสุด 5.78 วัน และเฉลี่ยวันนอนผู้ป่วยใน สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 4.22 วัน เปรียบเทียบกับ วันนอนเฉลี่ย แยกตามประเภทโรงพยาบาล พบว่าโรงพยาบาลสังกัดภาครัฐอื่นๆ มีวันนอนเฉลี่ยสูงสุด 6.71 วัน รองลงมาคือ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 6.63 วัน โรงพยาบาลศูนย์ 5.08 วัน โรงพยาบาลทั่วไป 4.47 วัน และโรงพยาบาลชุมชน 3.09 วัน ตามลำดับ

ตาราง 18 จำนวนโรคเฉลี่ยที่ป่วยต่อครั้งของการนอนโรงพยาบาล จำแนกตามประเภทโรงพยาบาลและสิทธิการประกันสุขภาพ พ.ศ.2559

ประเภทโรงพยาบาล	รวม	หลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า	สวัสดิการ รักษายาบาล ข้าราชการ	อื่นๆ
โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
โรงพยาบาลศูนย์	3.18	3.24	3.55	3.25
โรงพยาบาลทั่วไป	2.86	2.89	3.30	3.13
โรงพยาบาลชุมชน	2.45	2.48	2.89	3.02
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอื่นๆ	3.00	3.01	3.43	3.11
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงศึกษา	4.09	4.02	4.34	3.85
โรงพยาบาลรัฐ อื่นๆ	3.47	3.53	3.86	3.54
โรงพยาบาลเอกชน	2.69	2.65	3.17	3.33
รวม	2.83	2.82	3.49	3.28

รวบรวม / วิเคราะห์ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สภส.)

จากตาราง 18 จำนวนโรคเฉลี่ยที่ป่วยต่อครั้งการนอนโรงพยาบาลเท่ากับ 2.83 เมื่อพิจารณาตามประเภทสิทธิการรักษาพยาบาลหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เท่ากับ 2.82 สวัสดิการรักษายาพยาบาลข้าราชการเท่ากับ 3.49 ส่วนสิทธิการรักษาอื่น ๆ เท่ากับ 3.28

ตาราง 19 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยผู้ป่วยใน จำแนกตามประเภทโรงพยาบาลและสิทธิการประกันสุขภาพ พ.ศ. 2559

ประเภทโรงพยาบาล	รวม	หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	สวัสดิการรักษายาพยาบาลข้าราชการ	อื่นๆ
โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
โรงพยาบาลศูนย์	22,410.51	22,876.01	30,195.87	22,763.76
โรงพยาบาลทั่วไป	14,440.24	14,720.97	20,311.01	13,941.51
โรงพยาบาลชุมชน	5,638.67	5,638.41	8,148.96	8,215.27
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอื่นๆ	30,439.76	29,981.89	42,235.21	35,544.17
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงศึกษา	64,119.27	55,303.05	67,343.86	429,157.13
โรงพยาบาลรัฐ อื่นๆ	32,139.37	29,167.12	44,928.50	34,501.48
โรงพยาบาลเอกชน	44,438.41	39,842.15	74,409.49	82,254.54
รวม	16,714.13	15,046.06	30,553.62	63,276.74

รวบรวม / วิเคราะห์ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษายาพยาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกล.)

จากตาราง 19 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งการนอนโรงพยาบาลคือ 16,714.13 บาท โดยสิทธิการรักษาพยาบาลสวัสดิการรักษายาพยาบาลข้าราชการ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งการนอนโรงพยาบาล คือ 30,553.62 บาท สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 15,046.06 บาท และสิทธิการรักษาอื่นๆ 63,276.74 บาท และจากการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ตามประเภทของโรงพยาบาล พบว่า โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อการนอนโรงพยาบาล 55,527.18 บาท โรงพยาบาลเอกชน 44,438.41 บาท โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอื่นๆ 32,139.37 บาท โรงพยาบาลรัฐอื่นๆ 30,218.97 บาทโรงพยาบาลศูนย์ 22,410.51 บาท โรงพยาบาลทั่วไป 14,440.24 บาท และโรงพยาบาลชุมชน 5,638.67 บาท ตามลำดับ

ผู้ป่วยใน

(รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย
เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2559

ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
รวมทุกกลุ่มโรค		รวม	19,740,850	30,364.23	3,794,354	32,518.48	4,648,037	28,016.61	2,786,289	30,074.56	6,695,913	30,586.92	1,816,257	32,439.69
		ชาย	9,356,225	29,334.94	1,836,363	32,049.61	2,169,661	26,912.00	1,260,287	27,611.08	3,206,981	29,426.89	882,933	33,442.98
		หญิง	10,384,625	31,355.48	1,957,991	32,970.87	2,478,376	29,060.83	1,526,002	32,466.88	3,488,932	31,736.91	933,324	31,544.45
001	Cholera (A00)	รวม	142	0.22	17	0.15	34	0.20	30	0.32	44	0.20	17	0.30
	อหิวาตกโรค	ชาย	81	0.25	10	0.17	20	0.25	19	0.42	24	0.22	8	0.30
		หญิง	61	0.18	7	0.12	14	0.16	11	0.23	20	0.18	9	0.30
002	Typhoid and paratyphoid fever (A01)	รวม	4,169	6.41	318	2.73	198	1.19	3,080	33.24	544	2.48	29	0.52
	ไข้รากสาดน้อยและไข้รากสาดเทียม	ชาย	2,199	6.89	180	3.14	113	1.40	1,595	34.94	293	2.69	18	0.68
		หญิง	1,970	5.95	138	2.32	85	1.00	1,485	31.59	251	2.28	11	0.37
003	Shigellosis (A03)	รวม	181	0.28	29	0.25	45	0.27	29	0.31	61	0.28	17	0.30
	โรคบิดจากเชื้อชีเกลลา	ชาย	90	0.28	16	0.28	20	0.25	16	0.35	30	0.28	8	0.30
		หญิง	91	0.27	13	0.22	25	0.29	13	0.28	31	0.28	9	0.30
004	Amoebiasis (A06)	รวม	3,730	5.74	1,120	9.60	508	3.06	1,168	12.61	902	4.12	32	0.57
	โรคบิดมีตัว	ชาย	1,678	5.26	496	8.66	245	3.04	521	11.41	395	3.62	21	0.80
		หญิง	2,052	6.20	624	10.51	263	3.08	647	13.77	507	4.61	11	0.37

ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
005	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin (A09) อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ	รวม	446,664	687.03	80,283	688.04	96,506	581.70	76,049	820.86	177,675	811.62	16,151	288.47
		ชาย	207,392	650.24	38,485	671.67	44,690	554.32	35,629	780.58	80,617	739.73	7,971	301.92
		หญิง	239,272	722.46	41,798	703.84	51,816	607.58	40,420	859.97	97,058	882.88	8,180	276.47
006	Other intestinal infectious diseases (A02, A04-A05, A07-A08) โรคลำไส้อักเสบอื่น ๆ	รวม	64,624	99.40	14,640	125.47	13,124	79.11	7,039	75.98	26,123	119.33	3,698	66.05
		ชาย	31,304	98.15	7,206	125.76	6,399	79.37	3,646	79.88	12,111	111.13	1,942	73.56
		หญิง	33,320	100.61	7,434	125.18	6,725	78.86	3,393	72.19	14,012	127.46	1,756	59.35
007	Respiratory tuberculosis (A15-A16) วัณโรคทางเดินหายใจ	รวม	70,132	107.87	11,465	98.26	16,714	100.75	7,758	83.74	29,382	134.22	4,813	85.96
		ชาย	48,846	153.15	8,158	142.38	11,866	147.18	5,626	123.26	19,817	181.84	3,379	127.99
		หญิง	21,286	64.27	3,307	55.69	4,848	56.85	2,132	45.36	9,565	87.01	1,434	48.47
008	Other Tuberculosis (A17-A19) วัณโรคอื่น ๆ	รวม	17,737	27.28	2,957	25.34	3,877	23.37	1,797	19.40	7,492	34.22	1,614	28.83
		ชาย	10,888	34.14	1,822	31.80	2,427	30.10	1,114	24.41	4,539	41.65	986	37.35
		หญิง	6,849	20.68	1,135	19.11	1,450	17.00	683	14.53	2,953	26.86	628	21.23
009	Plaque (A20) กาฬโรค	รวม	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
010	Brucellosis (A23) โรคติดเชื้อ布鲁เซลลา	รวม	14	0.02	4	0.03	1	0.01	2	0.02	1	0.00	6	0.11
		ชาย	10	0.03	3	0.05	1	0.01	1	0.02	1	0.01	4	0.15
		หญิง	4	0.01	1	0.02	0	0.00	1	0.02	0	0.00	2	0.07
011	Leprosy (A30) โรคเรื้อน	รวม	436	0.67	60	0.51	128	0.77	65	0.70	167	0.76	16	0.29
		ชาย	264	0.83	36	0.63	83	1.03	41	0.90	95	0.87	9	0.34
		หญิง	172	0.52	24	0.40	45	0.53	24	0.51	72	0.65	7	0.24
012	Tetanus neonatorum (A33) บาดทะยักในเด็กแรกเกิด	รวม	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00
		ชาย	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.01	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
013	Other tetanus (A34-A35) บาดทะยักอื่น ๆ	รวม	231	0.36	66	0.57	46	0.28	16	0.17	94	0.43	9	0.16
		ชาย	148	0.46	41	0.72	35	0.43	11	0.24	54	0.50	7	0.27
		หญิง	83	0.25	25	0.42	11	0.13	5	0.11	40	0.36	2	0.07
014	Diphtheria (A36) โรคคอตีบ	รวม	66	0.10	14	0.12	13	0.08	17	0.18	20	0.09	2	0.04
		ชาย	32	0.10	10	0.17	6	0.07	10	0.22	5	0.05	1	0.04
		หญิง	34	0.10	4	0.07	7	0.08	7	0.15	15	0.14	1	0.03
015	Whooping cough (A37) โรคไอกรน	รวม	76	0.12	6	0.05	15	0.09	28	0.30	18	0.08	9	0.16
		ชาย	31	0.10	3	0.05	7	0.09	9	0.20	8	0.07	4	0.15
		หญิง	45	0.14	3	0.05	8	0.09	19	0.40	10	0.09	5	0.17

ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
016	Meningococcal infection (A39) การติดเชื้อเมนิงโกคอคคัส	รวม	109	0.17	15	0.13	28	0.17	25	0.27	33	0.15	8	0.14
		ชาย	65	0.20	10	0.17	17	0.21	11	0.24	22	0.20	5	0.19
		หญิง	44	0.13	5	0.08	11	0.13	14	0.30	11	0.10	3	0.10
017	Septicemia (A40-A41) โลหิตเป็นพิษ	รวม	140,825	216.61	27,712	237.50	35,723	215.32	17,051	184.04	47,456	216.78	12,883	230.10
		ชาย	72,113	226.10	14,631	255.35	17,133	212.51	8,804	192.88	25,143	230.71	6,402	242.49
		หญิง	68,712	207.47	13,081	220.27	18,590	217.98	8,247	175.46	22,313	202.97	6,481	219.04
018	Other bacterial diseases (A21-A22, A24-A28, A31-A32, A38, A42-A49) โรคจากแบคทีเรียอื่น ๆ	รวม	58,920	90.63	7,918	67.86	7,014	42.28	11,348	122.49	31,469	143.75	1,171	20.91
		ชาย	33,754	105.83	4,517	78.83	3,776	46.84	6,394	140.08	18,438	169.18	629	23.82
		หญิง	25,166	75.99	3,401	57.27	3,238	37.97	4,954	105.40	13,031	118.54	542	18.32
019	Congenital syphilis (A50) ซิฟิลิสแต่กำเนิด	รวม	590	0.91	60	0.51	212	1.28	30	0.32	121	0.55	167	2.98
		ชาย	327	1.03	30	0.52	111	1.38	17	0.37	76	0.70	93	3.52
		หญิง	263	0.79	30	0.51	101	1.18	13	0.28	45	0.41	74	2.50
020	Early syphilis (A51) ซิฟิลิสระยะเริ่ม	รวม	221	0.34	36	0.31	45	0.27	24	0.26	89	0.41	27	0.48
		ชาย	148	0.46	25	0.44	30	0.37	16	0.35	61	0.56	16	0.61
		หญิง	73	0.22	11	0.19	15	0.18	8	0.17	28	0.25	11	0.37
021	Other syphilis (A52-A53) ซิฟิลิสอื่น ๆ	รวม	2,376	3.65	294	2.52	508	3.06	318	3.43	927	4.23	329	5.88
		ชาย	1,289	4.04	166	2.90	274	3.40	170	3.72	552	5.07	127	4.81
		หญิง	1,087	3.28	128	2.16	234	2.74	148	3.15	375	3.41	202	6.83

ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร
(ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ) หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
022	Gonococcal infection (A54) การติดเชื้อหนองใน	รวม	405	0.62	65	0.56	120	0.72	30	0.32	163	0.74	27	0.48
		ชาย	275	0.86	51	0.89	82	1.02	16	0.35	118	1.08	8	0.30
		หญิง	130	0.39	14	0.24	38	0.45	14	0.30	45	0.41	19	0.64
023	Sexually transmitted chlamydial diseases (A55-A56)	รวม	44	0.07	11	0.09	8	0.05	13	0.14	7	0.03	5	0.09
		ชาย	28	0.09	6	0.10	4	0.05	12	0.26	5	0.05	1	0.04
		หญิง	16	0.05	5	0.08	4	0.05	1	0.02	2	0.02	4	0.14
024	Other infections with a predominantly sexual mode of transmission (A57-A64) โรคติดเชื้ออื่น ๆ ที่ติดต่อทาง เพศสัมพันธ์เป็นส่วนใหญ่	รวม	2,622	4.03	499	4.28	714	4.30	253	2.73	842	3.85	314	5.61
		ชาย	684	2.14	151	2.64	164	2.03	55	1.20	226	2.07	88	3.33
		หญิง	1,938	5.85	348	5.86	550	6.45	198	4.21	616	5.60	226	7.64
025	Relapsing fever (A68) โรคไข้กลับซ้ำ	รวม	5	0.01	1	0.01	0	0.00	1	0.01	3	0.01	0	0.00
		ชาย	3	0.01	0	0.00	0	0.00	1	0.02	2	0.02	0	0.00
		หญิง	2	0.01	1	0.02	0	0.00	0	0.00	1	0.01	0	0.00
026	Trachoma (A71) โรคตาแดง	รวม	4	0.01	0	0.00	0	0.00	1	0.01	3	0.01	0	0.00
		ชาย	2	0.01	0	0.00	0	0.00	1	0.02	1	0.01	0	0.00
		หญิง	2	0.01	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.02	0	0.00
027	Typhus fever (A75) ไข้รากสาดใหญ่	รวม	11,548	17.76	4,107	35.20	713	4.30	3,076	33.20	3,566	16.29	86	1.54
		ชาย	6,431	20.16	2,285	39.88	402	4.99	1,783	39.06	1,915	17.57	46	1.74
		หญิง	5,117	15.45	1,822	30.68	311	3.65	1,293	27.51	1,651	15.02	40	1.35

ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
028	Acute poliomyelitis (A80) โรคโปลิโอเฉียบพลัน	รวม	268	0.41	52	0.45	75	0.45	26	0.28	69	0.32	46	0.82
		ชาย	135	0.42	29	0.51	29	0.36	14	0.31	41	0.38	22	0.83
		หญิง	133	0.40	23	0.39	46	0.54	12	0.26	28	0.25	24	0.81
029	Rabies (A82) โรคพิษสุนัขบ้า	รวม	12	0.02	2	0.02	4	0.02	3	0.03	2	0.01	1	0.02
		ชาย	9	0.03	1	0.02	3	0.04	2	0.04	2	0.02	1	0.04
		หญิง	3	0.01	1	0.02	1	0.01	1	0.02	0	0.00	0	0.00
030	Viral encephalitis (A83-A86) สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส	รวม	796	1.22	128	1.10	177	1.07	101	1.09	308	1.41	82	1.46
		ชาย	441	1.38	78	1.36	84	1.04	57	1.25	180	1.65	42	1.59
		หญิง	355	1.07	50	0.84	93	1.09	44	0.94	128	1.16	40	1.35
031	Yellow fever (A95) ไข้เหลือง	รวม	8	0.01	2	0.02	0	0.00	4	0.04	1	0.00	1	0.02
		ชาย	3	0.01	1	0.02	0	0.00	1	0.02	0	0.00	1	0.04
		หญิง	5	0.02	1	0.02	0	0.00	3	0.06	1	0.01	0	0.00
032	Other arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers (A90-A94, A96-A99) ไข้จากไวรัสที่นำโดยแมลงและ ไข้เลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่น ๆ	รวม	105,126	161.70	12,069	103.43	13,919	83.90	48,425	522.69	27,475	125.51	3,238	57.83
		ชาย	52,682	165.18	5,936	103.60	7,182	89.08	23,831	522.10	14,009	128.54	1,724	65.30
		หญิง	52,444	158.35	6,133	103.27	6,737	79.00	24,594	523.26	13,466	122.49	1,514	51.17

ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
033	Herpesviral infection (B00) เริ่ม	รวม	5,900	9.08	1,301	11.15	1,275	7.69	526	5.68	2,105	9.62	693	12.38
		ชาย	2,702	8.47	612	10.68	582	7.22	213	4.67	994	9.12	301	11.40
		หญิง	3,198	9.66	689	11.60	693	8.13	313	6.66	1,111	10.11	392	13.25
034	Varicella and zoster (B01-B02) อีสุกอีใสและงูสวัด	รวม	10,594	16.30	2,019	17.30	2,302	13.88	1,618	17.46	3,844	17.56	811	14.49
		ชาย	4,981	15.62	972	16.96	1,071	13.28	779	17.07	1,789	16.42	370	14.01
		หญิง	5,613	16.95	1,047	17.63	1,231	14.43	839	17.85	2,055	18.69	441	14.90
035	Measles (B05) หัด	รวม	2,668	4.10	40	0.34	153	0.92	2,265	24.45	111	0.51	99	1.77
		ชาย	1,423	4.46	25	0.44	96	1.19	1,181	25.87	69	0.63	52	1.97
		หญิง	1,245	3.76	15	0.25	57	0.67	1,084	23.06	42	0.38	47	1.59
036	Rubella (B06) หัดเยอรมัน	รวม	45	0.07	7	0.06	11	0.07	10	0.11	14	0.06	3	0.05
		ชาย	27	0.08	4	0.07	5	0.06	6	0.13	10	0.09	2	0.08
		หญิง	18	0.05	3	0.05	6	0.07	4	0.09	4	0.04	1	0.03
037	Acute hepatitis B (B16) ตับอักเสบเฉียบพลันชนิดบี	รวม	6,274	9.65	1,344	11.52	1,445	8.71	609	6.57	2,515	11.49	361	6.45
		ชาย	4,100	12.85	876	15.29	912	11.31	404	8.85	1,681	15.42	227	8.60
		หญิง	2,174	6.56	468	7.88	533	6.25	205	4.36	834	7.59	134	4.53
038	Other viral hepatitis (B15, B17-B19) ตับอักเสบจากไวรัสอื่น ๆ	รวม	48,633	74.80	10,194	87.36	9,294	56.02	4,269	46.08	16,804	76.76	8,072	144.17
		ชาย	32,946	103.30	7,034	122.76	5,975	74.11	2,845	62.33	11,561	106.08	5,531	209.50
		หญิง	15,687	47.37	3,160	53.21	3,319	38.92	1,424	30.30	5,243	47.69	2,541	85.88

ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
039	Human immunodeficiency virus	รวม	69,257	106.53	13,580	116.38	19,784	119.25	8,823	95.23	21,549	98.44	5,521	98.61
	[HIV] disease (B20-B24)	ชาย	39,967	125.31	7,647	133.46	11,221	139.18	5,137	112.54	12,525	114.93	3,437	130.18
	ภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากไวรัส	หญิง	29,290	88.44	5,933	99.91	8,563	100.41	3,686	78.42	9,024	82.09	2,084	70.43
040	Mumps (B26)	รวม	149	0.23	21	0.18	31	0.19	35	0.38	55	0.25	7	0.13
	คางทูม	ชาย	85	0.27	13	0.23	19	0.24	19	0.42	29	0.27	5	0.19
		หญิง	64	0.19	8	0.13	12	0.14	16	0.34	26	0.24	2	0.07
041	Other viral diseases (A81,	รวม	56,487	86.89	10,609	90.92	14,120	85.11	11,726	126.57	16,848	76.96	3,184	56.87
	A87-A89, B03-B04, B07-B09,	ชาย	30,295	94.99	5,821	101.59	7,650	94.89	6,145	134.63	8,899	81.66	1,780	67.42
	B25, B27-B34)โรคจากไวรัสอื่น	หญิง	26,192	79.08	4,788	80.63	6,470	75.87	5,581	118.74	7,949	72.31	1,404	47.45
042	Mycoses (B35-B49)	รวม	27,819	42.79	5,883	50.42	6,611	39.85	3,319	35.82	8,539	39.01	3,467	61.92
	โรคติดเชื้อรา	ชาย	15,221	47.72	3,249	56.70	3,568	44.26	1,764	38.65	4,734	43.44	1,906	72.19
		หญิง	12,598	38.04	2,634	44.35	3,043	35.68	1,555	33.08	3,805	34.61	1,561	52.76
043	Malaria (B50-B54)	รวม	3,436	5.29	293	2.51	491	2.96	2,037	21.99	584	2.67	31	0.55
	มาลาเรีย	ชาย	2,159	6.77	195	3.40	344	4.27	1,091	23.90	509	4.67	20	0.76
		หญิง	1,277	3.86	98	1.65	147	1.72	946	20.13	75	0.68	11	0.37
044	Leishmaniasis (B55)	รวม	35	0.05	15	0.13	0	0.00	18	0.19	2	0.01	0	0.00
	โรคไลชมาเนีย	ชาย	35	0.11	15	0.26	0	0.00	18	0.39	2	0.02	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
045	Trypanosomiasis (B56-B57) โรคทริปาโนโซม	รวม	36	0.06	5	0.04	8	0.05	8	0.09	11	0.05	4	0.07
		ชาย	14	0.04	2	0.03	5	0.06	4	0.09	3	0.03	0	0.00
		หญิง	22	0.07	3	0.05	3	0.04	4	0.09	8	0.07	4	0.14
046	Schistosomiasis (B65) โรคติดเชื้อซิสโตโซม	รวม	12	0.02	1	0.01	1	0.01	3	0.03	6	0.03	1	0.02
		ชาย	9	0.03	0	0.00	0	0.00	3	0.07	5	0.05	1	0.04
		หญิง	3	0.01	1	0.02	1	0.01	0	0.00	1	0.01	0	0.00
047	Other fluke infections (B66) โรคพยาธิใบไม้อื่น ๆ	รวม	713	1.10	183	1.57	20	0.12	3	0.03	499	2.28	8	0.14
		ชาย	405	1.27	94	1.64	14	0.17	1	0.02	290	2.66	6	0.23
		หญิง	308	0.93	89	1.50	6	0.07	2	0.04	209	1.90	2	0.07
048	Echinococcosis (B67) โรคพยาธิเอคคิโนคอกคัส	รวม	17	0.03	5	0.04	1	0.01	1	0.01	7	0.03	3	0.05
		ชาย	10	0.03	2	0.03	1	0.01	1	0.02	4	0.04	2	0.08
		หญิง	7	0.02	3	0.05	0	0.00	0	0.00	3	0.03	1	0.03
049	Dracunculiasis (B72) โรคพยาธิจิ้งจอกคันคูลัส	รวม	1	0.00	0	0.00	1	0.01	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		ชาย	1	0.00	0	0.00	1	0.01	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
050	Onchocerciasis (B73) โรคพยาธิออนโคเชอร์คา	รวม	2	0.00	0	0.00	1	0.01	0	0.00	1	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	2	0.01	0	0.00	1	0.01	0	0.00	1	0.01	0	0.00

ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
051	Filariasis (B74)	รวม	36	0.06	2	0.02	3	0.02	19	0.21	7	0.03	5	0.09
	โรคพยาธิฟิลาเรีย	ชาย	24	0.08	1	0.02	2	0.02	14	0.31	4	0.04	3	0.11
		หญิง	12	0.04	1	0.02	1	0.01	5	0.11	3	0.03	2	0.07
052	Hookworm diseases (B76)	รวม	499	0.77	50	0.43	62	0.37	228	2.46	154	0.70	5	0.09
	โรคพยาธิปากขอ	ชาย	254	0.80	22	0.38	34	0.42	126	2.76	68	0.62	4	0.15
		หญิง	245	0.74	28	0.47	28	0.33	102	2.17	86	0.78	1	0.03
053	Other helminthiasis	รวม	7,968	12.26	2,138	18.32	674	4.06	797	8.60	4,147	18.94	212	3.79
	(B68-B71, B75, B77-B83)	ชาย	5,194	16.28	1,455	25.39	424	5.26	461	10.10	2,722	24.98	132	5.00
	โรคพยาธิตัวตืดอื่น ๆ	หญิง	2,774	8.38	683	11.50	250	2.93	336	7.15	1,425	12.96	80	2.70
054	Sequelae of tuberculosis	รวม	27,126	41.72	3,417	29.28	5,902	35.58	3,431	37.03	12,333	56.34	2,043	36.49
	(B90)	ชาย	18,201	57.07	2,390	41.71	4,118	51.08	2,463	53.96	7,815	71.71	1,415	53.60
	ผลตามหลังวัณโรค	หญิง	8,925	26.95	1,027	17.29	1,784	20.92	968	20.59	4,518	41.10	628	21.23
055	Sequelae of poliomyelitis	รวม	79	0.12	19	0.16	19	0.11	4	0.04	18	0.08	19	0.34
	(B91)	ชาย	46	0.14	15	0.26	9	0.11	4	0.09	10	0.09	8	0.30
	ผลตามหลังโรคโปลิโอ	หญิง	33	0.10	4	0.07	10	0.12	0	0.00	8	0.07	11	0.37
056	Sequelae of leprosy (B92)	รวม	52	0.08	7	0.06	3	0.02	4	0.04	37	0.17	1	0.02
	ผลตามหลังโรคเรื้อน	ชาย	30	0.09	1	0.02	2	0.02	3	0.07	23	0.21	1	0.04
		หญิง	22	0.07	6	0.10	1	0.01	1	0.02	14	0.13	0	0.00

ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร
(ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
057	Other infectious and parasitic diseases (A65-A67, A69-A70, A74, A77-A79, B58-B64, B85-B89, B94, B99) โรคติดเชื้อและปรสิตอื่น ๆ	รวม	10,991	16.91	2,174	18.63	2,133	12.86	2,755	29.74	3,183	14.54	746	13.32
		ชาย	6,195	19.42	1,244	21.71	1,157	14.35	1,599	35.03	1,829	16.78	366	13.86
		หญิง	4,796	14.48	930	15.66	976	11.44	1,156	24.59	1,354	12.32	380	12.84
058	Malignant neoplasm of lip, oral cavity and pharynx (C00-C14) เนื้องอกร้ายของริมฝีปาก ช่องปาก และคอหอย	รวม	24,293	37.37	3,782	32.41	6,040	36.41	2,988	32.25	6,781	30.98	4,702	83.98
		ชาย	17,487	54.83	2,677	46.72	4,670	57.93	2,299	50.37	4,240	38.91	3,601	136.40
		หญิง	6,806	20.55	1,105	18.61	1,370	16.06	689	14.66	2,541	23.11	1,101	37.21
059	Malignant neoplasm of oesophagus (C15) เนื้องอกร้ายที่หลอดอาหาร	รวม	9,641	14.83	1,441	12.35	3,284	19.79	1,608	17.36	1,779	8.13	1,529	27.31
		ชาย	8,448	26.49	1,228	21.43	2,870	35.60	1,424	31.20	1,545	14.18	1,381	52.31
		หญิง	1,193	3.60	213	3.59	414	4.85	184	3.91	234	2.13	148	5.00
060	Malignant neoplasm of stomach (C16) เนื้องอกร้ายที่กระเพาะอาหาร	รวม	11,270	17.33	2,921	25.03	2,304	13.89	773	8.34	3,629	16.58	1,643	29.35
		ชาย	6,305	19.77	1,571	27.42	1,278	15.85	494	10.82	2,090	19.18	872	33.03
		หญิง	4,965	14.99	1,350	22.73	1,026	12.03	279	5.94	1,539	14.00	771	26.06
061	Malignant neoplasm of colon (C18) เนื้องอกร้ายของลำไส้ใหญ่	รวม	54,274	83.48	10,601	90.85	12,462	75.12	6,024	65.02	16,022	73.19	9,165	163.69
		ชาย	27,855	87.33	5,363	93.60	6,357	78.85	3,131	68.60	7,922	72.69	5,082	192.49
		หญิง	26,419	79.77	5,238	88.20	6,105	71.59	2,893	61.55	8,100	73.68	4,083	138.00

ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
066	Malignant neoplasm of larynx (C32) เนื้องอกร้ายที่กล่องเสียง	รวม	5,096	7.84	776	6.65	1,509	9.10	747	8.06	1,142	5.22	922	16.47
		ชาย	4,715	14.78	705	12.30	1,402	17.39	696	15.25	1,056	9.69	856	32.42
		หญิง	381	1.15	71	1.20	107	1.25	51	1.09	86	0.78	66	2.23
067	Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung (C33-C34) เนื้องอกร้ายที่หลอดคอ หลอดลม และปอด	รวม	42,067	64.71	11,273	96.61	9,027	54.41	4,597	49.62	11,672	53.32	5,498	98.20
		ชาย	26,100	81.83	6,734	117.53	5,750	71.32	2,963	64.92	7,337	67.32	3,316	125.60
		หญิง	15,967	48.21	4,539	76.43	3,277	38.43	1,634	34.76	4,335	39.43	2,182	73.75
068	Other malignant neoplasm of respiratory and intrathoracic organs (C30-C31, C37-C39) เนื้องอกร้ายที่อวัยวะหายใจและอวัยวะช่องอก	รวม	2,616	4.02	470	4.03	499	3.01	215	2.32	661	3.02	771	13.77
		ชาย	1,717	5.38	311	5.43	348	4.32	117	2.56	448	4.11	493	18.67
		หญิง	899	2.71	159	2.68	151	1.77	98	2.09	213	1.94	278	9.40
069	Malignant neoplasm of bone and articular cartilage (C40-C41) เนื้องอกร้ายที่กระดูกและกระดูกอ่อนผิวข้อ	รวม	3,475	5.35	495	4.24	454	2.74	361	3.90	1,163	5.31	1,002	17.90
		ชาย	1,932	6.06	286	4.99	242	3.00	194	4.25	664	6.09	546	20.68
		หญิง	1,543	4.66	209	3.52	212	2.49	167	3.55	499	4.54	456	15.41
070	Malignant melanoma of skin (C43) เนื้องอกร้ายที่เมลาโนมาของผิวหนัง	รวม	786	1.21	156	1.34	151	0.91	76	0.82	245	1.12	158	2.82
		ชาย	411	1.29	75	1.31	79	0.98	40	0.88	145	1.33	72	2.73
		หญิง	375	1.13	81	1.36	72	0.84	36	0.77	100	0.91	86	2.91
071	Other malignant neoplasm of skin (C44) เนื้องอกร้ายที่ผิวหนังอื่น ๆ	รวม	2,709	4.17	549	4.71	628	3.79	273	2.95	802	3.66	457	8.16
		ชาย	1,356	4.25	292	5.10	345	4.28	129	2.83	381	3.50	209	7.92
		หญิง	1,353	4.09	257	4.33	283	3.32	144	3.06	421	3.83	248	8.38

ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
072	Malignant neoplasm of mesothelial and soft tissue (C45-C49) เนื้องอกร้ายที่เมโสซีเรียลและเนื้อเยื่ออ่อน	รวม	5,217	8.02	993	8.51	799	4.82	582	6.28	1,397	6.38	1,446	25.83
		ชาย	2,333	7.31	404	7.05	313	3.88	280	6.13	692	6.35	644	24.39
		หญิง	2,884	8.71	589	9.92	486	5.70	302	6.43	705	6.41	802	27.11
073	Malignant neoplasm of breast (C50) เนื้องอกร้ายที่เต้านม	รวม	43,801	67.37	10,701	91.71	9,221	55.58	4,669	50.40	12,212	55.78	6,998	124.99
		ชาย	385	1.21	59	1.03	81	1.00	44	0.96	121	1.11	80	3.03
		หญิง	43,416	131.09	10,642	179.20	9,140	107.17	4,625	98.40	12,091	109.99	6,918	233.81
074	Malignant neoplasm of cervix uteri (C53) เนื้องอกร้ายที่ปากมดลูก	รวม	24,147	72.91	4,982	83.89	6,152	72.14	2,507	53.34	6,222	56.60	4,284	144.79
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	24,147	72.91	4,982	83.89	6,152	72.14	2,507	53.34	6,222	56.60	4,284	144.79
075	Malignant neoplasm of other and unspecified parts of uterus (C54-C55) เนื้องอกร้ายอื่น ๆ ที่มีได้ ระบุส่วนของมดลูก	รวม	10,292	31.08	1,660	27.95	1,882	22.07	798	16.98	3,003	27.32	2,949	99.67
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	10,292	31.08	1,660	27.95	1,882	22.07	798	16.98	3,003	27.32	2,949	99.67
076	Other malignant neoplasm of female genital organs (C51-C52, C56-C58) เนื้องอกร้ายของอวัยวะสืบพันธุ์หญิง	รวม	19,704	59.49	3,003	50.57	3,183	37.32	1,496	31.83	6,567	59.74	5,455	184.37
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	19,704	59.49	3,003	50.57	3,183	37.32	1,496	31.83	6,567	59.74	5,455	184.37

ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
077	Malignant neoplasm of prostate (C61)	รวม	9,934	31.15	1,885	32.90	2,226	27.61	1,352	29.62	2,265	20.78	2,206	83.56
		ชาย	9,934	31.15	1,885	32.90	2,226	27.61	1,352	29.62	2,265	20.78	2,206	83.56
	เนื้องอกร้ายที่ต่อมลูกหมาก	หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
078	Other malignant neoplasms of male genital organs (C60, C62-C63)	รวม	2,373	7.44	309	5.39	474	5.88	334	7.32	938	8.61	318	12.04
		ชาย	2,373	7.44	309	5.39	474	5.88	334	7.32	938	8.61	318	12.04
	เนื้องอกร้ายของอวัยวะสืบพันธุ์ชาย	หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
079	Malignant neoplasm of bladder (C67)	รวม	11,054	17.00	2,071	17.75	2,234	13.47	1,725	18.62	2,771	12.66	2,253	40.24
		ชาย	8,710	27.31	1,504	26.25	1,731	21.47	1,498	32.82	2,236	20.52	1,741	65.94
	เนื้องอกร้ายที่กระเพาะปัสสาวะ	หญิง	2,344	7.08	567	9.55	503	5.90	227	4.83	535	4.87	512	17.30
080	Other malignant neoplasm of urinary tract (C64-C66, C68)	รวม	3,667	5.64	771	6.61	587	3.54	414	4.47	951	4.34	944	16.86
		ชาย	2,390	7.49	492	8.59	349	4.33	260	5.70	673	6.18	616	23.33
	เนื้องอกร้ายอื่น ๆ ที่ท่อปัสสาวะ	หญิง	1,277	3.86	279	4.70	238	2.79	154	3.28	278	2.53	328	11.09
081	Malignant neoplasm of eye and adnexa (C69)	รวม	911	1.40	168	1.44	64	0.39	110	1.19	173	0.79	396	7.07
		ชาย	469	1.47	103	1.80	37	0.46	58	1.27	85	0.78	186	7.05
	เนื้องอกร้ายของตาและส่วนประกอบ	หญิง	442	1.33	65	1.09	27	0.32	52	1.11	88	0.80	210	7.10
082	Malignant neoplasm of brain (C71)	รวม	4,582	7.05	694	5.95	701	4.23	675	7.29	1,311	5.99	1,201	21.45
		ชาย	2,519	7.90	349	6.09	385	4.78	406	8.89	686	6.29	693	26.25
	เนื้องอกร้ายของสมอง	หญิง	2,063	6.23	345	5.81	316	3.71	269	5.72	625	5.69	508	17.17

ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
083	Malignant neoplasm of other parts of central nervous system (C70, C72)	รวม	533	0.82	84	0.72	133	0.80	83	0.90	146	0.67	87	1.55
		ชาย	229	0.72	42	0.73	42	0.52	43	0.94	54	0.50	48	1.82
	เนื้องอกร้ายที่ส่วนอื่น ๆ ของระบบประสาทส่วนกลาง	หญิง	304	0.92	42	0.71	91	1.07	40	0.85	92	0.84	39	1.32
084	Malignant neoplasm of other, ill-defined, secondary, unspecified and multiple sites (C73-C80, C97)	รวม	162,951	250.64	32,092	275.04	28,059	169.13	13,482	145.52	49,856	227.74	39,462	704.82
		ชาย	76,856	240.97	15,646	273.07	13,452	166.86	6,880	150.73	24,519	224.98	16,359	619.63
	เนื้องอกอื่น ๆ และที่ไม่ทราบสาเหตุ	หญิง	86,095	259.96	16,446	276.94	14,607	171.28	6,602	140.46	25,337	230.48	23,103	780.83
085	Hodgkin's disease (C81)	รวม	1,850	2.85	265	2.27	319	1.92	208	2.25	525	2.40	533	9.52
	โรคฮอดกินส์	ชาย	1,127	3.53	172	3.00	190	2.36	131	2.87	329	3.02	305	11.55
		หญิง	723	2.18	93	1.57	129	1.51	77	1.64	196	1.78	228	7.71
086	Non-Hodgkin's lymphoma (C82-C85)	รวม	20,600	31.69	3,499	29.99	3,791	22.85	2,073	22.38	6,842	31.25	4,395	78.50
		ชาย	11,774	36.92	2,115	36.91	2,193	27.20	1,130	24.76	3,919	35.96	2,417	91.55
	เนื้องอกร้ายลิมโฟมาที่มีไขโรคฮอดกินส์	หญิง	8,826	26.65	1,384	23.31	1,598	18.74	943	20.06	2,923	26.59	1,978	66.85

ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
087	Leukaemia (C91-C95)	รวม	22,756	35.00	3,934	33.72	4,623	27.87	3,099	33.45	7,591	34.68	3,509	62.67
	ลิวคีเมีย	ชาย	12,557	39.37	2,167	37.82	2,459	30.50	1,661	36.39	4,274	39.22	1,996	75.60
		หญิง	10,199	30.80	1,767	29.75	2,164	25.37	1,438	30.59	3,317	30.17	1,513	51.14
088	Other malignant neoplasm of lymphoid, haematopoietic and related tissue (C88-C90, C96)	รวม	6,311	9.71	1,119	9.59	1,134	6.84	691	7.46	2,231	10.19	1,136	20.29
		ชาย	3,241	10.16	593	10.35	538	6.67	347	7.60	1,200	11.01	563	21.32
	เนื้องอกร้ายอื่น ๆ ของลิมโฟยด์ ระบบสร้างเม็ดเลือดและเนื้อเยื่อ	หญิง	3,070	9.27	526	8.86	596	6.99	344	7.32	1,031	9.38	573	19.37
089	Carcinoma in situ of cervix uteri (D06)	รวม	1,511	4.56	238	4.01	384	4.50	184	3.91	549	4.99	156	5.27
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	มะเร็งจำกัดเฉพาะที่ของปากมดลูก	หญิง	1,511	4.56	238	4.01	384	4.50	184	3.91	549	4.99	156	5.27
090	Benign neoplasm of skin (D22-D23)	รวม	975	1.50	136	1.17	115	0.69	162	1.75	347	1.59	215	3.84
	เนื้องอกไม่ร้ายของผิวหนัง	ชาย	377	1.18	46	0.80	48	0.60	62	1.36	126	1.16	95	3.60
		หญิง	598	1.81	90	1.52	67	0.79	100	2.13	221	2.01	120	4.06
091	Benign neoplasm of breast (D24)	รวม	1,348	2.07	191	1.64	292	1.76	239	2.58	445	2.03	181	3.23
	เนื้องอกไม่ร้ายของเต้านม	ชาย	6	0.02	1	0.02	1	0.01	0	0.00	4	0.04	0	0.00
		หญิง	1,342	4.05	190	3.20	291	3.41	239	5.08	441	4.01	181	6.12

ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
092	Leiomyoma of uterus (D25) ไลโอไมโอมาที่มดลูก	รวม	26,905	81.24	3,807	64.11	4,811	56.41	3,229	68.70	10,261	93.34	4,797	162.13
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	26,905	81.24	3,807	64.11	4,811	56.41	3,229	68.70	10,261	93.34	4,797	162.13
093	Benign neoplasm of ovary (D27) เนื้องอกไม่ร้ายที่รังไข่	รวม	3,133	9.46	566	9.53	468	5.49	466	9.91	993	9.03	640	21.63
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	3,133	9.46	566	9.53	468	5.49	466	9.91	993	9.03	640	21.63
094	Benign neoplasm of urinary organs (D30) เนื้องอกไม่ร้ายที่ระบบปัสสาวะ	รวม	236	0.36	48	0.41	71	0.43	24	0.26	54	0.25	39	0.70
		ชาย	123	0.39	24	0.42	41	0.51	17	0.37	31	0.28	10	0.38
		หญิง	113	0.34	24	0.40	30	0.35	7	0.15	23	0.21	29	0.98
095	Benign neoplasm of brain and other parts of central nervous system (D33) เนื้องอกไม่ร้ายของสมองและส่วนอื่นของระบบ ประสาทส่วนกลาง	รวม	1,659	2.55	311	2.67	392	2.36	216	2.33	357	1.63	383	6.84
		ชาย	702	2.20	115	2.01	170	2.11	88	1.93	167	1.53	162	6.14
		หญิง	957	2.89	196	3.30	222	2.60	128	2.72	190	1.73	221	7.47
096	Other in situ and benign neoplasms and neoplasms of uncertain and unknown behaviour (D00-D05, D07-D21, D26,D28-D29 D31-D32, D34-D48) เนื้องอกไม่ร้ายจำกัดเฉพาะที่อื่น ๆ และเนื้องอก บางชนิดที่ไม่ทราบพฤติกรรม	รวม	57,392	88.28	10,404	89.16	11,627	70.08	6,715	72.48	18,982	86.71	9,664	172.61
		ชาย	24,974	78.30	4,627	80.75	5,022	62.29	3,014	66.03	8,360	76.71	3,951	149.65
		หญิง	32,418	97.88	5,777	97.28	6,605	77.45	3,701	78.74	10,622	96.62	5,713	193.09

ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
097	Iron deficiency anaemia (D50) โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก	รวม	113,903	175.20	20,463	175.37	26,244	158.19	21,052	227.23	39,088	178.55	7,056	126.03
		ชาย	48,583	152.32	9,658	168.56	10,612	131.63	8,493	186.07	16,786	154.03	3,034	114.92
		หญิง	65,320	197.23	10,805	181.95	15,632	183.30	12,559	267.20	22,302	202.87	4,022	135.94
098	Other anaemia (D51-D64) โลหิตจางอื่น ๆ	รวม	775,171	1,192.32	158,514	1,358.50	177,919	1,072.43	80,574	869.70	296,901	1,356.24	61,263	1,094.20
		ชาย	353,559	1,108.53	74,989	1,308.77	80,901	1,003.48	34,955	765.81	135,149	1,240.11	27,565	1,044.08
		หญิง	421,612	1,273.02	83,525	1,406.49	97,018	1,137.61	45,619	970.58	161,752	1,471.37	33,698	1,138.92
099	Haemorrhagic conditions and other diseases of blood and blood forming organs (D65-D77) ภาวะเลือดออกอื่น ๆ โรคเลือดและอวัยวะที่ สร้างเลือด	รวม	171,705	264.11	32,685	280.12	34,834	209.97	18,385	198.44	67,661	309.08	18,140	323.99
		ชาย	98,283	308.15	18,713	326.59	18,998	235.65	10,262	224.83	40,408	370.78	9,902	375.06
		หญิง	73,422	221.69	13,972	235.28	15,836	185.69	8,123	172.82	27,253	247.91	8,238	278.43
100	Certain disorders involving the immune mechanism (D80-D89) ความผิดปกติที่เกี่ยวกับกลไกของภูมิคุ้มกัน	รวม	1,755	2.70	260	2.23	348	2.10	166	1.79	358	1.64	623	11.13
		ชาย	1,189	3.73	166	2.90	257	3.19	119	2.61	267	2.45	380	14.39
		หญิง	566	1.71	94	1.58	91	1.07	47	1.00	91	0.83	243	8.21
101	Iodine deficiency related thyroid disorders (E00-E02) การขาดไอโอดีนที่มีความสัมพันธ์กับต่อมธัย รอยด์	รวม	1,100	1.69	223	1.91	232	1.40	96	1.04	314	1.43	235	4.20
		ชาย	382	1.20	75	1.31	90	1.12	26	0.57	120	1.10	71	2.69
		หญิง	718	2.17	148	2.49	142	1.67	70	1.49	194	1.76	164	5.54

ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
102	Thyrotoxicosis (E05) โรคพิษธัยรอยด์	รวม	34,527	53.11	6,995	59.95	7,609	45.86	3,706	40.00	13,374	61.09	2,843	50.78
		ชาย	9,261	29.04	1,701	29.69	2,084	25.85	1,071	23.46	3,572	32.78	833	31.55
		หญิง	25,266	76.29	5,294	89.15	5,525	64.78	2,635	56.06	9,802	89.16	2,010	67.93
103	Other disorders of thyroid (E03-E04, E06-E07) ความผิดปกติของต่อมธัยรอยด์อื่น ๆ	รวม	38,231	58.80	7,067	60.57	8,667	52.24	4,794	51.75	11,638	53.16	6,065	108.33
		ชาย	8,688	27.24	1,653	28.85	1,914	23.74	1,044	22.87	2,372	21.77	1,705	64.58
		หญิง	29,543	89.20	5,414	91.17	6,753	79.18	3,750	79.78	9,266	84.29	4,360	147.36
104	Diabetes mellitus (E10-E14) เบาหวาน	รวม	840,489	1,292.79	141,704	1,214.44	207,673	1,251.77	93,134	1,005.27	322,138	1,471.53	75,840	1,354.56
		ชาย	332,605	1,042.83	56,781	990.99	80,910	1,003.59	36,527	800.25	124,002	1,137.83	34,385	1,302.41
		หญิง	507,884	1,533.51	84,923	1,430.03	126,763	1,486.39	56,607	1,204.36	198,136	1,802.33	41,455	1,401.09
105	Malnutrition (E40-E46) ทุพโภชนาการ	รวม	21,457	33.00	3,198	27.41	4,285	25.83	3,061	33.04	6,722	30.71	4,191	74.85
		ชาย	12,161	38.13	1,859	32.44	2,440	30.27	1,712	37.51	4,005	36.75	2,145	81.25
		หญิง	9,296	28.07	1,339	22.55	1,845	21.63	1,349	28.70	2,717	24.72	2,046	69.15
106	Vitamin A deficiency (E50) การขาดวิตามินเอ	รวม	111	0.17	16	0.14	16	0.10	15	0.16	25	0.11	39	0.70
		ชาย	48	0.15	10	0.17	4	0.05	8	0.18	9	0.08	17	0.64
		หญิง	63	0.19	6	0.10	12	0.14	7	0.15	16	0.15	22	0.74
107	Other vitamin deficiencies (E51-E56) การขาดวิตามินอื่น ๆ	รวม	3,157	4.86	294	2.52	360	2.17	123	1.33	588	2.69	1,792	32.01
		ชาย	1,561	4.89	174	3.04	179	2.22	58	1.27	350	3.21	800	30.30
		หญิง	1,596	4.82	120	2.02	181	2.12	65	1.38	238	2.16	992	33.53

ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
108	Sequelae of malnutrition and other nutritional deficiencies (E64) ผลที่ตามมาของภาวะทุพโภชนาการและภาวะ พร่องโภชนาการอื่น ๆ	รวม	66	0.10	17	0.15	21	0.13	5	0.05	18	0.08	5	0.09
		ชาย	36	0.11	11	0.19	8	0.10	3	0.07	10	0.09	4	0.15
		หญิง	30	0.09	6	0.10	13	0.15	2	0.04	8	0.07	1	0.03
109	Obesity (E66) โรคอ้วน	รวม	14,090	21.67	1,624	13.92	3,603	21.72	2,363	25.51	3,563	16.28	2,937	52.46
		ชาย	4,885	15.32	641	11.19	1,241	15.39	608	13.32	1,230	11.29	1,165	44.13
		หญิง	9,205	27.79	983	16.55	2,362	27.70	1,755	37.34	2,333	21.22	1,772	59.89
110	Volume depletion (E86) การขาดปริมาณของเหลวในร่างกาย	รวม	95,800	147.35	18,869	161.71	25,477	153.57	18,934	204.37	26,145	119.43	6,375	113.86
		ชาย	48,901	153.32	9,699	169.27	13,449	166.82	9,299	203.73	13,129	120.47	3,325	125.94
		หญิง	46,899	141.61	9,170	154.41	12,028	141.04	9,635	204.99	13,016	118.40	3,050	103.08
111	Other Endocrine, nutritional and metabolic disorders (E15-E35, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E90)	รวม	2,115,915	3,254.58	448,886	3,847.06	541,059	3,261.30	253,117	2,732.09	680,044	3,106.44	192,809	3,443.71
		ชาย	1,010,878	3,169.44	213,783	3,731.10	250,464	3,106.70	118,128	2,588.01	335,066	3,074.53	93,437	3,539.13
		หญิง	1,105,037	3,336.56	235,103	3,958.93	290,595	3,407.45	134,989	2,872.00	344,978	3,138.08	99,372	3,358.57
112	Dementia (F00-F03) สมองเสื่อม	รวม	11,692	17.98	2,152	18.44	3,157	19.03	935	10.09	2,802	12.80	2,646	47.26
		ชาย	5,064	15.88	958	16.72	1,280	15.88	423	9.27	1,260	11.56	1,143	43.29
		หญิง	6,628	20.01	1,194	20.11	1,877	22.01	512	10.89	1,542	14.03	1,503	50.80

ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
113	Mental and behavioral disorders due to use of alcohol (F10) ความผิดปกติของพฤติกรรมและจิตประสาทที่เกิดจากการเสพยา	รวม	112,033	172.32	28,778	246.63	20,108	121.20	6,658	71.86	52,585	240.21	3,904	69.73
		ชาย	100,494	315.08	25,970	453.25	17,367	215.42	6,240	136.71	47,423	435.15	3,494	132.34
		หญิง	11,539	34.84	2,808	47.28	2,741	32.14	418	8.89	5,162	46.96	410	13.86
114	Mental and behavioral disorders due to other psychoactive substance use (F11-F19) ความผิดปกติทางพฤติกรรมและจิตประสาทที่เกิดจากการใช้วัตถุ	รวม	26,999	41.53	4,130	35.40	7,388	44.53	4,808	51.90	7,519	34.35	3,154	56.33
		ชาย	23,831	74.72	3,458	60.35	6,445	79.94	4,526	99.16	6,834	62.71	2,568	97.27
		หญิง	3,168	9.57	672	11.32	943	11.06	282	6.00	685	6.23	586	19.81
115	Schizophrenia, schizotypal and delusional disorders (F20-F29) จิตเภท พฤติกรรมแบบจิตเภทและความหลงผิด	รวม	61,698	94.90	10,342	88.63	11,062	66.68	6,856	74.00	27,774	126.87	5,664	101.16
		ชาย	39,127	122.68	6,064	105.83	6,419	79.62	4,708	103.15	18,528	170.01	3,408	129.09
		หญิง	22,571	68.15	4,278	72.04	4,643	54.44	2,148	45.70	9,246	84.11	2,256	76.25
116	Mood(affective) disorders (F30-F39) ความผิดปกติทางอารมณ์	รวม	37,444	57.59	10,121	86.74	7,225	43.55	5,213	56.27	11,962	54.64	2,923	52.21
		ชาย	12,474	39.11	3,522	61.47	2,434	30.19	1,693	37.09	3,613	33.15	1,212	45.91
		หญิง	24,970	75.39	6,599	111.12	4,791	56.18	3,520	74.89	8,349	75.95	1,711	57.83

ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
117	Neurotic, stress related and somatoform disorders (F40-F48) โรคประสาท อาการทางกายที่เกิดจากจิตใจและความเครียด	รวม	27,491	42.29	6,198	53.12	5,709	34.41	4,370	47.17	9,579	43.76	1,635	29.20
		ชาย	8,199	25.71	1,879	32.79	1,993	24.72	1,294	28.35	2,398	22.00	635	24.05
		หญิง	19,292	58.25	4,319	72.73	3,716	43.57	3,076	65.44	7,181	65.32	1,000	33.80
118	Mental retardation (F70-F79) ภาวะปัญญาอ่อน	รวม	7,257	11.16	894	7.66	1,226	7.39	527	5.69	1,638	7.48	2,972	53.08
		ชาย	4,179	13.10	444	7.75	693	8.60	285	6.24	898	8.24	1,859	70.41
		หญิง	3,078	9.29	450	7.58	533	6.25	242	5.15	740	6.73	1,113	37.62
119	Other mental and behavioral disorders (F04-F09, F50-F69, F80-F99) ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมอื่น ๆ	รวม	48,050	73.91	10,426	89.35	11,520	69.44	3,920	42.31	13,660	62.40	8,524	152.24
		ชาย	28,153	88.27	6,291	109.80	6,882	85.36	2,310	50.61	7,443	68.30	5,227	197.98
		หญิง	19,897	60.08	4,135	69.63	4,638	54.38	1,610	34.25	6,217	56.55	3,297	111.43
120	Inflammatory diseases of the central nervous system (G00-G09)	รวม	28,059	43.16	5,604	48.03	5,378	32.42	2,307	24.90	12,681	57.93	2,089	37.31
		ชาย	17,058	53.48	3,465	60.47	3,257	40.40	1,386	30.37	7,790	71.48	1,160	43.94
		หญิง	11,001	33.22	2,139	36.02	2,121	24.87	921	19.59	4,891	44.49	929	31.40
121	Parkinson's disease (G20) โรคพาคินสัน	รวม	16,845	25.91	3,136	26.88	4,498	27.11	1,732	18.69	4,509	20.60	2,970	53.05
		ชาย	8,117	25.45	1,537	26.82	2,054	25.48	842	18.45	2,169	19.90	1,515	57.38
		หญิง	8,728	26.35	1,599	26.93	2,444	28.66	890	18.94	2,340	21.29	1,455	49.18

ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
122	Alzheimer's disease (G30) โรคอัลไซเมอร์	รวม	7,179	11.04	1,258	10.78	1,843	11.11	735	7.93	1,562	7.14	1,781	31.81
		ชาย	2,742	8.60	489	8.53	676	8.38	268	5.87	651	5.97	658	24.92
		หญิง	4,437	13.40	769	12.95	1,167	13.68	467	9.94	911	8.29	1,123	37.96
123	Multiple sclerosis (G35) มัลติเปิล สเคลอโรสิส	รวม	443	0.68	113	0.97	60	0.36	61	0.66	130	0.59	79	1.41
		ชาย	79	0.25	19	0.33	14	0.17	7	0.15	19	0.17	20	0.76
		หญิง	364	1.10	94	1.58	46	0.54	54	1.15	111	1.01	59	1.99
124	Epilepsy (G40-G41) ลมบ้าหมู	รวม	82,698	127.20	17,542	150.34	18,501	111.52	11,247	121.40	28,412	129.79	6,996	124.95
		ชาย	50,688	158.92	10,911	190.43	11,428	141.75	6,793	148.82	17,527	160.83	4,029	152.61
		หญิง	32,010	96.65	6,631	111.66	7,073	82.94	4,454	94.76	10,885	99.01	2,967	100.28
125	Migraine and other headache syndromes (G43-G44) โรคไมเกรนและกลุ่มอาการปวด	รวม	16,820	25.87	2,876	24.65	3,406	20.53	3,001	32.39	6,836	31.23	701	12.52
		ชาย	5,298	16.61	858	14.97	1,007	12.49	994	21.78	2,253	20.67	186	7.05
		หญิง	11,522	34.79	2,018	33.98	2,399	28.13	2,007	42.70	4,583	41.69	515	17.41
126	Transient cerebral ischaemic attacks and related syndromes (G45) โรคเลือดไปเลี้ยงสมองน้อย ชั่วคราวและกลุ่มอาการต่อเนื่อง	รวม	11,803	18.15	2,228	19.09	2,926	17.64	1,820	19.64	3,743	17.10	1,086	19.40
		ชาย	6,394	20.05	1,214	21.19	1,603	19.88	1,027	22.50	1,985	18.21	565	21.40
		หญิง	5,409	16.33	1,014	17.07	1,323	15.51	793	16.87	1,758	15.99	521	17.61

ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
127	Nerve, nerve root and plexus disorders (G50-G59) ความผิดปกติของเส้นประสาท ราก	รวม	12,732	19.58	2,652	22.73	2,350	14.16	1,539	16.61	4,085	18.66	2,106	37.61
		ชาย	5,589	17.52	1,097	19.15	1,025	12.71	634	13.89	1,865	17.11	968	36.67
		หญิง	7,143	21.57	1,555	26.18	1,325	15.54	905	19.25	2,220	20.19	1,138	38.46
128	Cerebral palsy and other paralytic syndromes (G80-G83) สมองพิการและกลุ่มอาการอัมพาตอื่น ๆ	รวม	49,270	75.78	7,805	66.89	10,081	60.76	6,703	72.35	18,908	86.37	5,773	103.11
		ชาย	30,112	94.41	4,941	86.23	6,122	75.94	4,075	89.28	11,704	107.39	3,270	123.86
		หญิง	19,158	57.85	2,864	48.23	3,959	46.42	2,628	55.91	7,204	65.53	2,503	84.60
129	Other diseases of the nervous system (G10-G13, G21-G26, G31-G32, G36-G37, G46-G47, G60-G73, G90-G99) โรคของระบบประสาทอื่น ๆ	รวม	101,767	156.53	18,476	158.34	19,675	118.59	10,159	109.65	38,458	175.68	14,999	267.89
		ชาย	56,360	176.71	10,496	183.18	10,375	128.69	5,591	122.49	21,850	200.49	8,048	304.84
		หญิง	45,407	137.10	7,980	134.38	9,300	109.05	4,568	97.19	16,608	151.07	6,951	234.93
130	Inflammation of eyelid (H00-H01) การอักเสบของหนังตา	รวม	3,117	4.79	562	4.82	631	3.80	491	5.30	1,202	5.49	231	4.13
		ชาย	1,524	4.78	276	4.82	293	3.63	264	5.78	573	5.26	118	4.47
		หญิง	1,593	4.81	286	4.82	338	3.96	227	4.83	629	5.72	113	3.82
131	Conjunctivitis and other disorders of conjunctiva (H10-H13) เยื่อบุตาอักเสบและความผิดปกติของเยื่อ	รวม	20,379	31.35	4,204	36.03	5,086	30.66	2,153	23.24	7,798	35.62	1,138	20.33
		ชาย	8,669	27.18	1,897	33.11	2,210	27.41	931	20.40	3,014	27.66	617	23.37
		หญิง	11,710	35.36	2,307	38.85	2,876	33.72	1,222	26.00	4,784	43.52	521	17.61

ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
132	Keratitis and other disorders of sclera and cornea (H15-H19) กระจกตาอักเสบและความผิดปกติของตาขาวและกระจกตาอื่น ๆ	รวม	10,811	16.63	1,872	16.04	2,127	12.82	1,144	12.35	4,133	18.88	1,535	27.42
		ชาย	6,330	19.85	1,104	19.27	1,226	15.21	700	15.34	2,446	22.44	854	32.35
		หญิง	4,481	13.53	768	12.93	901	10.56	444	9.45	1,687	15.35	681	23.02
133	Cataract and other disorders of sclera and cornea (H25-H28) ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ	รวม	217,129	333.98	45,470	389.69	61,406	370.13	22,852	246.66	62,783	286.79	24,618	439.70
		ชาย	93,863	294.29	20,184	352.27	25,331	314.20	9,891	216.70	27,347	250.93	11,110	420.82
		หญิง	123,266	372.19	25,286	425.79	36,075	423.01	12,961	275.76	35,436	322.34	13,508	456.54
134	Retinal detachments and breaks (H33) จอประสาทตาหลุดออกและรอยฉีกของจอประสาทตา	รวม	7,899	12.15	1,250	10.71	2,070	12.48	738	7.97	1,423	6.50	2,418	43.19
		ชาย	4,570	14.33	685	11.96	1,212	15.03	419	9.18	827	7.59	1,427	54.05
		หญิง	3,329	10.05	565	9.51	858	10.06	319	6.79	596	5.42	991	33.49
135	Glaucoma (H40-H42) ต้อหิน	รวม	21,702	33.38	4,445	38.09	5,029	30.31	2,502	27.01	5,855	26.75	3,871	69.14
		ชาย	10,453	32.77	2,103	36.70	2,381	29.53	1,273	27.89	2,604	23.89	2,092	79.24
		หญิง	11,249	33.97	2,342	39.44	2,648	31.05	1,229	26.15	3,251	29.57	1,779	60.13
136	Strabismus (H49-H50) ตาเหล่	รวม	3,125	4.81	398	3.41	497	3.00	475	5.13	778	3.55	977	17.45
		ชาย	1,508	4.73	203	3.54	254	3.15	243	5.32	356	3.27	452	17.12
		หญิง	1,617	4.88	195	3.28	243	2.85	232	4.94	422	3.84	525	17.74
137	Disorders of refraction and accommodation (H52) ความผิดปกติของสายตาและการเพ่งมอง	รวม	1,362	2.09	218	1.87	307	1.85	196	2.12	257	1.17	384	6.86
		ชาย	645	2.02	88	1.54	141	1.75	110	2.41	121	1.11	185	7.01
		หญิง	717	2.16	130	2.19	166	1.95	86	1.83	136	1.24	199	6.73

ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
138	Blindness and low vision (H54) ตาบอดและสายตาสั้นกลาง	รวม	210,366	323.57	44,019	377.25	58,443	352.27	21,986	237.31	62,236	284.29	23,682	422.98
		ชาย	90,239	282.93	19,382	338.27	23,807	295.30	9,401	205.96	27,098	248.65	10,551	399.64
		หญิง	120,127	362.71	24,637	414.87	34,636	406.13	12,585	267.76	35,138	319.63	13,131	443.80
139	Other diseases of the eye and adnexa (H02-H06, H20-H22, H30-H32, H34-H36, H43-H48, H51, H53, H55-H59) โรคของตาและส่วนประกอบของตาอื่น ๆ	รวม	46,264	71.16	7,088	60.75	10,011	60.34	5,497	59.33	12,724	58.12	10,944	195.47
		ชาย	21,829	68.44	3,305	57.68	4,701	58.31	2,695	59.04	5,736	52.63	5,392	204.23
		หญิง	24,435	73.78	3,783	63.70	5,310	62.26	2,802	59.61	6,988	63.57	5,552	187.65
140	Otitis media and other disorders of middle ear and mastoid (H65-H75) หูชั้นกลางอักเสบและความผิดปกติของหู ชั้นกลางและปุ่มกกหูอื่น ๆ	รวม	9,275	14.27	1,879	16.10	1,699	10.24	1,873	20.22	2,385	10.89	1,439	25.70
		ชาย	4,766	14.94	913	15.93	923	11.45	964	21.12	1,230	11.29	736	27.88
		หญิง	4,509	13.61	966	16.27	776	9.10	909	19.34	1,155	10.51	703	23.76
141	Hearing loss (H90-H91) การสูญเสียการได้ยิน	รวม	3,526	5.42	580	4.97	695	4.19	321	3.46	1,051	4.80	879	15.70
		ชาย	1,899	5.95	352	6.14	356	4.42	173	3.79	549	5.04	469	17.76
		หญิง	1,627	4.91	228	3.84	339	3.98	148	3.15	502	4.57	410	13.86

ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
142	Other diseases of the ear and mastoid process (H60-H62, H80-H83, H92-H95) โรคของหูและปุ่มกกหูอื่น ๆ	รวม	26,919	41.41	4,417	37.85	6,338	38.20	5,132	55.39	9,480	43.30	1,552	27.72
		ชาย	8,606	26.98	1,530	26.70	1,910	23.69	1,617	35.43	2,959	27.15	590	22.35
		หญิง	18,313	55.29	2,887	48.61	4,428	51.92	3,515	74.78	6,521	59.32	962	32.51
143	Acute rheumatic fever (I00-I02) ไข้รูมาติกเฉียบพลัน	รวม	572	0.88	69	0.59	122	0.74	119	1.28	208	0.95	54	0.96
		ชาย	257	0.81	26	0.45	57	0.71	47	1.03	105	0.96	22	0.83
		หญิง	315	0.95	43	0.72	65	0.76	72	1.53	103	0.94	32	1.08
144	Chronic rheumatic heart disease (I05-I09) โรคหัวใจรูมาติกเรื้อรัง	รวม	26,788	41.20	6,081	52.12	5,178	31.21	2,606	28.13	9,607	43.88	3,316	59.23
		ชาย	10,444	32.75	2,294	40.04	1,936	24.01	914	20.02	3,973	36.46	1,327	50.26
		หญิง	16,344	49.35	3,787	63.77	3,242	38.01	1,692	36.00	5,634	51.25	1,989	67.22
145	Essential (primary) hypertension (I10) ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุ	รวม	1,295,968	1,993.38	260,470	2,232.29	343,863	2,072.68	162,716	1,756.32	397,403	1,815.34	131,516	2,348.97
		ชาย	558,481	1,751.03	113,833	1,986.70	144,724	1,795.12	71,488	1,566.20	166,973	1,532.13	61,463	2,328.04
		หญิง	737,487	2,226.78	146,637	2,469.24	199,139	2,335.06	91,228	1,940.95	230,430	2,096.10	70,053	2,367.65
146	Other hypertensive diseases (I11-I15) โรคความดันโลหิตสูงอื่น ๆ	รวม	10,102	15.54	1,393	11.94	2,294	13.83	2,213	23.89	2,633	12.03	1,569	28.02
		ชาย	4,699	14.73	601	10.49	1,000	12.40	1,152	25.24	1,180	10.83	766	29.01
		หญิง	5,403	16.31	792	13.34	1,294	15.17	1,061	22.57	1,453	13.22	803	27.14
147	Acute myocardial infarction (I21-I22) กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน	รวม	82,427	126.78	14,781	126.68	24,914	150.17	13,649	147.32	20,788	94.96	8,295	148.15
		ชาย	47,760	149.74	7,616	132.92	14,006	173.73	8,943	195.93	12,093	110.96	5,102	193.25
		หญิง	34,667	104.67	7,165	120.65	10,908	127.90	4,706	100.12	8,695	79.09	3,193	107.92

ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
148	Other ischaemic heart diseases	รวม	245,026	376.88	40,146	344.06	75,184	453.18	35,585	384.10	56,608	258.59	37,503	669.83
	(I20, I23-I25)	ชาย	137,972	432.59	20,463	357.14	39,920	495.16	22,752	498.46	31,897	292.68	22,940	868.90
	โรคหัวใจขาดเลือดอื่น ๆ	หญิง	107,054	323.24	19,683	331.44	35,264	413.50	12,833	273.03	24,711	224.78	14,563	492.20
149	Pulmonary embolism (I26)	รวม	5,958	9.16	959	8.22	1,357	8.18	850	9.17	1,374	6.28	1,418	25.33
	ก้อนเลือดอุดตันในหลอดเลือดใหญ่ของ	ชาย	2,246	7.04	389	6.79	471	5.84	338	7.41	521	4.78	527	19.96
	ปอด	หญิง	3,712	11.21	570	9.60	886	10.39	512	10.89	853	7.76	891	30.11
150	Conduction disorders and cardiac	รวม	235,107	361.63	47,759	409.31	56,571	340.99	24,614	265.68	79,434	362.85	26,729	477.40
	arrhythmias (I44-I49)	ชาย	112,478	352.66	22,315	389.46	26,581	329.70	12,061	264.24	38,296	351.40	13,225	500.93
	ความผิดปกติของการนำกระแสไฟฟ้า	หญิง	122,629	370.27	25,444	428.45	29,990	351.66	12,553	267.07	41,138	374.21	13,504	456.41
151	Heart failure (I50)	รวม	193,018	296.89	40,282	345.23	54,285	327.21	32,562	351.47	49,665	226.87	16,224	289.77
	หัวใจล้มเหลว	ชาย	85,103	266.83	16,885	294.69	23,033	285.70	14,976	328.10	22,481	206.28	7,728	292.71
		หญิง	107,915	325.84	23,397	393.99	31,252	366.45	17,586	374.16	27,184	247.28	8,496	287.15
152	Other heart diseases (I27-I43,	รวม	120,151	184.81	22,179	190.08	29,040	175.04	14,267	153.99	36,945	168.76	17,720	316.49
	I51-I52)	ชาย	59,050	185.14	11,066	193.13	13,789	171.04	6,778	148.50	18,560	170.30	8,857	335.48
	โรคหัวใจอื่น ๆ	หญิง	61,101	184.49	11,113	187.13	15,251	178.83	7,489	159.33	18,385	167.24	8,863	299.55
153	Intracranial haemorrhage (I60-I62)	รวม	56,920	87.55	12,529	107.38	15,888	95.77	6,700	72.32	16,281	74.37	5,522	98.63
	เลือดออกในสมอง	ชาย	33,985	106.55	7,426	129.60	9,433	117.00	3,966	86.89	9,961	91.40	3,199	121.17
		หญิง	22,935	69.25	5,103	85.93	6,455	75.69	2,734	58.17	6,320	57.49	2,323	78.51

ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
154	Cerebral infraction (I63) เนื้อสมองตาย	รวม	104,322	160.46	18,494	158.50	28,502	171.80	14,420	155.65	34,332	156.83	8,574	153.14
		ชาย	56,156	176.07	9,843	171.79	15,294	189.70	7,912	173.34	18,408	168.91	4,699	177.98
		หญิง	48,166	145.43	8,651	145.68	13,208	154.87	6,508	138.46	15,924	144.85	3,875	130.97
155	Stroke, not specified as haemorrhage or infarction (I64) เป็นลมหมดสติที่ไม่จัดกลุ่มว่าเป็นจาก เลือดออกในสมองหรือเนื้อสมองตายจาก การขาดเลือด	รวม	23,349	35.91	4,432	37.98	5,203	31.36	3,660	39.51	8,738	39.92	1,316	23.50
		ชาย	12,593	39.48	2,364	41.26	2,807	34.82	1,918	42.02	4,768	43.75	736	27.88
		หญิง	10,756	32.48	2,068	34.82	2,396	28.09	1,742	37.06	3,970	36.11	580	19.60
156	Other cerebrovascular diseases (I65-I69) โรคหลอดเลือดในสมองอื่น ๆ	รวม	108,872	167.46	20,317	174.12	30,558	184.19	14,210	153.38	30,509	139.37	13,278	237.15
		ชาย	59,876	187.73	11,265	196.61	16,429	203.78	8,067	176.74	16,888	154.96	7,227	273.74
		หญิง	48,996	147.94	9,052	152.43	14,129	165.67	6,143	130.70	13,621	123.90	6,051	204.51
157	Atherosclerosis (I70) อะเทอโรสเคลอโรซิส	รวม	2,316	3.56	271	2.32	429	2.59	227	2.45	203	0.93	1,186	21.18
		ชาย	1,224	3.84	134	2.34	232	2.88	126	2.76	108	0.99	624	23.64
		หญิง	1,092	3.30	137	2.31	197	2.31	101	2.15	95	0.86	562	18.99
158	Other peripheral vascular diseases (I73) โรคหลอดเลือดส่วนปลายอื่น ๆ	รวม	1,974	3.04	296	2.54	535	3.22	292	3.15	360	1.64	491	8.77
		ชาย	1,137	3.56	158	2.76	308	3.82	172	3.77	214	1.96	285	10.79
		หญิง	837	2.53	138	2.32	227	2.66	120	2.55	146	1.33	206	6.96

ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
159	Aterial embolism and thrombosis (I74) ลิ่มเลือดและก้อนเลือดอุดตันที่หลอดเลือด	รวม	6,268	9.64	1,213	10.40	1,446	8.72	849	9.16	1,883	8.60	877	15.66
		ชาย	3,495	10.96	659	11.50	787	9.76	516	11.30	1,030	9.45	503	19.05
		หญิง	2,773	8.37	554	9.33	659	7.73	333	7.08	853	7.76	374	12.64
160	Other disease of arteries, arterioles and capillaries (I71-I72, I77-I79) โรคของหลอดเลือดแดง หลอดเลือดแดง ย่อยและแคปิลารีอื่น ๆ	รวม	16,019	24.64	2,981	25.55	3,247	19.57	2,153	23.24	4,645	21.22	2,993	53.46
		ชาย	9,605	30.11	1,631	28.47	1,946	24.14	1,389	30.43	2,722	24.98	1,917	72.61
		หญิง	6,414	19.37	1,350	22.73	1,301	15.26	764	16.25	1,923	17.49	1,076	36.37
161	Phlebitis, thrombophlebitis, venous embolism and thrombosis (I80-I82) หลอดเลือดดำอักเสบ หลอดเลือดดำ	รวม	25,199	38.76	4,881	41.83	5,178	31.21	2,951	31.85	8,070	36.86	4,119	73.57
		ชาย	10,619	33.29	2,092	36.51	2,041	25.32	1,273	27.89	3,544	32.52	1,669	63.22
		หญิง	14,580	44.02	2,789	46.96	3,137	36.78	1,678	35.70	4,526	41.17	2,450	82.81
162	Varicose veins of lower extremities (I83) หลอดเลือดดำขอดของระยะส่วนล่าง	รวม	1,691	2.60	267	2.29	552	3.33	221	2.39	286	1.31	365	6.52
		ชาย	669	2.10	96	1.68	224	2.78	83	1.82	126	1.16	140	5.30
		หญิง	1,022	3.09	171	2.88	328	3.85	138	2.94	160	1.46	225	7.60
163	Haemorrhoids (I84) ริดสีดวงทวาร	รวม	20,468	31.48	4,465	38.27	4,467	26.93	2,931	31.64	6,466	29.54	2,139	38.20
		ชาย	11,664	36.57	2,743	47.87	2,505	31.07	1,682	36.85	3,612	33.14	1,122	42.50
		หญิง	8,804	26.58	1,722	29.00	1,962	23.01	1,249	26.57	2,854	25.96	1,017	34.37
164	Other diseases of the circulatory system (I85-I99) โรคอื่น ๆ ของระบบไหลเวียนโลหิต	รวม	53,455	82.22	15,028	128.79	12,558	75.69	5,182	55.93	15,891	72.59	4,796	85.66
		ชาย	32,533	102.00	9,121	159.19	7,537	93.49	3,032	66.43	9,994	91.70	2,849	107.91
		หญิง	20,922	63.17	5,907	99.47	5,021	58.88	2,150	45.74	5,897	53.64	1,947	65.80

ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
165	Acute pharyngitis and acute tonsillitis (J02-J03) คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิล	รวม	95,860	147.45	21,302	182.56	23,786	143.37	18,223	196.69	29,080	132.84	3,469	61.96
		ชาย	49,665	155.72	11,402	199.00	12,559	155.78	9,202	201.60	14,740	135.25	1,762	66.74
		หญิง	46,195	139.48	9,900	166.71	11,227	131.65	9,021	191.93	14,340	130.44	1,707	57.69
166	Acute laryngitis and tracheitis (J04) กล่องเสียงและหลอดลมใหญ่อักเสบเฉียบพลัน	รวม	1,118	1.72	202	1.73	228	1.37	109	1.18	438	2.00	141	2.52
		ชาย	626	1.96	105	1.83	123	1.53	73	1.60	249	2.28	76	2.88
		หญิง	492	1.49	97	1.63	105	1.23	36	0.77	189	1.72	65	2.20
167	Other acute upper respiratory infections (J00-J01, J05-J06) การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ	รวม	88,315	135.84	15,829	135.66	21,715	130.89	16,159	174.42	29,987	136.98	4,625	82.61
		ชาย	46,718	146.48	8,610	150.27	12,010	148.97	8,004	175.36	15,637	143.48	2,457	93.06
		หญิง	41,597	125.60	7,219	121.56	9,705	113.80	8,155	173.50	14,350	130.53	2,168	73.27
168	Influenza (J09-J11) ไข้หวัดใหญ่	รวม	53,048	81.60	9,900	84.85	14,405	86.83	5,950	64.22	17,495	79.92	5,298	94.63
		ชาย	27,497	86.21	5,269	91.96	7,616	94.47	3,010	65.94	8,859	81.29	2,743	103.90
		หญิง	25,551	77.15	4,631	77.98	6,789	79.61	2,940	62.55	8,636	78.56	2,555	86.35
169	Pneumonia (J12-J18) ปอดบวม	รวม	514,823	791.87	91,929	787.85	119,150	718.19	75,696	817.05	199,291	910.36	28,757	513.62
		ชาย	289,141	906.55	51,835	904.66	66,483	824.64	43,098	944.22	111,373	1,021.95	16,352	619.37
		หญิง	225,682	681.43	40,094	675.15	52,667	617.56	32,598	693.55	87,918	799.74	12,405	419.26
170	Acute bronchitis and acute bronchiolitis (J20-J21) หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน	รวม	187,747	288.78	35,457	303.87	40,589	244.66	33,630	362.99	71,212	325.30	6,859	122.51
		ชาย	102,480	321.31	19,541	341.04	21,814	270.58	18,556	406.54	38,752	355.58	3,817	144.58
		หญิง	85,267	257.46	15,916	268.01	18,775	220.15	15,074	320.71	32,460	295.27	3,042	102.81

ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
171	Chronic sinusitis (J32) ไซนัสอักเสบเรื้อรัง	รวม	6,205	9.54	1,217	10.43	1,413	8.52	645	6.96	1,820	8.31	1,110	19.83
		ชาย	3,278	10.28	673	11.75	719	8.92	327	7.16	955	8.76	604	22.88
		หญิง	2,927	8.84	544	9.16	694	8.14	318	6.77	865	7.87	506	17.10
172	Other diseases of nose and nasal sinuses (J30-J31, J33-J34) โรคอื่นของจมูกและไซนัส	รวม	15,510	23.86	2,781	23.83	4,253	25.64	1,935	20.89	3,436	15.70	3,105	55.46
		ชาย	8,402	26.34	1,507	26.30	2,296	28.48	1,016	22.26	1,856	17.03	1,727	65.41
		หญิง	7,108	21.46	1,274	21.45	1,957	22.95	919	19.55	1,580	14.37	1,378	46.57
173	Chronic diseases of tonsils and adenoids (J35) โรคเรื้อรังของต่อมทอนซิลและต่อม น้ำเหลืองในคอ	รวม	9,524	14.65	1,761	15.09	1,986	11.97	1,260	13.60	2,825	12.90	1,692	30.22
		ชาย	5,211	16.34	964	16.82	1,093	13.56	653	14.31	1,448	13.29	1,053	39.88
		หญิง	4,313	13.02	797	13.42	893	10.47	607	12.91	1,377	12.53	639	21.60
174	Other diseases of upper respiratory tract (J36-J39) โรคอื่น ๆ ของระบบหายใจส่วนบน	รวม	8,139	12.52	1,477	12.66	1,494	9.01	1,101	11.88	2,427	11.09	1,640	29.29
		ชาย	4,631	14.52	867	15.13	856	10.62	640	14.02	1,383	12.69	885	33.52
		หญิง	3,508	10.59	610	10.27	638	7.48	461	9.81	1,044	9.50	755	25.52
175	Bronchitis, emphysema and other chronic obstructive pulmonary diseases (J40-J44) โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและ ปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น	รวม	254,507	391.47	72,510	621.43	54,048	325.78	48,283	521.16	69,095	315.63	10,571	188.81
		ชาย	187,127	586.71	45,948	801.92	41,839	518.96	36,474	799.09	54,716	502.07	8,150	308.70
		หญิง	67,380	203.45	26,562	447.28	12,209	143.16	11,809	251.25	14,379	130.80	2,421	81.82

ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
176	Asthma (J45-J46) โรคหืด	รวม	119,037	183.10	16,311	139.79	28,668	172.80	22,479	242.63	43,613	199.22	7,966	142.28
		ชาย	44,763	140.35	6,093	106.34	10,707	132.81	8,013	175.55	16,774	153.92	3,176	120.30
		หญิง	74,274	224.26	10,218	172.06	17,961	210.61	14,466	307.78	26,839	244.14	4,790	161.89
177	Bronchioectasis (J47) โรคหลอดลมเล็กโป่งพอง	รวม	15,155	23.31	2,643	22.65	2,783	16.77	1,887	20.37	6,651	30.38	1,191	21.27
		ชาย	7,168	22.47	1,376	24.02	1,285	15.94	795	17.42	3,104	28.48	608	23.03
		หญิง	7,987	24.12	1,267	21.34	1,498	17.57	1,092	23.23	3,547	32.27	583	19.70
178	Pneumoconiosis (J60-J65) โรคฝุ่นสะสมในปอด	รวม	269	0.41	24	0.21	33	0.20	34	0.37	159	0.73	19	0.34
		ชาย	214	0.67	16	0.28	16	0.20	27	0.59	144	1.32	11	0.42
		หญิง	55	0.17	8	0.13	17	0.20	7	0.15	15	0.14	8	0.27
179	Other diseases of the respiratory system (J22, J66-J99) โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินหายใจ	รวม	339,697	522.50	67,757	580.69	75,873	457.33	46,409	500.93	121,290	554.05	28,368	506.67
		ชาย	198,864	623.51	39,111	682.59	43,281	536.85	27,742	607.79	72,984	669.69	15,746	596.41
		หญิง	140,833	425.23	28,646	482.37	32,592	382.17	18,667	397.16	48,306	439.41	12,622	426.60
180	Dental caries (K02) ฟันผุ	รวม	8,184	12.59	1,589	13.62	1,941	11.70	1,128	12.18	2,159	9.86	1,367	24.42
		ชาย	4,425	13.87	875	15.27	1,065	13.21	626	13.71	1,097	10.07	762	28.86
		หญิง	3,759	11.35	714	12.02	876	10.27	502	10.68	1,062	9.66	605	20.45
181	Other disorders of teeth and supporting structures (K00-K01, K03-K08) ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง	รวม	17,560	27.01	4,383	37.56	3,073	18.52	2,002	21.61	6,105	27.89	1,997	35.67
		ชาย	9,578	30.03	2,555	44.59	1,671	20.73	1,086	23.79	3,088	28.34	1,178	44.62
		หญิง	7,982	24.10	1,828	30.78	1,402	16.44	916	19.49	3,017	27.44	819	27.68

ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
182	Other diseases of the oral cavity, salivary glands and jaws (K09-K14) โรคอื่น ๆ ของช่องปาก ต่อมน้ำลายและขากรรไกร	รวม	20,619	31.71	3,939	33.76	3,801	22.91	2,457	26.52	8,661	39.56	1,761	31.45
		ชาย	10,395	32.59	1,984	34.63	1,954	24.24	1,292	28.31	4,245	38.95	920	34.85
		หญิง	10,224	30.87	1,955	32.92	1,847	21.66	1,165	24.79	4,416	40.17	841	28.42
183	Gastric and duodenal ulcer (K25-K27) แผลเปื่อยของกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น	รวม	40,926	62.95	9,475	81.20	11,226	67.67	3,399	36.69	13,075	59.73	3,751	67.00
		ชาย	26,671	83.62	6,121	106.83	7,049	87.43	2,075	45.46	9,121	83.69	2,305	87.31
		หญิง	14,255	43.04	3,354	56.48	4,177	48.98	1,324	28.17	3,954	35.97	1,446	48.87
184	Gastritis and duodenitis (K29) กระเพาะอาหารอักเสบและลำไส้เล็กส่วนต้นอักเสบ	รวม	97,356	149.75	17,353	148.72	23,872	143.89	15,462	166.89	33,729	154.07	6,940	123.95
		ชาย	51,337	160.96	9,218	160.88	12,378	153.53	7,751	169.81	18,434	169.15	3,556	134.69
		หญิง	46,019	138.95	8,135	136.99	11,494	134.78	7,711	164.06	15,295	139.13	3,384	114.37
185	Other diseases of oesophagus, stomach and duodenum (K20-K23, K28, K30-K31) โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและลำไส้เล็กส่วนต้น	รวม	167,053	256.95	31,496	269.93	31,610	190.53	31,541	340.45	65,761	300.40	6,645	118.68
		ชาย	72,527	227.40	13,513	235.84	13,642	169.21	13,490	295.55	28,624	262.65	3,258	123.40
		หญิง	94,526	285.41	17,983	302.82	17,968	210.69	18,051	384.05	37,137	337.82	3,387	114.47
186	Diseases of appendix (K35-K38) โรคของไส้ติ่ง	รวม	93,714	144.15	19,234	164.84	19,616	118.24	12,623	136.25	36,478	166.63	5,763	102.93
		ชาย	44,090	138.24	9,118	159.13	9,511	117.97	6,081	133.23	16,418	150.65	2,962	112.19
		หญิง	49,624	149.84	10,116	170.34	10,105	118.49	6,542	139.19	20,060	182.47	2,801	94.67
187	Inguinal hernia (K40) ไส้เลื่อนที่บริเวณขาหนีบ	รวม	34,319	52.79	7,686	65.87	7,312	44.07	5,426	58.57	10,690	48.83	3,205	57.24
		ชาย	32,347	101.42	7,257	126.65	6,911	85.72	5,075	111.19	10,119	92.85	2,985	113.06
		หญิง	1,972	5.95	429	7.22	401	4.70	351	7.47	571	5.19	220	7.44

ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
188	Other hernia (K41-K46) ไส้เลื่อนอื่น ๆ	รวม	6,282	9.66	1,191	10.21	1,677	10.11	880	9.50	1,345	6.14	1,189	21.24
		ชาย	2,819	8.84	523	9.13	700	8.68	407	8.92	673	6.18	516	19.54
		หญิง	3,463	10.46	668	11.25	977	11.46	473	10.06	672	6.11	673	22.75
189	Crohn's disease and ulcerative colitis (K50-K51) โรคโครนและลำไส้ใหญ่อักเสบแผลเปื่อย	รวม	1,192	1.83	203	1.74	268	1.62	131	1.41	299	1.37	291	5.20
		ชาย	596	1.87	84	1.47	122	1.51	75	1.64	144	1.32	171	6.48
		หญิง	596	1.80	119	2.00	146	1.71	56	1.19	155	1.41	120	4.06
190	Paralytic ileus and intestinal obstruction without hernia (K56) ลำไส้ไม่ทำงานและลำไส้เกิดอุดตันแบบไม่มีไส้เลื่อน	รวม	39,569	60.86	8,259	70.78	8,078	48.69	4,707	50.81	14,922	68.16	3,603	64.35
		ชาย	23,704	74.32	5,010	87.44	4,777	59.25	2,985	65.40	9,025	82.81	1,907	72.23
		หญิง	15,865	47.90	3,249	54.71	3,301	38.71	1,722	36.64	5,897	53.64	1,696	57.32
191	Diverticular disease of intestine (K57) โรคติ่งเนื้อของลำไส้	รวม	8,031	12.35	1,756	15.05	2,001	12.06	783	8.45	2,033	9.29	1,458	26.04
		ชาย	4,131	12.95	855	14.92	999	12.39	425	9.31	1,095	10.05	757	28.67
		หญิง	3,900	11.78	901	15.17	1,002	11.75	358	7.62	938	8.53	701	23.69
192	Other diseases of intestine and peritoneum (K52-K55, K58-K67) โรคอื่น ๆ ของลำไส้และเยื่อช่องท้อง	รวม	111,844	172.03	22,868	195.98	26,497	159.71	13,973	150.82	35,959	164.26	12,547	224.10
		ชาย	61,266	192.09	12,605	219.99	13,983	173.44	7,747	169.73	20,298	186.25	6,633	251.24
		หญิง	50,578	152.72	10,263	172.82	12,514	146.74	6,226	132.46	15,661	142.46	5,914	199.88
193	Alcoholic liver disease (K70) โรคตับเกี่ยวกับแอลกอฮอล์	รวม	57,234	88.03	12,482	106.97	14,030	84.57	3,671	39.62	23,011	105.11	4,040	72.16
		ชาย	45,716	143.34	10,141	176.99	10,348	128.35	3,267	71.58	18,625	170.90	3,335	126.32
		หญิง	11,518	34.78	2,341	39.42	3,682	43.17	404	8.60	4,386	39.90	705	23.83
194	Other disease of liver (K71-K77) โรคอื่น ๆ ของตับ	รวม	149,005	229.19	28,989	248.44	33,631	202.71	14,161	152.85	56,795	259.44	15,429	275.57
		ชาย	93,620	293.53	18,973	331.13	19,815	245.78	8,763	191.98	36,858	338.20	9,211	348.89
		หญิง	55,385	167.23	10,016	168.66	13,816	162.00	5,398	114.85	19,937	181.36	6,218	210.16

ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
195	Cholelithiasis and cholecystitis (K80-K81) โรคนิ่วในระบบน้ำดีและถุงน้ำดีอักเสบ	รวม	67,742	104.20	12,708	108.91	14,586	87.92	5,950	64.22	27,050	123.56	7,448	133.03
		ชาย	27,356	85.77	5,003	87.32	5,710	70.83	2,266	49.64	11,143	102.25	3,234	122.49
		หญิง	40,386	121.94	7,705	129.75	8,876	104.08	3,684	78.38	15,907	144.70	4,214	142.42
196	Acute pancreatitis and other disease of the pancreas (K85-K86) ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันและโรคอื่น ๆ ของตับอ่อน	รวม	20,616	31.71	4,269	36.59	5,272	31.78	1,998	21.57	6,690	30.56	2,387	42.63
		ชาย	14,907	46.74	3,154	55.05	3,721	46.15	1,323	28.99	5,161	47.36	1,548	58.63
		หญิง	5,709	17.24	1,115	18.78	1,551	18.19	675	14.36	1,529	13.91	839	28.36
197	Other diseases of the digestive system (K82-K83, K87-K93) โรคอื่น ๆ ของระบบย่อยอาหาร	รวม	131,609	202.43	30,200	258.82	31,868	192.09	13,981	150.91	44,020	201.08	11,540	206.11
		ชาย	82,189	257.69	19,226	335.55	19,119	237.15	8,501	186.24	28,700	263.35	6,643	251.62
		หญิง	49,420	149.22	10,974	184.79	12,749	149.49	5,480	116.59	15,320	139.36	4,897	165.51
198	Infection of the skin and subcutaneous tissue (L00-L08) โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	รวม	142,626	219.38	26,598	227.95	31,691	191.02	23,856	257.50	53,811	245.81	6,670	119.13
		ชาย	80,035	250.94	15,257	266.28	16,924	209.92	13,264	290.60	31,005	284.50	3,585	135.79
		หญิง	62,591	188.99	11,341	190.97	14,767	173.15	10,592	225.35	22,806	207.45	3,085	104.27
199	Other diseases of the skin and subcutaneous tissue (L10-L99) โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	รวม	116,441	179.10	23,971	205.44	29,881	180.11	14,397	155.40	35,572	162.49	12,620	225.40
		ชาย	61,578	193.07	12,809	223.55	15,325	190.09	7,748	169.75	19,361	177.65	6,335	239.95
		หญิง	54,863	165.65	11,162	187.96	14,556	170.68	6,649	141.46	16,211	147.46	6,285	212.42
200	Rheumatoid arthritis and other inflammatory polyarthropathies (M05-M14) ข้ออักเสบรูมาตอยและข้ออักเสบหลายข้อ	รวม	159,880	245.92	40,866	350.23	33,121	199.64	15,185	163.90	59,600	272.25	11,108	198.40
		ชาย	104,085	326.34	26,347	459.83	21,298	264.18	10,614	232.54	38,668	354.81	7,158	271.12
		หญิง	55,795	168.47	14,519	244.49	11,823	138.63	4,571	97.25	20,932	190.41	3,950	133.50
201	Arthrosis (M15-M19) โรคข้อเสื่อม	รวม	37,386	57.50	9,408	80.63	11,862	71.50	2,794	30.16	5,805	26.52	7,517	134.26
		ชาย	8,537	26.77	2,340	40.84	2,433	30.18	648	14.20	1,616	14.83	1,500	56.82
		หญิง	28,849	87.11	7,068	119.02	9,429	110.56	2,146	45.66	4,189	38.11	6,017	203.36

ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
202	Acquired deformities of limbs (M20-M21) ความพิการของแขนขา	รวม	1,918	2.95	313	2.68	338	2.04	153	1.65	375	1.71	739	13.20
		ชาย	883	2.77	133	2.32	140	1.74	85	1.86	217	1.99	308	11.67
		หญิง	1,035	3.13	180	3.03	198	2.32	68	1.45	158	1.44	431	14.57
203	Other disorders of joints (M00-M03, M22-M25) ความผิดปกติอื่น ๆ ของข้อ	รวม	24,595	37.83	4,715	40.41	5,641	34.00	2,408	25.99	8,529	38.96	3,302	58.98
		ชาย	15,314	48.01	2,714	47.37	3,596	44.60	1,538	33.70	5,221	47.91	2,245	85.03
		หญิง	9,281	28.02	2,001	33.70	2,045	23.98	870	18.51	3,308	30.09	1,057	35.72
204	Systemic connective tissue disorders (M30-M36) ความผิดปกติของระบบเนื้อเยื่อประสาน	รวม	25,633	39.43	5,268	45.15	5,216	31.44	2,601	28.07	9,278	42.38	3,270	58.40
		ชาย	4,851	15.21	1,072	18.71	863	10.70	400	8.76	1,853	17.00	663	25.11
		หญิง	20,782	62.75	4,196	70.66	4,353	51.04	2,201	46.83	7,425	67.54	2,607	88.11
205	Cervical and other intervertebral disc disorders (M50-M51) กระดูกสันหลังและหมอนรองกระดูกสันหลังอื่น ๆ	รวม	8,551	13.15	1,845	15.81	1,709	10.30	968	10.45	2,869	13.11	1,160	20.72
		ชาย	4,381	13.74	890	15.53	881	10.93	503	11.02	1,524	13.98	583	22.08
		หญิง	4,170	12.59	955	16.08	828	9.71	465	9.89	1,345	12.23	577	19.50
206	Other dorsopathies (M40-M49, M53-M54) พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ	รวม	61,163	94.08	16,039	137.46	12,592	75.90	5,768	62.26	19,239	87.88	7,525	134.40
		ชาย	25,491	79.92	6,514	113.69	5,013	62.18	2,521	55.23	8,403	77.10	3,040	115.15
		หญิง	35,672	107.71	9,525	160.39	7,579	88.87	3,247	69.08	10,836	98.57	4,485	151.58
207	Soft tissue disorders (M60-M79) เนื้อเยื่อผิดปกติ	รวม	84,804	130.44	17,509	150.06	15,398	92.81	10,992	118.65	35,861	163.81	5,044	90.09
		ชาย	44,007	137.98	8,959	156.36	8,156	101.17	5,405	118.42	18,999	174.33	2,488	94.24
		หญิง	40,797	123.18	8,550	143.97	7,242	84.92	5,587	118.87	16,862	153.38	2,556	86.39
208	Disorders of bone density and structure (M80-M85) ความผิดปกติของความหนาแน่นของเนื้อกระดูก	รวม	15,814	24.32	3,380	28.97	3,189	19.22	1,720	18.57	5,035	23.00	2,490	44.47
		ชาย	5,218	16.36	996	17.38	1,068	13.25	624	13.67	1,738	15.95	792	30.00
		หญิง	10,596	31.99	2,384	40.14	2,121	24.87	1,096	23.32	3,297	29.99	1,698	57.39

ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
209	Osteomyelitis (M86) กระดูกอักเสบ	รวม	10,666	16.41	2,131	18.26	2,343	14.12	1,092	11.79	4,228	19.31	872	15.57
		ชาย	6,583	20.64	1,294	22.58	1,457	18.07	686	15.03	2,570	23.58	576	21.82
		หญิง	4,083	12.33	837	14.09	886	10.39	406	8.64	1,658	15.08	296	10.00
210	Other diseases of the musculoskeletal system and connective tissue (M87-M99) โรคอื่น ๆ ของระบบกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อประสาน	รวม	13,275	20.42	2,539	21.76	3,262	19.66	1,731	18.68	3,860	17.63	1,883	33.63
		ชาย	6,875	21.56	1,296	22.62	1,638	20.32	876	19.19	2,127	19.52	938	35.53
		หญิง	6,400	19.32	1,243	20.93	1,624	19.04	855	18.19	1,733	15.76	945	31.94
211	Acute and rapidly progressive nephritic syndromes (N00-N01) กลุ่มอาการไตอักเสบเฉียบพลันและชนิดกำเริบเร็ว	รวม	4,609	7.09	750	6.43	651	3.92	937	10.11	1,979	9.04	292	5.22
		ชาย	2,768	8.68	443	7.73	393	4.87	561	12.29	1,216	11.16	155	5.87
		หญิง	1,841	5.56	307	5.17	258	3.03	376	8.00	763	6.94	137	4.63
212	Other glomerular diseases (N02-N08) โรคของหน่วยไตอื่น ๆ	รวม	40,112	61.70	5,508	47.20	7,024	42.34	6,111	65.96	16,768	76.60	4,701	83.96
		ชาย	16,024	50.24	2,266	39.55	2,864	35.52	2,642	57.88	6,233	57.19	2,019	76.47
		หญิง	24,088	72.73	3,242	54.59	4,160	48.78	3,469	73.81	10,535	95.83	2,682	90.65
213	Renal tubulo-interstitial diseases (N10-N16) โรคของท่อและเนื้อเยื่อระหว่างท่อในไต	รวม	107,289	165.03	23,801	203.98	22,826	137.59	15,196	164.02	39,021	178.25	6,445	115.11
		ชาย	39,774	124.70	9,198	160.53	7,240	89.80	5,019	109.96	15,919	146.07	2,398	90.83
		หญิง	67,515	203.86	14,603	245.90	15,586	182.76	10,177	216.52	23,102	210.15	4,047	136.78
214	Renal failure (N17-N19) ไตวาย	รวม	710,477	1,092.81	143,177	1,227.06	156,096	940.89	72,709	784.80	288,613	1,318.38	49,882	890.93
		ชาย	354,548	1,111.63	73,914	1,290.00	76,761	952.13	38,371	840.65	138,948	1,274.97	26,554	1,005.79
		หญิง	355,929	1,074.70	69,263	1,166.33	79,335	930.26	34,338	730.57	149,665	1,361.42	23,328	788.44
215	Urolithiasis (N20-N23) นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ	รวม	58,209	89.53	14,853	127.29	7,362	44.38	7,649	82.56	25,645	117.15	2,700	48.22
		ชาย	35,903	112.57	9,666	168.70	4,156	51.55	4,473	98.00	16,067	147.43	1,541	58.37
		หญิง	22,306	67.35	5,187	87.34	3,206	37.59	3,176	67.57	9,578	87.13	1,159	39.17

ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
216	Cystitis (N30) กระเพาะปัสสาวะอักเสบ	รวม	24,230	37.27	5,775	49.49	6,068	36.58	3,565	38.48	7,680	35.08	1,142	20.40
		ชาย	7,148	22.41	1,829	31.92	1,683	20.88	897	19.65	2,447	22.45	292	11.06
		หญิง	17,082	51.58	3,946	66.45	4,385	51.42	2,668	56.76	5,233	47.60	850	28.73
217	Other diseases of the urinary system (N25-N29, N31-N39) โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะ	รวม	236,674	364.04	54,444	466.60	62,197	374.90	27,055	292.03	71,243	325.44	21,735	388.20
		ชาย	97,045	304.27	23,148	404.00	23,920	296.70	10,760	235.74	30,498	279.85	8,719	330.25
		หญิง	139,629	421.60	31,296	527.00	38,277	448.83	16,295	346.69	40,745	370.64	13,016	439.91
218	Hyperplasia of prostate (N40) ต่อมลูกหมากโตจากการเพิ่มจำนวนเซลล์	รวม	77,790	243.90	17,684	308.63	20,213	250.72	11,507	252.10	18,885	173.29	9,501	359.87
		ชาย	77,790	243.90	17,684	308.63	20,213	250.72	11,507	252.10	18,885	173.29	9,501	359.87
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
219	Other disorders of prostate (N41-N42) ความผิดปกติอื่น ๆ ของต่อมลูกหมาก	รวม	784	2.46	180	3.14	129	1.60	54	1.18	240	2.20	181	6.86
		ชาย	784	2.46	180	3.14	129	1.60	54	1.18	240	2.20	181	6.86
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
220	Hydrocele and spermatocele (N43) ถุงน้ำและถุงที่มีอสุจิที่อั้นตะ	รวม	3,512	11.01	704	12.29	655	8.12	613	13.43	1,253	11.50	287	10.87
		ชาย	3,512	11.01	704	12.29	655	8.12	613	13.43	1,253	11.50	287	10.87
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
221	Redundant prepuce, phimosis and paraphimosis (N47) หนังหุ้มปลายองคชาตยาวเกินไป ปลายตีบรูเปิด	รวม	5,375	16.85	1,211	21.14	1,268	15.73	661	14.48	1,795	16.47	440	16.67
		ชาย	5,375	16.85	1,211	21.14	1,268	15.73	661	14.48	1,795	16.47	440	16.67
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
222	Other disease of male genital organs (N44-N46, N48-N51) โรคอื่น ๆ ของอวัยวะสืบพันธุ์ชาย	รวม	11,494	36.04	2,067	36.07	2,442	30.29	1,538	33.70	4,766	43.73	681	25.79
		ชาย	11,494	36.04	2,067	36.07	2,442	30.29	1,538	33.70	4,766	43.73	681	25.79
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
223	Disorders of breast (N60-N64) ความผิดปกติของเต้านม	รวม	9,124	14.03	1,924	16.49	1,653	9.96	1,879	20.28	2,921	13.34	747	13.34
		ชาย	569	1.78	118	2.06	112	1.39	107	2.34	166	1.52	66	2.50
		หญิง	8,555	25.83	1,806	30.41	1,541	18.07	1,772	37.70	2,755	25.06	681	23.02
224	Salpingitis and oophoritis (N70) ปีกมดลูกและรังไข่อักเสบ	รวม	2,693	8.13	412	6.94	631	7.40	311	6.62	954	8.68	385	13.01
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	2,693	8.13	412	6.94	631	7.40	311	6.62	954	8.68	385	13.01
225	Inflammatory disease of cervix uteri (N72) ปากมดลูกอักเสบ	รวม	808	2.44	198	3.33	109	1.28	87	1.85	223	2.03	191	6.46
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	808	2.44	198	3.33	109	1.28	87	1.85	223	2.03	191	6.46
226	Other inflammatory diseases of female pelvic organs (N71, N73-N77) การอักเสบอื่น ๆ ของอวัยวะในอุ้งเชิงกรานสตรี	รวม	21,089	63.68	3,634	61.19	4,832	56.66	2,998	63.78	7,441	67.69	2,184	73.81
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	21,089	63.68	3,634	61.19	4,832	56.66	2,998	63.78	7,441	67.69	2,184	73.81
227	Endometriosis (N80) เยื่อปมดลูกอยู่ผิดที่	รวม	13,682	41.31	1,954	32.90	2,083	24.42	1,747	37.17	4,470	40.66	3,428	115.86
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	13,682	41.31	1,954	32.90	2,083	24.42	1,747	37.17	4,470	40.66	3,428	115.86
228	Female genital prolapse (N81) การหย่อนตัวของอวัยวะสืบพันธุ์สตรี	รวม	4,939	14.91	991	16.69	964	11.30	463	9.85	1,789	16.27	732	24.74
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	4,939	14.91	991	16.69	964	11.30	463	9.85	1,789	16.27	732	24.74
229	Noninflammatory disorder of ovary, fallopian tube and broad ligament (N83) ความผิดปกติอื่นที่ไม่ใช่การอักเสบของรังไข่ ท่อรังไข่และเอ็น ยึดมดลูก	รวม	9,328	28.17	1,485	25.01	2,127	24.94	1,331	28.32	3,102	28.22	1,283	43.36
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	9,328	28.17	1,485	25.01	2,127	24.94	1,331	28.32	3,102	28.22	1,283	43.36

ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
230	Disorder of menstruation (N91-N92) ความผิดปกติของระดู	รวม	10,113	30.54	1,616	27.21	2,060	24.16	2,111	44.91	3,862	35.13	464	15.68
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	10,113	30.54	1,616	27.21	2,060	24.16	2,111	44.91	3,862	35.13	464	15.68
231	Menopausal and other perimenopausal disorders (N95) การหมดประจำเดือนและความผิดปกติอื่นในระยะหมด	รวม	4,318	13.04	861	14.50	912	10.69	806	17.15	1,448	13.17	291	9.84
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	4,318	13.04	861	14.50	912	10.69	806	17.15	1,448	13.17	291	9.84
232	Female infertility (N97) ภาวะมีบุตรยากในสตรี	รวม	307	0.93	36	0.61	23	0.27	58	1.23	81	0.74	109	3.68
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	307	0.93	36	0.61	23	0.27	58	1.23	81	0.74	109	3.68
233	Other disorders of genitourinary tract (N82, N84-N90, N93-N94, N96, N98-N99) ความผิดปกติอื่น ๆ ของท่อทางเดินปัสสาวะและสืบพันธุ์	รวม	24,474	73.90	4,775	80.41	4,639	54.40	4,420	94.04	8,015	72.91	2,625	88.72
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	24,474	73.90	4,775	80.41	4,639	54.40	4,420	94.04	8,015	72.91	2,625	88.72
234	Spontaneous abortion (O03) แท้งเอง	รวม	13,017	39.30	1,676	28.22	3,037	35.61	3,053	64.95	4,273	38.87	978	33.05
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	13,017	39.30	1,676	28.22	3,037	35.61	3,053	64.95	4,273	38.87	978	33.05
235	Medical abortion (O04) การทำแท้งโดยเหตุผลทางการแพทย์	รวม	1,498	4.52	272	4.58	205	2.40	214	4.55	712	6.48	95	3.21
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	1,498	4.52	272	4.58	205	2.40	214	4.55	712	6.48	95	3.21
236	Other pregnancies with abortive outcome (O00-O02, O05-O08) การตั้งครรภ์อื่น ๆ ที่สิ้นสุดโดยการแท้ง	รวม	28,297	85.44	4,622	77.83	6,159	72.22	7,323	155.80	8,436	76.74	1,757	59.38
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	28,297	85.44	4,622	77.83	6,159	72.22	7,323	155.80	8,436	76.74	1,757	59.38

ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
237	Oedema, proteinuria and hypertensive disorders in pregnancy, childbirth and the puerperium (O10-O16) การบวม การมีโปรตีนในปัสสาวะ และความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด	รวม	24,664	74.47	3,515	59.19	5,818	68.22	6,644	141.36	7,311	66.50	1,376	46.51
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	24,664	74.47	3,515	59.19	5,818	68.22	6,644	141.36	7,311	66.50	1,376	46.51
238	Placenta praevia, premature separation of placenta and antepartum haemorrhage (O44-O46) รกเกาะต่ำ รกลอกตัวก่อนกำหนด และตกเลือดก่อนคลอด	รวม	5,829	17.60	948	15.96	1,170	13.72	1,418	30.17	1,969	17.91	324	10.95
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	5,829	17.60	948	15.96	1,170	13.72	1,418	30.17	1,969	17.91	324	10.95
239	Other maternal care related to fetus and amniotic cavity and possible delivery problems (O30-O43, O47-O48) การดูแลมารดาอื่น ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ์ และถุงน้ำคร่ำ และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระยะคลอด	รวม	148,810	449.32	23,518	396.02	32,297	378.71	35,473	754.72	48,238	438.79	9,284	313.78
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	148,810	449.32	23,518	396.02	32,297	378.71	35,473	754.72	48,238	438.79	9,284	313.78
240	Obstructed labour (O64-O66) การคลอดติดขัด	รวม	24,102	72.77	3,727	62.76	4,730	55.46	4,405	93.72	9,866	89.75	1,374	46.44
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	24,102	72.77	3,727	62.76	4,730	55.46	4,405	93.72	9,866	89.75	1,374	46.44
241	Postpartum haemorrhage (O72) ตกเลือดหลังคลอด	รวม	12,077	36.47	2,031	34.20	2,617	30.69	3,037	64.61	3,855	35.07	537	18.15
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	12,077	36.47	2,031	34.20	2,617	30.69	3,037	64.61	3,855	35.07	537	18.15

ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
242	Other complications of pregnancy and delivery (O20-O29, O60-O63, O67-O71, O73-O75, O81-O84) ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ของการตั้งครรภ์ และการคลอด	รวม	293,228	885.38	43,914	739.47	63,871	748.94	73,400	1,561.64	94,597	860.50	17,446	589.64
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	293,228	885.38	43,914	739.47	63,871	748.94	73,400	1,561.64	94,597	860.50	17,446	589.64
243	Single spontaneous delivery (O80) การคลอดของครรภ์เดี่ยว	รวม	232,601	702.32	36,085	607.64	51,680	605.99	56,169	1,195.04	78,133	710.73	10,534	356.03
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	232,601	702.32	36,085	607.64	51,680	605.99	56,169	1,195.04	78,133	710.73	10,534	356.03
244	Complications predominantly related to the puerperium and other obstetric conditions, not Elsewhere classified (O85-O99) ภาวะแทรกซ้อนที่ส่วนใหญ่พบในระยะหลังคลอด และภาวะทางสูติกรรมอื่น ๆ ที่มีได้ระบุรายละเอียด	รวม	67,990	205.29	9,020	151.89	13,897	162.95	17,669	375.92	21,994	200.07	5,410	182.85
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	67,990	205.29	9,020	151.89	13,897	162.95	17,669	375.92	21,994	200.07	5,410	182.85
245	Fetus and newborn affected by maternal factors and by complications of pregnancy, labor and delivery (P00-P04) ทารกในครรภ์และแรกเกิดที่ได้รับผลจากปัจจัยทางมารดา	รวม	30,315	46.63	3,779	32.39	4,723	28.47	4,843	52.27	14,537	66.41	2,433	43.46
		ชาย	15,926	49.93	1,993	34.78	2,499	31.00	2,593	56.81	7,573	69.49	1,268	48.03
		หญิง	14,389	43.45	1,786	30.07	2,224	26.08	2,250	47.87	6,964	63.35	1,165	39.37
246	Slow fetal growth, fetal malnutrition and disorders related to short gestation and low birth weight (P05-P07) ทารกในครรภ์โตช้า ทารกในครรภ์ขาดสารอาหาร และความผิดปกติเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ระยะสั้น และน้ำหนักทารกแรกเกิดน้อย	รวม	69,569	107.01	10,219	87.58	17,785	107.20	12,509	135.02	20,827	95.14	8,229	146.98
		ชาย	34,619	108.54	5,127	89.48	8,944	110.94	6,255	137.04	10,087	92.56	4,206	159.31
		หญิง	34,950	105.53	5,092	85.74	8,841	103.67	6,254	133.06	10,740	97.70	4,023	135.97

ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
247	Birth trauma (P10-P15) บาดเจ็บจากการคลอด	รวม	8,282	12.74	1,378	11.81	2,004	12.08	858	9.26	2,426	11.08	1,616	28.86
		ชาย	4,925	15.44	833	14.54	1,201	14.90	531	11.63	1,416	12.99	944	35.76
		หญิง	3,357	10.14	545	9.18	803	9.42	327	6.96	1,010	9.19	672	22.71
248	Intrauterine hypoxia and birth asphyxia (P20-P21) ขาดออกซิเจนขณะอยู่ในโพรงมดลูก และภาวะแอสฟิกเซีย เมื่อแรกเกิด	รวม	13,906	21.39	1,661	14.24	3,087	18.61	1,948	21.03	4,808	21.96	2,402	42.90
		ชาย	7,697	24.13	921	16.07	1,761	21.84	1,123	24.60	2,588	23.75	1,304	49.39
		หญิง	6,209	18.75	740	12.46	1,326	15.55	825	17.55	2,220	20.19	1,098	37.11
249	Other respiratory disorders originating in the perinatal period (P22-P28) ภาวะหายใจผิดปกติอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด	รวม	72,906	112.14	8,932	76.55	19,178	115.60	13,596	146.75	22,063	100.78	9,137	163.19
		ชาย	43,363	135.96	5,336	93.13	11,450	142.02	8,093	177.31	13,204	121.16	5,280	199.99
		หญิง	29,543	89.20	3,596	60.55	7,728	90.62	5,503	117.08	8,859	80.59	3,857	130.36
250	Congenital infectious and parasitic diseases (P35-P37) การติดเชื้อแต่กำเนิดและโรคปรสิต	รวม	36,244	55.75	4,389	37.61	10,008	60.32	5,827	62.90	12,182	55.65	3,838	68.55
		ชาย	19,966	62.60	2,443	42.64	5,492	68.12	3,248	71.16	6,652	61.04	2,131	80.72
		หญิง	16,278	49.15	1,946	32.77	4,516	52.95	2,579	54.87	5,530	50.30	1,707	57.69
251	Other infections specific to the perinatal period (P38-P39) การติดเชื้อเฉพาะอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด	รวม	5,581	8.58	722	6.19	1,698	10.23	1,031	11.13	1,714	7.83	416	7.43
		ชาย	3,170	9.94	427	7.45	985	12.22	562	12.31	948	8.70	248	9.39
		หญิง	2,411	7.28	295	4.97	713	8.36	469	9.98	766	6.97	168	5.68
252	Haemolytic disease of fetus and newborn (P55) โรคเม็ดเลือดแดงของทารกในครรภ์และแรกเกิด	รวม	8,131	12.51	896	7.68	2,785	16.79	1,096	11.83	2,565	11.72	789	14.09
		ชาย	4,182	13.11	480	8.38	1,483	18.39	527	11.55	1,300	11.93	392	14.85
		หญิง	3,949	11.92	416	7.01	1,302	15.27	569	12.11	1,265	11.51	397	13.42
253	Other conditions originating in the perinatal period (P08, P29, P50-P54, P56-P96) ภาวะอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด	รวม	248,064	381.56	38,309	328.32	63,716	384.06	35,784	386.24	83,213	380.12	27,042	482.99
		ชาย	136,205	427.05	21,210	370.17	35,426	439.42	19,587	429.12	45,203	414.78	14,779	559.79
		หญิง	111,859	337.75	17,099	287.93	28,290	331.72	16,197	344.60	38,010	345.76	12,263	414.46

ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
254	Spina bifida (Q05) กระดูกสันหลังแยก	รวม	677	1.04	81	0.69	124	0.75	83	0.90	154	0.70	235	4.20
		ชาย	294	0.92	37	0.65	49	0.61	37	0.81	64	0.59	107	4.05
		หญิง	383	1.16	44	0.74	75	0.88	46	0.98	90	0.82	128	4.33
255	Other congenital malformations of the nervous system (Q00-Q04, Q06-Q07) ความผิดปกติอื่น ๆ แต่กำเนิดของระบบประสาท	รวม	3,566	5.49	487	4.17	763	4.60	456	4.92	934	4.27	926	16.54
		ชาย	1,867	5.85	257	4.49	427	5.30	238	5.21	506	4.64	439	16.63
		หญิง	1,699	5.13	230	3.87	336	3.94	218	4.64	428	3.89	487	16.46
256	Congenital malformation of the circulatory system (Q20-Q28) ความผิดปกติแต่กำเนิดของระบบไหลเวียนโลหิต	รวม	34,229	52.65	4,993	42.79	6,393	38.53	4,156	44.86	8,205	37.48	10,482	187.22
		ชาย	17,011	53.34	2,549	44.49	3,042	37.73	2,037	44.63	3,908	35.86	5,475	207.38
		หญิง	17,218	51.99	2,444	41.15	3,351	39.29	2,119	45.08	4,297	39.09	5,007	169.23
257	Cleft lip and cleft palate (Q35-Q37) ปากแหว่งและเพดานโหว่	รวม	4,901	7.54	777	6.66	954	5.75	849	9.16	1,536	7.02	785	14.02
		ชาย	2,577	8.08	463	8.08	532	6.60	386	8.46	803	7.37	393	14.89
		หญิง	2,324	7.02	314	5.29	422	4.95	463	9.85	733	6.67	392	13.25
258	Absence, atresia and stenosis of small intestine (Q41) ลำไส้เล็กไม่มี ตันและตีบ	รวม	363	0.56	70	0.60	72	0.43	67	0.72	80	0.37	74	1.32
		ชาย	199	0.62	45	0.79	37	0.46	38	0.83	44	0.40	35	1.33
		หญิง	164	0.50	25	0.42	35	0.41	29	0.62	36	0.33	39	1.32
259	Other congenital malformations of the digestive system (Q38-Q40, Q42-Q45) ความผิดปกติแต่กำเนิดอื่น ๆ ของระบบย่อยอาหาร	รวม	29,494	45.37	3,894	33.37	8,288	49.96	2,774	29.94	6,867	31.37	7,671	137.01
		ชาย	17,452	54.72	2,338	40.80	5,048	62.61	1,687	36.96	4,093	37.56	4,286	162.34
		หญิง	12,042	36.36	1,556	26.20	3,240	37.99	1,087	23.13	2,774	25.23	3,385	114.41
260	Undescended testicle (Q53) อัณฑะไม่ลงถุง	รวม	2,679	8.40	435	7.59	662	8.21	357	7.82	759	6.96	466	17.65
		ชาย	2,679	8.40	435	7.59	662	8.21	357	7.82	759	6.96	466	17.65
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
261	Other malformations of the genitourinary system (Q50-Q52, Q54-Q64)	รวม	5,189	7.98	771	6.61	813	4.90	705	7.61	1,221	5.58	1,679	29.99
		ชาย	3,316	10.40	455	7.94	479	5.94	472	10.34	814	7.47	1,096	41.51
	ความผิดปกติอื่น ๆ ของระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ	หญิง	1,873	5.66	316	5.32	334	3.92	233	4.96	407	3.70	583	19.70
262	Congenital deformities of hip (Q65)	รวม	378	0.58	35	0.30	48	0.29	42	0.45	96	0.44	157	2.80
	ความพิการแต่กำเนิดของสะโพก	ชาย	131	0.41	11	0.19	24	0.30	9	0.20	34	0.31	53	2.01
		หญิง	247	0.75	24	0.40	24	0.28	33	0.70	62	0.56	104	3.51
263	Congenital deformities of feet (Q66)	รวม	2,666	4.10	314	2.69	631	3.80	452	4.88	840	3.84	429	7.66
	ความพิการแต่กำเนิดของเท้า	ชาย	1,342	4.21	167	2.91	297	3.68	234	5.13	429	3.94	215	8.14
		หญิง	1,324	4.00	147	2.48	334	3.92	218	4.64	411	3.74	214	7.23
264	Other congenital malformations and deformations of the musculoskeletal system (Q67-Q79)	รวม	5,909	9.09	869	7.45	1,007	6.07	708	7.64	1,647	7.52	1,678	29.97
		ชาย	3,221	10.10	479	8.36	559	6.93	401	8.79	879	8.07	903	34.20
	ความผิดปกติและความพิการแต่กำเนิดอื่น ๆ ของระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง	หญิง	2,688	8.12	390	6.57	448	5.25	307	6.53	768	6.99	775	26.19
265	Other congenital malformations (Q10-Q18, Q30-Q34, Q80-Q89)	รวม	10,854	16.70	1,450	12.43	1,736	10.46	1,590	17.16	2,583	11.80	3,495	62.42
		ชาย	5,784	18.13	771	13.46	926	11.49	865	18.95	1,397	12.82	1,825	69.13
	ความผิดปกติแต่กำเนิดอื่น ๆ	หญิง	5,070	15.31	679	11.43	810	9.50	725	15.42	1,186	10.79	1,670	56.44
266	Chromosomal abnormalities, not Elsewhere classified (Q90-Q99)	รวม	6,721	10.34	1,029	8.82	1,526	9.20	993	10.72	1,887	8.62	1,286	22.97
		ชาย	3,569	11.19	556	9.70	769	9.54	562	12.31	959	8.80	723	27.39
	ความผิดปกติของโครโมโซมที่ไม่ได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น	หญิง	3,152	9.52	473	7.96	757	8.88	431	9.17	928	8.44	563	19.03

ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
267	Abdominal and pelvic pain (R10) ปวดท้องและปวดอุ้งเชิงกราน	รวม	30,294	46.60	8,192	70.21	5,734	34.56	5,941	64.13	9,382	42.86	1,045	18.66
		ชาย	12,004	37.64	3,414	59.58	2,192	27.19	2,273	49.80	3,758	34.48	367	13.90
		หญิง	18,290	55.23	4,778	80.46	3,542	41.53	3,668	78.04	5,624	51.16	678	22.92
268	Fever of unknown origin (R50) ไข้ไม่ทราบสาเหตุ	รวม	97,308	149.67	20,707	177.46	15,172	91.45	13,637	147.19	42,710	195.10	5,082	90.77
		ชาย	50,434	158.13	11,072	193.24	7,647	94.85	6,886	150.86	22,189	203.60	2,640	100.00
		หญิง	46,874	141.53	9,635	162.25	7,525	88.24	6,751	143.63	20,521	186.67	2,442	82.53
269	Senility (R54) ชราภาพ	รวม	2,139	3.29	378	3.24	793	4.78	161	1.74	373	1.70	434	7.75
		ชาย	864	2.71	150	2.62	288	3.57	77	1.69	153	1.40	196	7.42
		หญิง	1,275	3.85	228	3.84	505	5.92	84	1.79	220	2.00	238	8.04
270	Other symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not Elsewhere classified (R00-R09, R11-R49, R51-R53, R55-R99) อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจทาง คลินิกและตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มีได้มีรหัสระบุไว้	รวม	768,087	1,181.43	144,952	1,242.27	166,225	1,001.94	119,296	1,287.65	284,260	1,298.50	53,354	952.94
		ชาย	397,101	1,245.05	75,911	1,324.86	85,227	1,057.14	58,598	1,283.80	149,111	1,368.23	28,254	####
		หญิง	370,986	1,120.16	69,041	1,162.59	80,998	949.76	60,698	1,291.40	135,149	1,229.38	25,100	848.33
271	Fracture of skull and facial bones (S02)กระดูก แตกหักบริเวณกะโหลกศีรษะและกระดูกหน้า	รวม	34,935	53.74	5,714	48.97	10,939	65.94	5,136	55.44	9,771	44.63	3,375	60.28
		ชาย	28,271	88.64	4,636	80.91	8,770	108.78	3,925	85.99	8,157	74.85	2,783	105.41
		หญิง	6,664	20.12	1,078	18.15	2,169	25.43	1,211	25.76	1,614	14.68	592	20.01
272	Fracture of neck, thorax and pelvis (S12, S22, S32, T08) กระดูกคอ กระดูกซี่โครง หรือกระดูกเชิงกรานหัก	รวม	29,873	45.95	7,011	60.09	8,181	49.31	4,190	45.23	7,967	36.39	2,524	45.08
		ชาย	19,962	62.59	4,691	81.87	5,342	66.26	2,802	61.39	5,491	50.38	1,636	61.97
		หญิง	9,911	29.93	2,320	39.07	2,839	33.29	1,388	29.53	2,476	22.52	888	30.01

ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
273	Fracture of femur (S72) กระดูกต้นขาแตก หัก ร้าว	รวม	40,711	62.62	10,040	86.05	11,819	71.24	5,184	55.95	9,395	42.92	4,273	76.32
		ชาย	18,362	57.57	4,050	70.68	5,582	69.24	2,516	55.12	4,395	40.33	1,819	68.90
		หญิง	22,349	67.48	5,990	100.87	6,237	73.13	2,668	56.76	5,000	45.48	2,454	82.94
274	Fracture of other limb bones (S42, S52, S62, S82, S92, T10, T12) กระดูกแตกหักของแขนขาอื่น ๆ	รวม	129,859	199.74	26,086	223.56	35,349	213.07	17,328	187.03	40,515	185.07	10,581	188.98
		ชาย	87,721	275.04	16,941	295.67	24,019	297.93	11,464	251.16	27,913	256.13	7,384	279.68
		หญิง	42,138	127.23	9,145	153.99	11,330	132.85	5,864	124.76	12,602	114.63	3,197	108.05
275	Fracture involving multiple body regions (T02) กระดูกแตกหักหลายบริเวณในร่างกาย	รวม	94	0.14	5	0.04	8	0.05	25	0.27	51	0.23	5	0.09
		ชาย	65	0.20	3	0.05	6	0.07	18	0.39	35	0.32	3	0.11
		หญิง	29	0.09	2	0.03	2	0.02	7	0.15	16	0.15	2	0.07
276	Dislocations, sprains and strains of specified and multiple body regions (S03, S13, S23, S33, S43, S53, S63, S73, S83, S93, T03) กระดูกเคลื่อน เคล็ด ชัด บริเวณร่างกายหลายแห่งที่ระบุเฉพาะ	รวม	20,175	31.03	3,814	32.69	5,368	32.36	2,789	30.10	6,322	28.88	1,882	33.61
		ชาย	13,610	42.67	2,458	42.90	3,662	45.42	1,790	39.22	4,381	40.20	1,319	49.96
		หญิง	6,565	19.82	1,356	22.83	1,706	20.00	999	21.25	1,941	17.66	563	19.03
277	Injury of eye and orbi (S05) การบาดเจ็บของตาและเบ้าตา	รวม	11,474	17.65	2,523	21.62	2,694	16.24	1,701	18.36	3,904	17.83	652	11.65
		ชาย	8,861	27.78	1,928	33.65	2,042	25.33	1,374	30.10	3,041	27.90	476	18.03
		หญิง	2,613	7.89	595	10.02	652	7.65	327	6.96	863	7.85	176	5.95
278	Intracranial injury (S06) การบาดเจ็บภายในกะโหลกศีรษะ	รวม	85,106	130.91	16,036	137.43	19,260	116.09	13,055	140.91	32,470	148.32	4,285	76.53
		ชาย	61,290	192.16	11,600	202.45	13,855	171.85	8,771	192.16	23,912	219.41	3,152	119.39
		หญิง	23,816	71.91	4,436	74.70	5,405	63.38	4,284	91.15	8,558	77.85	1,133	38.29

ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
279	Injury of other internal organs (S26-S27, S36-S37) การบาดเจ็บของอวัยวะภายในอื่น ๆ	รวม	23,707	36.46	4,214	36.11	6,207	37.41	4,196	45.29	7,203	32.90	1,887	33.70
		ชาย	19,303	60.52	3,407	59.46	5,051	62.65	3,418	74.88	5,925	54.37	1,502	56.89
		หญิง	4,404	13.30	807	13.59	1,156	13.55	778	16.55	1,278	11.63	385	13.01
280	Crushing injuries and traumatic amputations of specified and multiple body regions (S07-S08, S17-S18, S28, S38, S47-S48, S57-S58, S67-S68, S77-S78, S87-S88, S97-S98, T04-T05) การบาดเจ็บจากการบดอัดและการบาดเจ็บที่เกิดจากตัดขา บริเวณร่างกายหลายแห่งที่ระบุเฉพาะ	รวม	6,321	9.72	1,311	11.24	1,703	10.27	759	8.19	2,172	9.92	376	6.72
		ชาย	5,133	16.09	1,056	18.43	1,359	16.86	599	13.12	1,800	16.52	319	12.08
		หญิง	1,188	3.59	255	4.29	344	4.03	160	3.40	372	3.38	57	1.93
281	Other injuries of specified, unspecified and multiple body regions (S00-S01, S04, S09-S11, S14-S16, S19-S21, S24-S25, S29-S31, S34-S35, S39-S41, S44-S46, S49-S51, S54-S56, S59-S61, S64-S66, S69-S71, S74-S76, S79-S81, S84-S86, S89-S91, S94-S96, S99, T00-T01, T06-T07, T09, T11, T13-T14) การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลาย	รวม	200,281	308.06	38,408	329.17	49,069	295.77	30,738	331.78	69,464	317.31	12,602	225.08
		ชาย	143,737	450.66	27,191	474.56	34,041	422.24	21,353	467.81	51,770	475.04	9,382	355.36
		หญิง	56,544	170.73	11,217	188.88	15,028	176.21	9,385	199.67	17,694	160.95	3,220	108.83
282	Effects of foreign body entering through natural orifice (T15-T19) ผลของวัตถุแปลกปลอมผ่านเข้าทาง ทวารธรรมชาติของร่างกาย	รวม	6,406	9.85	1,069	9.16	1,513	9.12	1,343	14.50	2,096	9.57	385	6.88
		ชาย	3,812	11.95	648	11.31	937	11.62	736	16.12	1,249	11.46	242	9.17
		หญิง	2,594	7.83	421	7.09	576	6.75	607	12.91	847	7.70	143	4.83

ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
283	Burns and corrosions (T20-T32) แผลถูกความร้อนและถูกสารกัดกร่อน	รวม	22,314	34.32	4,104	35.17	5,383	32.45	3,227	34.83	8,208	37.49	1,392	24.86
		ชาย	14,379	45.08	2,631	45.92	3,424	42.47	2,119	46.42	5,341	49.01	864	32.73
		หญิง	7,935	23.96	1,473	24.80	1,959	22.97	1,108	23.57	2,867	26.08	528	17.85
284	Poisoning by drugs and biological substances (T36-T50) การเป็นพิษจากยา เครื่องยาและชีววัตถุ	รวม	30,207	46.46	6,503	55.73	7,906	47.65	4,343	46.88	9,569	43.71	1,886	33.69
		ชาย	12,399	38.88	2,644	46.15	3,057	37.92	1,809	39.63	4,094	37.57	795	30.11
		หญิง	17,808	53.77	3,859	64.98	4,849	56.86	2,534	53.91	5,475	49.80	1,091	36.87
285	Toxic effects of substances chiefly nonmedicinal as to source (T51-T65) การเป็นพิษจากสารที่โดยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ใช้เป็นยา	รวม	43,542	66.97	8,021	68.74	12,190	73.48	9,718	104.89	12,782	58.39	831	14.84
		ชาย	25,366	79.53	4,760	83.08	6,949	86.19	5,826	127.64	7,389	67.80	442	16.74
		หญิง	18,176	54.88	3,261	54.91	5,241	61.45	3,892	82.81	5,393	49.06	389	13.15
286	Maltreatment syndromes (T74) กลุ่มอาการจากการทารุณ	รวม	413	0.64	99	0.85	85	0.51	53	0.57	142	0.65	34	0.61
		ชาย	73	0.23	12	0.21	18	0.22	15	0.33	21	0.19	7	0.27
		หญิง	340	1.03	87	1.47	67	0.79	38	0.81	121	1.10	27	0.91
287	Other and unspecified effects of external causes (T33-T35, T66-T73, T75-T78) อื่น ๆ และที่มีได้ระบุผลของสาเหตุภายนอก	รวม	32,597	50.14	5,954	51.03	9,074	54.69	5,601	60.46	10,908	49.83	1,060	18.93
		ชาย	18,526	58.09	3,364	58.71	5,190	64.38	3,126	68.49	6,228	57.15	618	23.41
		หญิง	14,071	42.49	2,590	43.61	3,884	45.54	2,475	52.66	4,680	42.57	442	14.94
288	Certain early complications of trauma and complications of surgical and medical care, note Elsewhere classified (T79-T88) ภาวะแทรกซ้อนระยะแรกของการบาดเจ็บบางชนิดและ ภาวะแทรกซ้อนของการรักษาทางศัลยกรรมและอายุร กรรมที่มีได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น	รวม	142,362	218.97	26,729	229.07	30,642	184.70	16,299	175.93	50,802	232.06	17,890	319.53
		ชาย	80,674	252.94	15,581	271.93	17,056	211.56	9,235	202.33	29,397	269.74	9,405	356.23
		หญิง	61,688	186.26	11,148	187.72	13,586	159.31	7,064	150.29	21,405	194.71	8,485	286.78

ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
289	Sequela of injuries, of poisoning and of other consequences of external causes (T90-T98)	รวม	2,391	3.68	599	5.13	676	4.07	283	3.05	472	2.16	361	6.45
		ชาย	1,793	5.62	462	8.06	471	5.84	210	4.60	370	3.40	280	10.61
	ผลระยะล่าของการบาดเจ็บ การเป็นพิษและผลที่ตามมา	หญิง	598	1.81	137	2.31	205	2.40	73	1.55	102	0.93	81	2.74
290	Persons encountering health services for examination and investigation (Z00-Z13)	รวม	46,446	71.44	14,842	127.20	12,739	76.79	8,718	94.10	7,121	32.53	3,026	54.05
		ชาย	18,262	57.26	6,372	111.21	4,437	55.04	2,596	56.87	3,347	30.71	1,510	57.19
	บุคคลขอรับบริการเพื่อการตรวจและชันสูตร	หญิง	28,184	85.10	8,470	142.63	8,302	97.35	6,122	130.25	3,774	34.33	1,516	51.24
291	Asymptomatic human immunodeficiency virus (HIV) infection status (Z21)	รวม	2,809	4.32	183	1.57	1,019	6.14	730	7.88	655	2.99	222	3.97
		ชาย	1,311	4.11	80	1.40	462	5.73	333	7.30	322	2.95	114	4.32
	การติดเชื้อไวรัสโดยไม่มีอาการ	หญิง	1,498	4.52	103	1.73	557	6.53	397	8.45	333	3.03	108	3.65
292	Other persons with potential health hazards related to communicable diseases (Z20, Z22-Z29)	รวม	95,379	146.71	6,122	52.47	22,310	134.48	26,757	288.81	34,209	156.27	5,981	106.83
		ชาย	49,071	153.85	3,064	53.48	11,473	142.31	13,767	301.62	17,677	162.20	3,090	117.04
	บุคคลที่มีอาการที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่อ	หญิง	46,308	139.82	3,058	51.49	10,837	127.07	12,990	276.37	16,532	150.38	2,891	97.71
293	Contraceptive management (Z30)	รวม	79,533	122.33	13,001	111.42	24,359	146.83	9,352	100.94	26,968	123.19	5,853	104.54
		ชาย	53	0.17	20	0.35	7	0.09	3	0.07	15	0.14	8	0.30
	การรับบริการคุมกำเนิด	หญิง	79,480	239.98	12,981	218.59	24,352	285.55	9,349	198.91	26,953	245.18	5,845	197.55
294	Antenatal screening and other supervision of pregnancy (Z34-Z36)	รวม	20,147	60.83	1,549	26.08	3,470	40.69	5,822	123.87	7,800	70.95	1,506	50.90
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	การตรวจคัดกรองก่อนการคลอด และการให้คำแนะนำ	หญิง	20,147	60.83	1,549	26.08	3,470	40.69	5,822	123.87	7,800	70.95	1,506	50.90

ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
295	Liveborn infants according to place of birth (Z38) การเกิดของทารกตามสถานที่เกิด	รวม	559,774	861.01	81,422	697.81	146,109	880.69	109,366	1,180.47	178,620	815.94	44,257	790.46
		ชาย	289,153	906.59	42,044	733.78	75,861	940.96	56,303	1,233.52	91,883	843.11	23,062	873.52
		หญิง	270,621	817.12	39,378	663.09	70,248	823.71	53,063	1,128.96	86,737	789.00	21,195	716.35
296	Postpartum care and examination (Z39) การดูแลและการตรวจหลังคลอด	รวม	2,036	6.15	324	5.46	331	3.88	560	11.91	768	6.99	53	1.79
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	2,036	6.15	324	5.46	331	3.88	560	11.91	768	6.99	53	1.79
297	Persons encountering health services for specific procedures and health care (Z40-Z54, Z40-Z54) บุคคลขอรับบริการสุขภาพ เพื่อหัตถการหรือการบริการสุขภาพที่ระบุเฉพาะ	รวม	340,086	523.10	71,661	614.15	72,403	436.42	30,715	331.53	108,658	496.35	56,649	1,011.79
		ชาย	171,352	537.25	34,942	609.83	37,372	463.55	16,592	363.51	55,441	508.72	27,005	1,022.87
		หญิง	168,734	509.48	36,719	618.32	35,031	410.77	14,123	300.48	53,217	484.09	29,644	1,001.91
298	Persons encountering health services for other reasons (Z31-Z33, Z37, Z55-Z99) บุคคลขอรับบริการสุขภาพด้วยเหตุผลอื่น	รวม	494,737	760.98	79,034	677.34	109,071	657.44	101,928	1,100.19	158,024	721.85	46,680	833.74
		ชาย	69,245	217.11	12,568	219.35	13,772	170.82	7,194	157.61	20,887	191.66	14,824	561.49
		หญิง	425,492	1,284.74	66,466	1,119.23	95,299	1,117.45	94,734	2,015.54	137,137	1,247.46	31,856	1,076.67

รวบรวม / วิเคราะห์ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แหล่งข้อมูล : สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สทส.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ผู้ป่วยใน

(เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) จำแนกสาเหตุการป่วย

เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2559

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
รวมทุกกลุ่มโรค		รวม	6,970,219	10,721.19	1,336,690	#####	1,567,518	9,448.41	1,108,301	11,962.74	2,451,893	11,200.24	505,817	9,034.26
		ชาย	3,315,702	10,395.85	647,791	#####	740,859	9,189.45	505,826	11,081.92	1,175,634	10,787.48	245,592	9,302.32
		หญิง	3,654,517	11,034.50	688,899	#####	826,659	9,693.20	602,475	12,818.13	1,276,259	11,609.43	260,225	8,795.08
001	Cholera (A00) อหิวาตกโรค	รวม	91	0.14	10	0.09	22	0.13	18	0.19	30	0.14	11	0.20
		ชาย	53	0.17	7	0.12	12	0.15	12	0.26	17	0.16	5	0.19
		หญิง	38	0.11	3	0.05	10	0.12	6	0.13	13	0.12	6	0.20
002	Typhoid and paratyphoid fever (A01) ไข้รากสาดน้อยและไข้รากสาดเทียม	รวม	3,386	5.21	272	2.33	163	0.98	2,482	26.79	451	2.06	18	0.32
		ชาย	1,811	5.68	154	2.69	92	1.14	1,308	28.66	245	2.25	12	0.45
		หญิง	1,575	4.76	118	1.99	71	0.83	1,174	24.98	206	1.87	6	0.20
003	Shigellosis (A03) โรคบิดจากเชื้อชิเกลลา	รวม	137	0.21	26	0.22	32	0.19	22	0.24	46	0.21	11	0.20
		ชาย	64	0.20	14	0.24	14	0.17	11	0.24	21	0.19	4	0.15
		หญิง	73	0.22	12	0.20	18	0.21	11	0.23	25	0.23	7	0.24
004	Amoebiasis (A06) โรคบิดมีตัว	รวม	2,719	4.18	882	7.56	391	2.36	787	8.49	642	2.93	17	0.30
		ชาย	1,204	3.77	379	6.61	190	2.36	343	7.51	281	2.58	11	0.42
		หญิง	1,515	4.57	503	8.47	201	2.36	444	9.45	361	3.28	6	0.20
005	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin (A09) อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ	รวม	351,569	540.76	62,734	537.64	75,499	455.08	59,416	641.32	143,436	655.22	10,484	187.25
		ชาย	160,141	502.10	29,627	517.07	34,410	426.81	27,303	598.17	63,756	585.02	5,045	191.09
		หญิง	191,428	578.00	33,107	557.49	41,089	481.80	32,113	683.23	79,680	724.81	5,439	183.83

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
006	Other intestinal infectious diseases (A02, A04-A05, A07-A08) โรคลำไส้อักเสบอื่น ๆ	รวม	54,782	84.26	12,653	108.44	11,063	66.68	5,884	63.51	22,824	104.26	2,358	42.12
		ชาย	26,202	82.15	6,170	107.68	5,341	66.25	3,024	66.25	10,421	95.62	1,246	47.19
		หญิง	28,580	86.29	6,483	109.17	5,722	67.09	2,860	60.85	12,403	112.82	1,112	37.58
007	Respiratory tuberculosis (A15-A16) วัณโรคทางเดินหายใจ	รวม	35,728	54.95	5,936	50.87	7,761	46.78	4,196	45.29	16,184	73.93	1,651	29.49
		ชาย	25,026	78.46	4,257	74.30	5,608	69.56	3,063	67.11	10,920	100.20	1,178	44.62
		หญิง	10,702	32.31	1,679	28.27	2,153	25.25	1,133	24.11	5,264	47.88	473	15.99
008	Other Tuberculosis (A17-A19) วัณโรคอื่น ๆ	รวม	7,294	11.22	1,255	10.76	1,321	7.96	734	7.92	3,423	15.64	561	10.02
		ชาย	4,405	13.81	786	13.72	771	9.56	457	10.01	2,048	18.79	343	12.99
		หญิง	2,889	8.72	469	7.90	550	6.45	277	5.89	1,375	12.51	218	7.37
009	Plaque (A20) กาฬโรค	รวม	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
010	Brucellosis (A23) โรคติดเชื้อบรูเซลลา	รวม	8	0.01	3	0.03	1	0.01	0	0.00	1	0.00	3	0.05
		ชาย	6	0.02	2	0.03	1	0.01	0	0.00	1	0.01	2	0.08
		หญิง	2	0.01	1	0.02	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.03
011	Leprosy (A30) โรคเรื้อน	รวม	50	0.08	6	0.05	9	0.05	13	0.14	19	0.09	3	0.05
		ชาย	29	0.09	3	0.05	4	0.05	8	0.18	11	0.10	3	0.11
		หญิง	21	0.06	3	0.05	5	0.06	5	0.11	8	0.07	0	0.00

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
012	Tetanus neonatorum (A33) บาดทะยักในเด็กแรกเกิด	รวม	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
013	Other tetanus (A34-A35) บาดทะยักอื่น ๆ	รวม	191	0.29	55	0.47	36	0.22	11	0.12	81	0.37	8	0.14
		ชาย	125	0.39	36	0.63	27	0.33	10	0.22	45	0.41	7	0.27
		หญิง	66	0.20	19	0.32	9	0.11	1	0.02	36	0.33	1	0.03
014	Diphtheria (A36) โรคคอตีบ	รวม	37	0.06	9	0.08	7	0.04	15	0.16	6	0.03	0	0.00
		ชาย	20	0.06	7	0.12	3	0.04	9	0.20	1	0.01	0	0.00
		หญิง	17	0.05	2	0.03	4	0.05	6	0.13	5	0.05	0	0.00
015	Whooping cough (A37) โรคไอกรน	รวม	54	0.08	4	0.03	9	0.05	24	0.26	11	0.05	6	0.11
		ชาย	24	0.08	2	0.03	4	0.05	8	0.18	7	0.06	3	0.11
		หญิง	30	0.09	2	0.03	5	0.06	16	0.34	4	0.04	3	0.10
016	Meningococcal infection (A39) การติดเชื้อเมนีงโกคอคคัส	รวม	78	0.12	11	0.09	20	0.12	20	0.22	23	0.11	4	0.07
		ชาย	47	0.15	8	0.14	11	0.14	8	0.18	16	0.15	4	0.15
		หญิง	31	0.09	3	0.05	9	0.11	12	0.26	7	0.06	0	0.00
017	Septicemia (A40-A41) โลหิตเป็นพิษ	รวม	39,659	61.00	8,139	69.75	9,462	57.03	4,391	47.40	15,029	68.65	2,638	47.12
		ชาย	19,828	62.17	4,282	74.73	4,344	53.88	2,219	48.62	7,708	70.73	1,275	48.29
		หญิง	19,831	59.88	3,857	64.95	5,118	60.01	2,172	46.21	7,321	66.60	1,363	46.07

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
018	Other bacterial diseases (A21-A22, A24-A28,A31-A32, A38, A42-A49) โรคจากแบคทีเรียอื่น ๆ	รวม	41,472	63.79	5,171	44.32	3,984	24.01	8,702	93.93	23,062	105.35	553	9.88
		ชาย	24,032	75.35	2,993	52.24	2,143	26.58	5,017	109.92	13,594	124.74	285	10.79
		หญิง	17,440	52.66	2,178	36.68	1,841	21.59	3,685	78.40	9,468	86.13	268	9.06
019	Congenital syphilis (A50) ซิฟิลิสแต่กำเนิด	รวม	414	0.64	50	0.43	154	0.93	25	0.27	92	0.42	93	1.66
		ชาย	225	0.71	25	0.44	79	0.98	13	0.28	56	0.51	52	1.97
		หญิง	189	0.57	25	0.42	75	0.88	12	0.26	36	0.33	41	1.39
020	Early syphilis (A51) ซิฟิลิสระยะเริ่ม	รวม	64	0.10	9	0.08	9	0.05	13	0.14	29	0.13	4	0.07
		ชาย	46	0.14	6	0.10	6	0.07	10	0.22	21	0.19	3	0.11
		หญิง	18	0.05	3	0.05	3	0.04	3	0.06	8	0.07	1	0.03
021	Other syphilis (A52-A53) ซิฟิลิสอื่น ๆ	รวม	557	0.86	82	0.70	93	0.56	121	1.31	224	1.02	37	0.66
		ชาย	355	1.11	59	1.03	63	0.78	60	1.31	145	1.33	28	1.06
		หญิง	202	0.61	23	0.39	30	0.35	61	1.30	79	0.72	9	0.30
022	Gonococcal infection (A54) การติดเชื้อหนองใน	รวม	272	0.42	36	0.31	77	0.46	23	0.25	118	0.54	18	0.32
		ชาย	179	0.56	30	0.52	49	0.61	12	0.26	82	0.75	6	0.23
		หญิง	93	0.28	6	0.10	28	0.33	11	0.23	36	0.33	12	0.41
023	Sexually transmitted chlamydial diseases (A55-A56) โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จากเชื้อคลามิเดีย	รวม	32	0.05	6	0.05	6	0.04	11	0.12	6	0.03	3	0.05
		ชาย	21	0.07	3	0.05	4	0.05	10	0.22	4	0.04	0	0.00
		หญิง	11	0.03	3	0.05	2	0.02	1	0.02	2	0.02	3	0.10

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
024	Other infections with a predominantly sexual mode of transmission (A57-A64) โรคติดต่ออื่น ๆ ที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นส่วนมาก	รวม	773	1.19	151	1.29	191	1.15	95	1.03	279	1.27	57	1.02
		ชาย	349	1.09	79	1.38	80	0.99	22	0.48	132	1.21	36	1.36
		หญิง	424	1.28	72	1.21	111	1.30	73	1.55	147	1.34	21	0.71
025	Relapsing fever (A68) โรคไข้กลับซ้ำ	รวม	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00
		ชาย	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.01	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
026	Trachoma (A71) ริดสีดวงตา	รวม	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.01	0	0.00
027	Typhus fever (A75) ไข้รากสาดใหญ่	รวม	9,780	15.04	3,438	29.46	595	3.59	2,731	29.48	2,940	13.43	76	1.36
		ชาย	5,494	17.23	1,932	33.72	349	4.33	1,599	35.03	1,571	14.42	43	1.63
		หญิง	4,286	12.94	1,506	25.36	246	2.88	1,132	24.08	1,369	12.45	33	1.12
028	Acute poliomyelitis (A80) โรคโปลิโอเฉียบพลัน	รวม	5	0.01	3	0.03	0	0.00	0	0.00	2	0.01	0	0.00
		ชาย	2	0.01	1	0.02	0	0.00	0	0.00	1	0.01	0	0.00
		หญิง	3	0.01	2	0.03	0	0.00	0	0.00	1	0.01	0	0.00
029	Rabies (A82) โรคพิษสุนัขบ้า	รวม	9	0.01	1	0.01	3	0.02	2	0.02	2	0.01	1	0.02
		ชาย	6	0.02	0	0.00	2	0.02	1	0.02	2	0.02	1	0.04
		หญิง	3	0.01	1	0.02	1	0.01	1	0.02	0	0.00	0	0.00

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
030	Viral encephalitis (A83-A86) สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส	รวม	677	1.04	113	0.97	147	0.89	81	0.87	275	1.26	61	1.09
		ชาย	378	1.19	68	1.19	66	0.82	44	0.96	167	1.53	33	1.25
		หญิง	299	0.90	45	0.76	81	0.95	37	0.79	108	0.98	28	0.95
031	Yellow fever (A95) ไข้เหลือง	รวม	5	0.01	2	0.02	0	0.00	3	0.03	0	0.00	0	0.00
		ชาย	2	0.01	1	0.02	0	0.00	1	0.02	0	0.00	0	0.00
		หญิง	3	0.01	1	0.02	0	0.00	2	0.04	0	0.00	0	0.00
032	Other arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers (A90-A94, A96-A99) ไข้จากไวรัสที่นำโดยแมลงและ ไข้เลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่น ๆ	รวม	101,809	156.60	11,652	99.86	13,490	81.31	46,873	505.94	26,678	121.87	3,116	55.65
		ชาย	51,287	160.80	5,758	100.49	6,990	86.70	23,229	508.91	13,638	125.14	1,672	63.33
		หญิง	50,522	152.55	5,894	99.25	6,500	76.22	23,644	503.04	13,040	118.62	1,444	48.80
033	Herpesviral infection (B00) เริม	รวม	2,070	3.18	463	3.97	476	2.87	236	2.55	769	3.51	126	2.25
		ชาย	1,042	3.27	224	3.91	241	2.99	110	2.41	405	3.72	62	2.35
		หญิง	1,028	3.10	239	4.02	235	2.76	126	2.68	364	3.31	64	2.16
034	Varicella and zoster (B01-B02) อีสุกอีใสและงูสวัด	รวม	5,478	8.43	973	8.34	1,174	7.08	944	10.19	2,090	9.55	297	5.30
		ชาย	2,579	8.09	479	8.36	553	6.86	440	9.64	960	8.81	147	5.57
		หญิง	2,899	8.75	494	8.32	621	7.28	504	10.72	1,130	10.28	150	5.07

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
035	Measles (B05) หัด	รวม	2,352	3.62	34	0.29	135	0.81	1,999	21.58	93	0.42	91	1.63
		ชาย	1,255	3.93	22	0.38	85	1.05	1,041	22.81	59	0.54	48	1.82
		หญิง	1,097	3.31	12	0.20	50	0.59	958	20.38	34	0.31	43	1.45
036	Rubella (B06) หัดเยอรมัน	รวม	26	0.04	5	0.04	8	0.05	6	0.06	6	0.03	1	0.02
		ชาย	16	0.05	3	0.05	3	0.04	4	0.09	5	0.05	1	0.04
		หญิง	10	0.03	2	0.03	5	0.06	2	0.04	1	0.01	0	0.00
037	Acute hepatitis B (B16) ตับอักเสบเฉียบพลันชนิดบี	รวม	1,023	1.57	214	1.83	249	1.50	114	1.23	408	1.86	38	0.68
		ชาย	656	2.06	135	2.36	156	1.93	79	1.73	262	2.40	24	0.91
		หญิง	367	1.11	79	1.33	93	1.09	35	0.74	146	1.33	14	0.47
038	Other viral hepatitis (B15, B17-B19) ตับอักเสบจากไวรัสอื่น ๆ	รวม	5,401	8.31	1,085	9.30	1,161	7.00	410	4.43	2,465	11.26	280	5.00
		ชาย	3,232	10.13	637	11.12	653	8.10	245	5.37	1,524	13.98	173	6.55
		หญิง	2,169	6.55	448	7.54	508	5.96	165	3.51	941	8.56	107	3.62
039	Human immunodeficiency virus [HIV] disease (B20-B24) ภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากไวรัส (HIV)	รวม	28,346	43.60	4,856	41.62	7,914	47.70	3,690	39.83	9,725	44.42	2,161	38.60
		ชาย	17,514	54.91	3,010	52.53	4,823	59.82	2,284	50.04	5,971	54.79	1,426	54.01
		หญิง	10,832	32.71	1,846	31.09	3,091	36.24	1,406	29.91	3,754	34.15	735	24.84
040	Mumps (B26) คางทูม	รวม	106	0.16	16	0.14	19	0.11	26	0.28	41	0.19	4	0.07
		ชาย	60	0.19	8	0.14	12	0.15	16	0.35	22	0.20	2	0.08
		หญิง	46	0.14	8	0.13	7	0.08	10	0.21	19	0.17	2	0.07

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
041	Other viral diseases (A81, A87-A89, B03-B04, B07-B09, B25, B27-B34) โรคจากไวรัสอื่น	รวม	45,208	69.54	8,429	72.24	11,345	68.38	9,791	105.68	13,506	61.70	2,137	38.17
		ชาย	24,080	75.50	4,618	80.60	6,104	75.71	5,105	111.84	7,083	64.99	1,170	44.32
		หญิง	21,128	63.79	3,811	64.17	5,241	61.45	4,686	99.70	6,423	58.43	967	32.68
042	Mycoses (B35-B49) โรคติดเชื้อรา	รวม	2,310	3.55	439	3.76	451	2.72	253	2.73	877	4.01	290	5.18
		ชาย	1,331	4.17	245	4.28	276	3.42	143	3.13	492	4.51	175	6.63
		หญิง	979	2.96	194	3.27	175	2.05	110	2.34	385	3.50	115	3.89
043	Malaria (B50-B54) มาลาเรีย	รวม	3,139	4.83	276	2.37	462	2.78	1,823	19.68	551	2.52	27	0.48
		ชาย	2,021	6.34	188	3.28	325	4.03	1,006	22.04	485	4.45	17	0.64
		หญิง	1,118	3.38	88	1.48	137	1.61	817	17.38	66	0.60	10	0.34
044	Leishmaniasis (B55) โรคไลชมาเนีย	รวม	25	0.04	12	0.10	0	0.00	13	0.14	0	0.00	0	0.00
		ชาย	25	0.08	12	0.21	0	0.00	13	0.28	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
045	Trypanosomiasis (B56-B57) โรคทริปาโนโซม	รวม	8	0.01	1	0.01	0	0.00	3	0.03	4	0.02	0	0.00
		ชาย	4	0.01	0	0.00	0	0.00	2	0.04	2	0.02	0	0.00
		หญิง	4	0.01	1	0.02	0	0.00	1	0.02	2	0.02	0	0.00
046	Schistosomiasis (B65) โรคติดเชื้อซิสโตโซม	รวม	4	0.01	0	0.00	1	0.01	1	0.01	1	0.00	1	0.02
		ชาย	3	0.01	0	0.00	0	0.00	1	0.02	1	0.01	1	0.04
		หญิง	1	0.00	0	0.00	1	0.01	0	0.00	0	0.00	0	0.00

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
047	Other fluke infections (B66) โรคพยาธิใบไม้อื่น ๆ	รวม	79	0.12	31	0.27	4	0.02	1	0.01	43	0.20	0	0.00
		ชาย	33	0.10	12	0.21	3	0.04	0	0.00	18	0.17	0	0.00
		หญิง	46	0.14	19	0.32	1	0.01	1	0.02	25	0.23	0	0.00
048	Echinococcosis (B67) โรคพยาธิเอคคิโนคอกคัส	รวม	2	0.00	1	0.01	0	0.00	1	0.01	0	0.00	0	0.00
		ชาย	1	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.02	0	0.00	0	0.00
		หญิง	1	0.00	1	0.02	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
049	Dracunculiasis (B72) โรคพยาธิคั่นคูส	รวม	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
050	Onchocerciasis (B73) โรคพยาธิออนโคเชอร์คา	รวม	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
051	Filariasis (B74) โรคพยาธิฟิลาเรีย	รวม	9	0.01	1	0.01	1	0.01	4	0.04	1	0.00	2	0.04
		ชาย	7	0.02	1	0.02	0	0.00	4	0.09	1	0.01	1	0.04
		หญิง	2	0.01	0	0.00	1	0.01	0	0.00	0	0.00	1	0.03
052	Hookworm diseases (B76) โรคพยาธิปากขอ	รวม	101	0.16	13	0.11	20	0.12	43	0.46	25	0.11	0	0.00
		ชาย	55	0.17	5	0.09	12	0.15	28	0.61	10	0.09	0	0.00
		หญิง	46	0.14	8	0.13	8	0.09	15	0.32	15	0.14	0	0.00

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
053	Other helminthiasis (B68-B71, B75, B77-B83) โรคพยาธิตัวตืดอื่น ๆ	รวม	2,291	3.52	455	3.90	133	0.80	172	1.86	1,493	6.82	38	0.68
		ชาย	1,462	4.58	314	5.48	88	1.09	92	2.02	951	8.73	17	0.64
		หญิง	829	2.50	141	2.37	45	0.53	80	1.70	542	4.93	21	0.71
054	Sequelae of tuberculosis (B90) ผลตามหลังวัณโรค	รวม	347	0.53	56	0.48	69	0.42	48	0.52	154	0.70	20	0.36
		ชาย	232	0.73	43	0.75	52	0.65	34	0.74	90	0.83	13	0.49
		หญิง	115	0.35	13	0.22	17	0.20	14	0.30	64	0.58	7	0.24
055	Sequelae of poliomyelitis (B91) ผลตามหลังโรคโปลิโอ	รวม	2	0.00	0	0.00	1	0.01	0	0.00	1	0.00	0	0.00
		ชาย	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.01	0	0.00
		หญิง	1	0.00	0	0.00	1	0.01	0	0.00	0	0.00	0	0.00
056	Sequelae of leprosy (B92) ผลตามหลังโรคเรื้อน	รวม	1	0.00	1	0.01	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	1	0.00	1	0.02	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
057	Other infectious and parasitic diseases (A65-A67, A69-A70, A74, A77-A79, B58-B64, B85-B89, B94, B99) โรคติดเชื้อและปรสิตอื่น ๆ	รวม	3,322	5.11	797	6.83	426	2.57	1,335	14.41	628	2.87	136	2.43
		ชาย	1,909	5.99	457	7.98	248	3.08	796	17.44	337	3.09	71	2.69
		หญิง	1,413	4.27	340	5.73	178	2.09	539	11.47	291	2.65	65	2.20

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
058	Malignant neoplasm of lip, oral cavity and pharynx (C00-C14) เนื้องอกร้ายของริมฝีปาก ช่องปากและคอหอย	รวม	19,069	29.33	2,835	24.30	4,699	28.32	2,300	24.83	5,415	24.74	3,820	68.23
		ชาย	13,776	43.19	2,037	35.55	3,626	44.98	1,759	38.54	3,444	31.60	2,910	110.22
		หญิง	5,293	15.98	798	13.44	1,073	12.58	541	11.51	1,971	17.93	910	30.76
059	Malignant neoplasm of oesophagus (C15) เนื้องอกร้ายที่หลอดอาหาร	รวม	7,746	11.91	1,173	10.05	2,627	15.83	1,262	13.62	1,418	6.48	1,266	22.61
		ชาย	6,781	21.26	1,001	17.47	2,284	28.33	1,116	24.45	1,238	11.36	1,142	43.26
		หญิง	965	2.91	172	2.90	343	4.02	146	3.11	180	1.64	124	4.19
060	Malignant neoplasm of stomach (C16) เนื้องอกร้ายที่กระเพาะอาหาร	รวม	9,490	14.60	2,502	21.44	1,937	11.68	634	6.84	3,061	13.98	1,356	24.22
		ชาย	5,310	16.65	1,330	23.21	1,082	13.42	407	8.92	1,759	16.14	732	27.73
		หญิง	4,180	12.62	1,172	19.74	855	10.03	227	4.83	1,302	11.84	624	21.09
061	Malignant neoplasm of colon (C18) เนื้องอกร้ายของลำไส้ใหญ่	รวม	44,144	67.90	8,795	75.38	9,789	59.00	5,175	55.86	13,154	60.09	7,231	129.15
		ชาย	22,635	70.97	4,451	77.68	4,992	61.92	2,668	58.45	6,500	59.64	4,024	152.42
		หญิง	21,509	64.94	4,344	73.15	4,797	56.25	2,507	53.34	6,654	60.53	3,207	108.39
062	Malignant neoplasm of recto sigmoid junction, rectum, anus and anal canal (C19-C21) เนื้องอกร้ายที่รอยต่อลำไส้ใหญ่เร็กตัมและซิกมอยด์ เร็กตัม ทวารหนักและช่องทวารหนัก	รวม	32,383	49.81	6,836	58.59	5,926	35.72	3,080	33.24	10,777	49.23	5,764	102.95
		ชาย	18,735	58.74	3,991	69.65	3,506	43.49	1,877	41.12	6,083	55.82	3,278	124.16
		หญิง	13,648	41.21	2,845	47.91	2,420	28.38	1,203	25.59	4,694	42.70	2,486	84.02

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
063	Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts (C22) เนื้องอกร้ายที่ตับและท่อน้ำดีในตับ	รวม	41,730	64.19	9,250	79.27	6,028	36.33	2,672	28.84	17,482	79.86	6,298	112.49
		ชาย	29,016	90.97	6,568	114.63	4,398	54.55	1,882	41.23	11,708	107.43	4,460	168.93
		หญิง	12,714	38.39	2,682	45.16	1,630	19.11	790	16.81	5,774	52.52	1,838	62.12
064	Malignant neoplasm of pancreas (C25) เนื้องอกร้ายที่ตับอ่อน	รวม	4,349	6.69	1,019	8.73	1,023	6.17	498	5.38	871	3.98	938	16.75
		ชาย	2,178	6.83	466	8.13	526	6.52	288	6.31	458	4.20	440	16.67
		หญิง	2,171	6.56	553	9.31	497	5.83	210	4.47	413	3.76	498	16.83
065	Other malignant neoplasms of digestive organs (C17, C23-C24, C26) เนื้องอกร้ายที่อวัยวะย่อยอาหารอื่น ๆ	รวม	5,545	8.53	1,031	8.84	753	4.54	494	5.33	2,388	10.91	879	15.70
		ชาย	2,806	8.80	507	8.85	310	3.85	240	5.26	1,343	12.32	406	15.38
		หญิง	2,739	8.27	524	8.82	443	5.19	254	5.40	1,045	9.51	473	15.99
066	Malignant neoplasm of larynx (C32) เนื้องอกร้ายที่กล่องเสียง	รวม	3,747	5.76	564	4.83	1,060	6.39	527	5.69	879	4.02	717	12.81
		ชาย	3,478	10.90	511	8.92	984	12.21	496	10.87	818	7.51	669	25.34
		หญิง	269	0.81	53	0.89	76	0.89	31	0.66	61	0.55	48	1.62
067	Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung (C33-C34) เนื้องอกร้ายที่หลอดคอ หลอดลม และปอด	รวม	31,179	47.96	8,511	72.94	6,406	38.61	3,412	36.83	8,936	40.82	3,914	69.91
		ชาย	19,360	60.70	5,097	88.96	4,092	50.76	2,218	48.59	5,614	51.51	2,339	88.59
		หญิง	11,819	35.69	3,414	57.49	2,314	27.13	1,194	25.40	3,322	30.22	1,575	53.23
068	Other malignant neoplasm of respiratory and intrathoracic organs (C30-C31, C37-C39) เนื้องอกร้ายที่อวัยวะหายใจและอวัยวะช่องอก	รวม	2,061	3.17	361	3.09	378	2.28	152	1.64	529	2.42	641	11.45
		ชาย	1,390	4.36	247	4.31	271	3.36	83	1.82	370	3.40	419	15.87
		หญิง	671	2.03	114	1.92	107	1.25	69	1.47	159	1.45	222	7.50

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
069	Malignant neoplasm of bone and articular cartilage (C40-C41) เนื้องอกร้ายที่กระดูกและกระดูกอ่อนผิวข้อ	รวม	2,642	4.06	326	2.79	300	1.81	262	2.83	881	4.02	873	15.59
		ชาย	1,470	4.61	186	3.25	166	2.06	135	2.96	505	4.63	478	18.11
		หญิง	1,172	3.54	140	2.36	134	1.57	127	2.70	376	3.42	395	13.35
070	Malignant melanoma of skin (C43) เนื้องอกร้ายที่เมลาโนมาของผิวหนัง	รวม	563	0.87	103	0.88	109	0.66	52	0.56	183	0.84	116	2.07
		ชาย	291	0.91	48	0.84	60	0.74	26	0.57	104	0.95	53	2.01
		หญิง	272	0.82	55	0.93	49	0.57	26	0.55	79	0.72	63	2.13
071	Other malignant neoplasm of skin (C44) เนื้องอกร้ายที่ผิวหนังอื่น ๆ	รวม	1,984	3.05	410	3.51	425	2.56	212	2.29	593	2.71	344	6.14
		ชาย	962	3.02	208	3.63	231	2.87	97	2.13	268	2.46	158	5.98
		หญิง	1,022	3.09	202	3.40	194	2.27	115	2.45	325	2.96	186	6.29
072	Malignant neoplasm of mesothelial and soft tissue (C45-C49) เนื้องอกร้ายที่เมโสทีเรียลและเนื้อเยื่ออ่อน	รวม	4,256	6.55	838	7.18	617	3.72	444	4.79	1,139	5.20	1,218	21.75
		ชาย	1,882	5.90	341	5.95	235	2.91	224	4.91	554	5.08	528	20.00
		หญิง	2,374	7.17	497	8.37	382	4.48	220	4.68	585	5.32	690	23.32
073	Malignant neoplasm of breast (C50) เนื้องอกร้ายที่เต้านม	รวม	32,037	49.28	8,395	71.95	6,148	37.06	3,456	37.30	9,168	41.88	4,870	86.98
		ชาย	267	0.84	40	0.70	50	0.62	31	0.68	87	0.80	59	2.23
		หญิง	31,770	95.93	8,355	140.69	6,098	71.50	3,425	72.87	9,081	82.60	4,811	162.60
074	Malignant neoplasm of cervix uteri (C53) เนื้องอกร้ายที่ปากมดลูก	รวม	16,166	48.81	3,302	55.60	4,038	47.35	1,637	34.83	4,063	36.96	3,126	105.65
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	16,166	48.81	3,302	55.60	4,038	47.35	1,637	34.83	4,063	36.96	3,126	105.65

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
075	Malignant neoplasm of other and unspecified parts of uterus (C54-C55) เนื้องอกร้ายอื่น ๆ ที่มีได้ระบุส่วนของมดลูก	รวม	8,546	25.80	1,353	22.78	1,530	17.94	623	13.25	2,540	23.10	2,500	84.49
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	8,546	25.80	1,353	22.78	1,530	17.94	623	13.25	2,540	23.10	2,500	84.49
076	Other malignant neoplasm of female genital organs (C51-C52, C56-C58) เนื้องอกร้ายของอวัยวะสืบพันธุ์หญิง	รวม	16,902	51.03	2,556	43.04	2,579	30.24	1,190	25.32	5,774	52.52	4,803	162.33
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	16,902	51.03	2,556	43.04	2,579	30.24	1,190	25.32	5,774	52.52	4,803	162.33
077	Malignant neoplasm of prostate (C61) เนื้องอกร้ายที่ต่อมลูกหมาก	รวม	5,969	18.71	1,147	20.02	1,125	13.95	931	20.40	1,445	13.26	1,321	50.04
		ชาย	5,969	18.71	1,147	20.02	1,125	13.95	931	20.40	1,445	13.26	1,321	50.04
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
078	Other malignant neoplasms of male genital organs (C60, C62-C63) เนื้องอกร้ายของอวัยวะสืบพันธุ์ชาย	รวม	1,849	5.80	231	4.03	351	4.35	254	5.56	743	6.82	270	10.23
		ชาย	1,849	5.80	231	4.03	351	4.35	254	5.56	743	6.82	270	10.23
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
079	Malignant neoplasm of bladder (C67) เนื้องอกร้ายที่กระเพาะปัสสาวะ	รวม	8,289	12.75	1,567	13.43	1,489	8.98	1,401	15.12	2,129	9.73	1,703	30.42
		ชาย	6,565	20.58	1,136	19.83	1,155	14.33	1,211	26.53	1,745	16.01	1,318	49.92
		หญิง	1,724	5.21	431	7.26	334	3.92	190	4.04	384	3.49	385	13.01
080	Other malignant neoplasm of urinary tract (C64-C66, C68) เนื้องอกร้ายอื่น ๆ ที่ท่อปัสสาวะ	รวม	2,534	3.90	531	4.55	361	2.18	319	3.44	713	3.26	610	10.90
		ชาย	1,666	5.22	342	5.97	215	2.67	197	4.32	518	4.75	394	14.92
		หญิง	868	2.62	189	3.18	146	1.71	122	2.60	195	1.77	216	7.30

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
081	Malignant neoplasm of eye and adnexa (C69) เนื้องอกร้ายของตาและส่วนประกอบ	รวม	764	1.18	132	1.13	44	0.27	97	1.05	139	0.63	352	6.29
		ชาย	395	1.24	84	1.47	26	0.32	53	1.16	68	0.62	164	6.21
		หญิง	369	1.11	48	0.81	18	0.21	44	0.94	71	0.65	188	6.35
082	Malignant neoplasm of brain (C71) เนื้องอกร้ายของสมอง	รวม	3,551	5.46	535	4.59	496	2.99	497	5.36	1,003	4.58	1,020	18.22
		ชาย	1,986	6.23	265	4.62	288	3.57	308	6.75	528	4.84	597	22.61
		หญิง	1,565	4.73	270	4.55	208	2.44	189	4.02	475	4.32	423	14.30
083	Malignant neoplasm of other parts of central nervous system (C70, C72) เนื้องอกร้ายที่ส่วนอื่น ๆ ของระบบประสาท	รวม	370	0.57	55	0.47	95	0.57	54	0.58	99	0.45	67	1.20
		ชาย	163	0.51	29	0.51	28	0.35	33	0.72	38	0.35	35	1.33
		หญิง	207	0.63	26	0.44	67	0.79	21	0.45	61	0.55	32	1.08
084	Malignant neoplasm of other, ill-defined, secondary, unspecified and multiple sites (C73-C80, C97) เนื้องอกอื่น ๆ และที่ไม่ทราบสาเหตุ เนื้องอกทุติยภูมิที่มีได้ระบุรายละเอียดและเกิดขึ้นหลายแห่ง	รวม	28,715	44.17	5,553	47.59	5,249	31.64	2,417	26.09	8,958	40.92	6,538	116.77
		ชาย	12,516	39.24	2,522	44.02	2,288	28.38	1,131	24.78	3,987	36.58	2,588	98.03
		หญิง	16,199	48.91	3,031	51.04	2,961	34.72	1,286	27.36	4,971	45.22	3,950	133.50
085	Hodgkin's disease (C81) โรคฮอดกินส์	รวม	1,659	2.55	251	2.15	272	1.64	172	1.86	465	2.12	499	8.91
		ชาย	1,016	3.19	165	2.88	152	1.89	108	2.37	297	2.73	294	11.14
		หญิง	643	1.94	86	1.45	120	1.41	64	1.36	168	1.53	205	6.93

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
086	Non-Hodgkin's lymphoma (C82-C85) เนื้องอกร้ายลิมโฟมาที่มีไขโรคฮอดกินส์	รวม	15,906	24.47	2,699	23.13	2,774	16.72	1,467	15.83	5,355	24.46	3,611	64.50
		ชาย	9,167	28.74	1,644	28.69	1,600	19.85	802	17.57	3,105	28.49	2,016	76.36
		หญิง	6,739	20.35	1,055	17.77	1,174	13.77	665	14.15	2,250	20.47	1,595	53.91
087	Leukaemia (C91-C95) ลิวคีเมีย	รวม	18,284	28.12	3,151	27.00	3,698	22.29	2,490	26.88	6,191	28.28	2,754	49.19
		ชาย	10,175	31.90	1,732	30.23	1,959	24.30	1,346	29.49	3,543	32.51	1,595	60.41
		หญิง	8,109	24.48	1,419	23.89	1,739	20.39	1,144	24.34	2,648	24.09	1,159	39.17
088	Other malignant neoplasm of lymphoid, haematopoietic and related tissue (C88-C90, C96) เนื้องอกร้ายอื่น ๆ ของลิมโฟยด์ ระบบสร้าง เม็ดเลือดและเนื้อเยื่อ	รวม	4,403	6.77	721	6.18	737	4.44	459	4.95	1,672	7.64	814	14.54
		ชาย	2,237	7.01	384	6.70	369	4.58	213	4.67	885	8.12	386	14.62
		หญิง	2,166	6.54	337	5.67	368	4.32	246	5.23	787	7.16	428	14.47
089	Carcinoma in situ of cervix uteri (D06) มะเร็งจำกัดเฉพาะที่ของปากมดลูก	รวม	1,378	4.16	211	3.55	351	4.12	173	3.68	519	4.72	124	4.19
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	1,378	4.16	211	3.55	351	4.12	173	3.68	519	4.72	124	4.19
090	Benign neoplasm of skin (D22-D23) เนื้องอกไม่ร้ายของผิวหนัง	รวม	742	1.14	103	0.88	73	0.44	142	1.53	281	1.28	143	2.55
		ชาย	277	0.87	38	0.66	27	0.33	50	1.10	98	0.90	64	2.42
		หญิง	465	1.40	65	1.09	46	0.54	92	1.96	183	1.66	79	2.67

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
091	Benign neoplasm of breast (D24) เนื้องอกไม่ร้ายของเต้านม	รวม	1,239	1.91	183	1.57	272	1.64	213	2.30	422	1.93	149	2.66
		ชาย	4	0.01	1	0.02	1	0.01	0	0.00	2	0.02	0	0.00
		หญิง	1,235	3.73	182	3.06	271	3.18	213	4.53	420	3.82	149	5.04
092	Leiomyoma of uterus (D25) ไลโอไมโอมาที่มดลูก	รวม	17,871	53.96	2,550	42.94	3,252	38.13	2,312	49.19	7,467	67.92	2,290	77.40
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	17,871	53.96	2,550	42.94	3,252	38.13	2,312	49.19	7,467	67.92	2,290	77.40
093	Benign neoplasm of ovary (D27) เนื้องอกไม่ร้ายที่รังไข่	รวม	2,215	6.69	414	6.97	337	3.95	332	7.06	710	6.46	422	14.26
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	2,215	6.69	414	6.97	337	3.95	332	7.06	710	6.46	422	14.26
094	Benign neoplasm of urinary organs (D30) เนื้องอกไม่ร้ายที่ระบบปัสสาวะ	รวม	158	0.24	30	0.26	44	0.27	15	0.16	36	0.16	33	0.59
		ชาย	77	0.24	14	0.24	27	0.33	13	0.28	16	0.15	7	0.27
		หญิง	81	0.24	16	0.27	17	0.20	2	0.04	20	0.18	26	0.88
095	Benign neoplasm of brain and other parts of central nervous system (D33) เนื้องอกไม่ร้ายของสมองและส่วนอื่นของ ระบบประสาทส่วนกลาง	รวม	1,171	1.80	209	1.79	270	1.63	148	1.60	232	1.06	312	5.57
		ชาย	507	1.59	78	1.36	120	1.49	63	1.38	113	1.04	133	5.04
		หญิง	664	2.00	131	2.21	150	1.76	85	1.81	119	1.08	179	6.05

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
096	Other in situ and benign neoplasms and neoplasms of uncertain and unknown behaviour (D00-D05, D07-D21, D26,D28-D29 D31-D32, D34-D48) เนื้องอกไม่ร้ายจำกัดเฉพาะที่อื่น ๆ และเนื้องอกบางชนิดที่ไม่ทราบพฤติกรรม	รวม	39,692	61.05	7,346	62.96	7,586	45.73	4,763	51.41	13,534	61.82	6,463	115.43
		ชาย	16,790	52.64	3,212	56.06	3,153	39.11	2,069	45.33	5,831	53.50	2,525	95.64
		หญิง	22,902	69.15	4,134	69.61	4,433	51.98	2,694	57.32	7,703	70.07	3,938	133.10
097	Iron deficiency anaemia (D50) โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก	รวม	10,719	16.49	2,044	17.52	2,868	17.29	1,213	13.09	4,226	19.30	368	6.57
		ชาย	3,621	11.35	745	13.00	936	11.61	383	8.39	1,423	13.06	134	5.08
		หญิง	7,098	21.43	1,299	21.87	1,932	22.65	830	17.66	2,803	25.50	234	7.91
098	Other anaemia (D51-D64) โลหิตจางอื่น ๆ	รวม	139,517	214.60	37,778	323.77	28,123	169.51	13,604	146.84	54,635	249.57	5,377	96.04
		ชาย	59,720	187.24	17,164	299.56	11,673	144.79	5,723	125.38	22,599	207.37	2,561	97.00
		หญิง	79,797	240.94	20,614	347.12	16,450	192.89	7,881	167.67	32,036	291.41	2,816	95.18
099	Haemorrhagic conditions and other diseases of blood and blood forming organs (D65-D77) ภาวะเลือดออกอื่น ๆ โรคเลือดและอวัยวะที่สร้างเลือด	รวม	20,491	31.52	4,033	34.56	4,399	26.52	2,355	25.42	7,871	35.95	1,833	32.74
		ชาย	9,672	30.33	1,893	33.04	1,873	23.23	1,076	23.57	3,942	36.17	888	33.63
		หญิง	10,819	32.67	2,140	36.04	2,526	29.62	1,279	27.21	3,929	35.74	945	31.94

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
100	Certain disorders involving the immune mechanism (D80-D89) ความผิดปกติที่เกี่ยวกับกลไกของภูมิคุ้มกัน	รวม	901	1.39	140	1.20	181	1.09	75	0.81	195	0.89	310	5.54
		ชาย	703	2.20	106	1.85	164	2.03	63	1.38	165	1.51	205	7.76
		หญิง	198	0.60	34	0.57	17	0.20	12	0.26	30	0.27	105	3.55
101	Iodine deficiency related thyroid disorders (E00-E02) การขาดไอโอดีนที่มีความสัมพันธ์กับต่อมธัยรอยด์	รวม	35	0.05	6	0.05	9	0.05	6	0.06	12	0.05	2	0.04
		ชาย	9	0.03	2	0.03	6	0.07	0	0.00	1	0.01	0	0.00
		หญิง	26	0.08	4	0.07	3	0.04	6	0.13	11	0.10	2	0.07
102	Thyrotoxicosis (E05) โรคพิษธัยรอยด์	รวม	4,768	7.33	712	6.10	1,004	6.05	572	6.17	2,042	9.33	438	7.82
		ชาย	1,390	4.36	168	2.93	327	4.06	166	3.64	591	5.42	138	5.23
		หญิง	3,378	10.20	544	9.16	677	7.94	406	8.64	1,451	13.20	300	10.14
103	Other disorders of thyroid (E03-E04, E06-E07) ความผิดปกติของต่อมธัยรอยด์อื่น ๆ	รวม	8,314	12.79	1,510	12.94	1,394	8.40	1,255	13.55	3,071	14.03	1,084	19.36
		ชาย	1,107	3.47	204	3.56	190	2.36	165	3.61	376	3.45	172	6.51
		หญิง	7,207	21.76	1,306	21.99	1,204	14.12	1,090	23.19	2,695	24.51	912	30.82
104	Diabetes mellitus (E10-E14) เบาหวาน	รวม	109,145	167.88	19,311	165.50	24,858	149.83	13,389	144.52	46,374	211.84	5,213	93.11
		ชาย	42,696	133.87	8,101	141.38	9,377	116.31	5,306	116.25	17,654	161.99	2,258	85.53
		หญิง	66,449	200.64	11,210	188.77	15,481	181.53	8,083	171.97	28,720	261.25	2,955	99.87
105	Malnutrition (E40-E46) ทุพโภชนาการ	รวม	473	0.73	69	0.59	104	0.63	140	1.51	71	0.32	89	1.59
		ชาย	259	0.81	33	0.58	54	0.67	95	2.08	25	0.23	52	1.97
		หญิง	214	0.65	36	0.61	50	0.59	45	0.96	46	0.42	37	1.25

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
106	Vitamin A deficiency (E50) การขาดวิตามินเอ	รวม	10	0.02	2	0.02	1	0.01	0	0.00	6	0.03	1	0.02
		ชาย	2	0.01	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.02	0	0.00
		หญิง	8	0.02	2	0.03	1	0.01	0	0.00	4	0.04	1	0.03
107	Other vitamin deficiencies (E51-E56) การขาดวิตามินอื่น ๆ	รวม	309	0.48	66	0.57	65	0.39	27	0.29	112	0.51	39	0.70
		ชาย	223	0.70	45	0.79	44	0.55	20	0.44	87	0.80	27	1.02
		หญิง	86	0.26	21	0.35	21	0.25	7	0.15	25	0.23	12	0.41
108	Sequelae of malnutrition and other nutritional deficiencies (E64) ผลที่ตามมาของภาวะทุพโภชนาการและ ภาวะพร่องโภชนาการอื่น ๆ	รวม	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
109	Obesity (E66) โรคอ้วน	รวม	645	0.99	91	0.78	57	0.34	140	1.51	67	0.31	290	5.18
		ชาย	315	0.99	54	0.94	23	0.29	64	1.40	29	0.27	145	5.49
		หญิง	330	1.00	37	0.62	34	0.40	76	1.62	38	0.35	145	4.90
110	Volume depletion (E86) การขาดปริมาณของเหลวในร่างกาย	รวม	812	1.25	202	1.73	197	1.19	97	1.05	212	0.97	104	1.86
		ชาย	378	1.19	93	1.62	91	1.13	50	1.10	92	0.84	52	1.97
		หญิง	434	1.31	109	1.84	106	1.24	47	1.00	120	1.09	52	1.76

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
111	Other Endocrine, nutritional and metabolic disorders (E15-E35, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E90) ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิกอื่น ๆ	รวม	76,041	116.96	19,472	166.88	17,927	108.06	6,499	70.15	28,056	128.16	4,087	73.00
		ชาย	31,477	98.69	8,260	144.16	7,138	88.54	2,554	55.95	11,816	108.42	1,709	64.73
		หญิง	44,564	134.56	11,212	188.80	10,789	126.51	3,945	83.93	16,240	147.73	2,378	80.37
112	Dementia (F00-F03) สมองเสื่อม	รวม	1,353	2.08	242	2.07	339	2.04	111	1.20	470	2.15	191	3.41
		ชาย	650	2.04	115	2.01	170	2.11	54	1.18	222	2.04	89	3.37
		หญิง	703	2.12	127	2.14	169	1.98	57	1.21	248	2.26	102	3.45
113	Mental and behavioral disorders due to use of alcohol (F10) ความผิดปกติของพฤติกรรมและจิตประสาทที่เกิดจากการเสพแอลกอฮอล์	รวม	42,644	65.59	10,550	90.42	6,774	40.83	2,018	21.78	22,190	101.36	1,112	19.86
		ชาย	38,809	121.68	9,595	167.46	5,984	74.22	1,900	41.63	20,303	186.30	1,027	38.90
		หญิง	3,835	11.58	955	16.08	790	9.26	118	2.51	1,887	17.17	85	2.87
114	Mental and behavioral disorders due to other psychoactive substance use (F11-F19) ความผิดปกติทางพฤติกรรมและจิตประสาทที่เกิดจากการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทอื่น ๆ	รวม	10,508	16.16	1,604	13.75	2,771	16.70	2,097	22.63	3,025	13.82	1,011	18.06
		ชาย	9,343	29.29	1,351	23.58	2,435	30.20	1,973	43.23	2,747	25.21	837	31.70
		หญิง	1,165	3.52	253	4.26	336	3.94	124	2.64	278	2.53	174	5.88

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
115	Schizophrenia, schizotypal and delusional disorders (F20-F29) จิตเภท พฤติกรรมแบบจิตเภทและความหลง	รวม	34,612	53.24	5,207	44.63	6,035	36.38	4,217	45.52	15,054	68.77	4,099	73.21
		ชาย	23,209	72.77	3,261	56.91	3,601	44.67	3,102	67.96	10,694	98.13	2,551	96.62
		หญิง	11,403	34.43	1,946	32.77	2,434	28.54	1,115	23.72	4,360	39.66	1,548	52.32
116	Mood(affective) disorders (F30-F39) ความผิดปกติทางอารมณ์	รวม	11,515	17.71	2,940	25.20	1,776	10.71	1,783	19.25	4,107	18.76	909	16.24
		ชาย	3,679	11.53	934	16.30	626	7.76	608	13.32	1,147	10.52	364	13.79
		หญิง	7,836	23.66	2,006	33.78	1,150	13.48	1,175	25.00	2,960	26.93	545	18.42
117	Neurotic, stress related and somatoform disorders (F40-F48) โรคประสาท อาการทางกายที่เกิดจากจิตใจ	รวม	7,587	11.67	1,564	13.40	1,396	8.41	1,254	13.54	3,006	13.73	367	6.55
		ชาย	2,286	7.17	431	7.52	568	7.05	376	8.24	761	6.98	150	5.68
		หญิง	5,301	16.01	1,133	19.08	828	9.71	878	18.68	2,245	20.42	217	7.33
118	Mental retardation (F70-F79) ภาวะปัญญาอ่อน	รวม	3,367	5.18	175	1.50	377	2.27	93	1.00	303	1.38	2,419	43.21
		ชาย	2,113	6.62	94	1.64	246	3.05	38	0.83	171	1.57	1,564	59.24
		หญิง	1,254	3.79	81	1.36	131	1.54	55	1.17	132	1.20	855	28.90
119	Other mental and behavioral disorders (F04-F09, F50-F69, F80-F99) ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมอื่น ๆ	รวม	11,139	17.13	2,329	19.96	2,506	15.11	629	6.79	1,780	8.13	3,895	69.57
		ชาย	7,354	23.06	1,603	27.98	1,807	22.41	360	7.89	985	9.04	2,599	98.44
		หญิง	3,785	11.43	726	12.23	699	8.20	269	5.72	795	7.23	1,296	43.80
120	Inflammatory diseases of the central nervous system (G00-G09) การอักเสบของระบบประสาทส่วนกลาง	รวม	12,561	19.32	2,857	24.49	2,316	13.96	1,061	11.45	5,568	25.43	759	13.56
		ชาย	7,641	23.96	1,805	31.50	1,373	17.03	635	13.91	3,430	31.47	398	15.08
		หญิง	4,920	14.86	1,052	17.71	943	11.06	426	9.06	2,138	19.45	361	12.20

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
121	Parkinson's disease (G20) โรคพาคินสัน	รวม	1,188	1.83	221	1.89	217	1.31	97	1.05	503	2.30	150	2.68
		ชาย	598	1.87	104	1.82	113	1.40	37	0.81	261	2.39	83	3.14
		หญิง	590	1.78	117	1.97	104	1.22	60	1.28	242	2.20	67	2.26
122	Alzheimer's disease (G30) โรคอัลไซเมอร์	รวม	530	0.82	156	1.34	109	0.66	43	0.46	120	0.55	102	1.82
		ชาย	201	0.63	69	1.20	36	0.45	14	0.31	47	0.43	35	1.33
		หญิง	329	0.99	87	1.47	73	0.86	29	0.62	73	0.66	67	2.26
123	Multiple sclerosis (G35) มัลติเปิล สเคลอโรสิส	รวม	240	0.37	62	0.53	27	0.16	38	0.41	68	0.31	45	0.80
		ชาย	35	0.11	7	0.12	8	0.10	5	0.11	4	0.04	11	0.42
		หญิง	205	0.62	55	0.93	19	0.22	33	0.70	64	0.58	34	1.15
124	Epilepsy (G40-G41) ลมบ้าหมู	รวม	39,628	60.95	8,201	70.28	9,203	55.47	5,830	62.93	13,885	63.43	2,509	44.81
		ชาย	25,331	79.42	5,302	92.53	5,966	74.00	3,673	80.47	8,874	81.43	1,516	57.42
		หญิง	14,297	43.17	2,899	48.82	3,237	37.96	2,157	45.89	5,011	45.58	993	33.56
125	Migraine and other headache syndromes (G43-G44) โรคไมเกรนและกลุ่มอาการปวดศีรษะอื่น ๆ	รวม	9,164	14.10	1,460	12.51	1,703	10.27	1,746	18.85	3,999	18.27	256	4.57
		ชาย	3,038	9.53	474	8.27	534	6.62	585	12.82	1,352	12.41	93	3.52
		หญิง	6,126	18.50	986	16.60	1,169	13.71	1,161	24.70	2,647	24.08	163	5.51
126	Transient cerebral ischaemic attacks and related syndromes (G45) โรคเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยชั่วคราวและกลุ่ม	รวม	9,848	15.15	1,876	16.08	2,502	15.08	1,567	16.91	3,170	14.48	733	13.09
		ชาย	5,401	16.93	1,039	18.13	1,396	17.32	881	19.30	1,694	15.54	391	14.81
		หญิง	4,447	13.43	837	14.09	1,106	12.97	686	14.60	1,476	13.43	342	11.56

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
127	Nerve, nerve root and plexus disorders (G50-G59) ความผิดปกติของเส้นประสาท รากประสาท	รวม	4,623	7.11	734	6.29	847	5.11	728	7.86	1,634	7.46	680	12.15
		ชาย	1,806	5.66	302	5.27	341	4.23	215	4.71	661	6.07	287	10.87
		หญิง	2,817	8.51	432	7.27	506	5.93	513	10.91	973	8.85	393	13.28
128	Cerebral palsy and other paralytic syndromes (G80-G83) สมองพิการและกลุ่มอาการอัมพาตอื่น ๆ	รวม	4,874	7.50	885	7.58	985	5.94	853	9.21	1,499	6.85	652	11.65
		ชาย	2,967	9.30	573	10.00	580	7.19	501	10.98	916	8.41	397	15.04
		หญิง	1,907	5.76	312	5.25	405	4.75	352	7.49	583	5.30	255	8.62
129	Other diseases of the nervous system (G10-G13, G21-G26, G31-G32, G36-G37, G46-G47, G60-G73, G90-G99) โรคของระบบประสาทอื่น ๆ	รวม	25,990	39.98	5,365	45.98	4,416	26.62	2,188	23.62	11,241	51.35	2,780	49.65
		ชาย	16,311	51.14	3,361	58.66	2,677	33.20	1,274	27.91	7,484	68.67	1,515	57.38
		หญิง	9,679	29.22	2,004	33.75	1,739	20.39	914	19.45	3,757	34.18	1,265	42.75
130	Inflammation of eyelid (H00-H01) การอักเสบของหนังตา	รวม	1,681	2.59	302	2.59	328	1.98	281	3.03	705	3.22	65	1.16
		ชาย	819	2.57	148	2.58	144	1.79	148	3.24	349	3.20	30	1.14
		หญิง	862	2.60	154	2.59	184	2.16	133	2.83	356	3.24	35	1.18
131	Conjunctivitis and other disorders of conjunctiva (H10-H13) เยื่อบุตาอักเสบและความผิดปกติของเยื่อบุตา	รวม	9,746	14.99	1,793	15.37	2,203	13.28	755	8.15	4,742	21.66	253	4.52
		ชาย	3,477	10.90	679	11.85	847	10.51	281	6.16	1,535	14.08	135	5.11
		หญิง	6,269	18.93	1,114	18.76	1,356	15.90	474	10.08	3,207	29.17	118	3.99
132	Keratitis and other disorders of sclera and cornea (H15-H19) กระจกตาอักเสบและความผิดปกติของตา	รวม	6,494	9.99	1,209	10.36	1,383	8.34	683	7.37	2,422	11.06	797	14.24
		ชาย	3,935	12.34	753	13.14	807	10.01	438	9.60	1,501	13.77	436	16.51
		หญิง	2,559	7.73	456	7.68	576	6.75	245	5.21	921	8.38	361	12.20

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
133	Cataract and other disorders of sclera and cornea (H25-H28) ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ	รวม	207,137	318.61	43,538	373.13	59,031	355.82	21,779	235.08	60,302	275.46	22,487	401.63
		ชาย	88,803	278.43	19,194	334.99	24,154	299.60	9,304	203.84	26,136	239.82	10,015	379.34
		หญิง	118,334	357.30	24,344	409.93	34,877	408.96	12,475	265.42	34,166	310.79	12,472	421.53
134	Retinal detachments and breaks (H33) จอประสาทตาหลุดออกและรอยฉีกของจอประสาทตา	รวม	5,681	8.74	892	7.64	1,466	8.84	549	5.93	1,024	4.68	1,750	31.26
		ชาย	3,423	10.73	517	9.02	899	11.15	318	6.97	617	5.66	1,072	40.60
		หญิง	2,258	6.82	375	6.31	567	6.65	231	4.91	407	3.70	678	22.92
135	Glaucoma (H40-H42) ต้อหิน	รวม	6,916	10.64	1,724	14.78	1,351	8.14	648	6.99	2,081	9.51	1,112	19.86
		ชาย	3,067	9.62	704	12.29	598	7.42	317	6.95	811	7.44	637	24.13
		หญิง	3,849	11.62	1,020	17.18	753	8.83	331	7.04	1,270	11.55	475	16.05
136	Strabismus (H49-H50) ตาเหล่	รวม	1,944	2.99	206	1.77	319	1.92	298	3.22	467	2.13	654	11.68
		ชาย	916	2.87	102	1.78	170	2.11	146	3.20	201	1.84	297	11.25
		หญิง	1,028	3.10	104	1.75	149	1.75	152	3.23	266	2.42	357	12.07
137	Disorders of refraction and accommodation (H52) ความผิดปกติของสายตาและการเพ่งมอง	รวม	69	0.11	13	0.11	13	0.08	9	0.10	24	0.11	10	0.18
		ชาย	34	0.11	3	0.05	7	0.09	5	0.11	13	0.12	6	0.23
		หญิง	35	0.11	10	0.17	6	0.07	4	0.09	11	0.10	4	0.14
138	Blindness and low vision (H54) ตาบอดและสายตาเลือนราง	รวม	360	0.55	46	0.39	167	1.01	23	0.25	55	0.25	69	1.23
		ชาย	155	0.49	24	0.42	68	0.84	13	0.28	22	0.20	28	1.06
		หญิง	205	0.62	22	0.37	99	1.16	10	0.21	33	0.30	41	1.39

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
139	Other diseases of the eye and adnexa (H02-H06, H20-H22, H30-H32, H34-H36, H43-H48, H51, H53, H55-H59) โรคของตาและส่วนประกอบของตาอื่น ๆ	รวม	15,934	24.51	2,589	22.19	3,230	19.47	1,906	20.57	5,057	23.10	3,152	56.30
		ชาย	7,022	22.02	1,113	19.42	1,409	17.48	936	20.51	2,106	19.32	1,458	55.22
		หญิง	8,912	26.91	1,476	24.85	1,821	21.35	970	20.64	2,951	26.84	1,694	57.25
140	Otitis media and other disorders of middle ear and mastoid (H65-H75) หูชั้นกลางอักเสบและความผิดปกติของหูชั้น กลางและปุ่มกกหูอื่น ๆ	รวม	4,695	7.22	898	7.70	797	4.80	1,041	11.24	1,290	5.89	669	11.95
		ชาย	2,329	7.30	393	6.86	428	5.31	529	11.59	639	5.86	340	12.88
		หญิง	2,366	7.14	505	8.50	369	4.33	512	10.89	651	5.92	329	11.12
141	Hearing loss (H90-H91) การสูญเสียการได้ยิน	รวม	661	1.02	64	0.55	135	0.81	58	0.63	191	0.87	213	3.80
		ชาย	328	1.03	37	0.65	75	0.93	25	0.55	82	0.75	109	4.13
		หญิง	333	1.01	27	0.45	60	0.70	33	0.70	109	0.99	104	3.51
142	Other diseases of the ear and mastoid process (H60-H62, H80-H83, H92-H95) โรคของหูและปุ่มกกหูอื่น ๆ	รวม	18,824	28.95	2,915	24.98	4,540	27.37	3,733	40.29	6,746	30.82	890	15.90
		ชาย	5,606	17.58	934	16.30	1,278	15.85	1,106	24.23	1,971	18.09	317	12.01
		หญิง	13,218	39.91	1,981	33.36	3,262	38.25	2,627	55.89	4,775	43.44	573	19.37
143	Acute rheumatic fever (I00-I02) ไข้รูมาติกเฉียบพลัน	รวม	292	0.45	25	0.21	43	0.26	78	0.84	111	0.51	35	0.63
		ชาย	153	0.48	11	0.19	22	0.27	40	0.88	64	0.59	16	0.61
		หญิง	139	0.42	14	0.24	21	0.25	38	0.81	47	0.43	19	0.64

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
144	Chronic rheumatic heart disease (I05-I09) โรคหัวใจรูมาติกเรื้อรัง	รวม	4,874	7.50	965	8.27	994	5.99	537	5.80	1,739	7.94	639	11.41
		ชาย	1,876	5.88	371	6.47	369	4.58	188	4.12	703	6.45	245	9.28
		หญิง	2,998	9.05	594	10.00	625	7.33	349	7.43	1,036	9.42	394	13.32
145	Essential (primary) hypertension (I10) ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุ	รวม	44,861	69.00	8,140	69.76	10,251	61.79	7,102	76.66	17,654	80.64	1,714	30.61
		ชาย	16,744	52.50	3,056	53.34	3,695	45.83	2,489	54.53	6,826	62.63	678	25.68
		หญิง	28,117	84.90	5,084	85.61	6,556	76.87	4,613	98.15	10,828	98.50	1,036	35.01
146	Other hypertensive diseases (I11-I15) โรคความดันโลหิตสูงอื่น ๆ	รวม	2,277	3.50	400	3.43	480	2.89	491	5.30	558	2.55	348	6.22
		ชาย	942	2.95	155	2.71	183	2.27	214	4.69	252	2.31	138	5.23
		หญิง	1,335	4.03	245	4.13	297	3.48	277	5.89	306	2.78	210	7.10
147	Acute myocardial infarction (I21-I22) กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน	รวม	63,990	98.43	11,201	96.00	19,191	115.68	11,062	119.40	16,305	74.48	6,231	111.29
		ชาย	38,324	120.16	5,943	103.72	11,162	138.45	7,407	162.28	9,798	89.91	4,014	152.04
		หญิง	25,666	77.50	5,258	88.54	8,029	94.15	3,655	77.76	6,507	59.19	2,217	74.93
148	Other ischaemic heart diseases (I20, I23-I25) โรคหัวใจขาดเลือดอื่น ๆ	รวม	72,671	111.78	10,632	91.12	22,746	137.10	10,430	112.58	14,528	66.36	14,335	256.03
		ชาย	44,255	138.75	5,899	102.95	13,262	164.50	7,070	154.89	8,610	79.00	9,414	356.58
		หญิง	28,416	85.80	4,733	79.70	9,484	111.21	3,360	71.49	5,918	53.83	4,921	166.32
149	Pulmonary embolism (I26) ก้อนเลือดอุดตันในหลอดเลือดใหญ่ของปอด	รวม	1,727	2.66	264	2.26	469	2.83	254	2.74	441	2.01	299	5.34
		ชาย	663	2.08	95	1.66	173	2.15	114	2.50	171	1.57	110	4.17
		หญิง	1,064	3.21	169	2.85	296	3.47	140	2.98	270	2.46	189	6.39

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
150	Conduction disorders and cardiac arrhythmias (I44-I49) ความผิดปกติของการนำกระแสไฟฟ้าหัวใจ	รวม	48,611	74.77	9,883	84.70	12,071	72.76	5,050	54.51	17,215	78.64	4,392	78.44
		ชาย	19,780	62.02	3,943	68.82	4,841	60.05	2,116	46.36	6,921	63.51	1,959	74.20
		หญิง	28,831	87.05	5,940	100.02	7,230	84.78	2,934	62.42	10,294	93.64	2,433	82.23
151	Heart failure (I50) หัวใจล้มเหลว	รวม	99,262	152.68	20,831	178.53	28,381	171.07	16,442	177.47	26,732	122.11	6,876	122.81
		ชาย	42,052	131.85	8,455	147.56	11,486	142.47	7,241	158.64	11,857	108.80	3,013	114.12
		หญิง	57,210	172.74	12,376	208.40	16,895	198.11	9,201	195.76	14,875	135.31	3,863	130.56
152	Other heart diseases (I27-I43, I51-I52) โรคหัวใจอื่น ๆ	รวม	19,690	30.29	3,727	31.94	4,502	27.14	2,217	23.93	6,021	27.50	3,223	57.57
		ชาย	10,797	33.85	2,098	36.62	2,494	30.94	1,170	25.63	3,301	30.29	1,734	65.68
		หญิง	8,893	26.85	1,629	27.43	2,008	23.55	1,047	22.28	2,720	24.74	1,489	50.33
153	Intracranial haemorrhage (I60-I62) เลือดออกในสมอง	รวม	40,249	61.91	8,615	73.83	11,416	68.81	4,976	53.71	11,383	52.00	3,859	68.92
		ชาย	24,106	75.58	5,146	89.81	6,845	84.90	2,932	64.24	6,950	63.77	2,233	84.58
		หญิง	16,143	48.74	3,469	58.41	4,571	53.60	2,044	43.49	4,433	40.32	1,626	54.96
154	Cerebral infraction (I63) เนื้อสมองตาย	รวม	89,257	137.29	15,460	132.50	24,047	144.95	12,510	135.03	30,248	138.17	6,992	124.88
		ชาย	48,337	151.55	8,300	144.86	13,031	161.63	6,876	150.64	16,247	149.08	3,883	147.08
		หญิง	40,920	123.55	7,160	120.57	11,016	129.17	5,634	119.87	14,001	127.36	3,109	105.08
155	Stroke, not specified as haemorrhage or infarction (I64) เป็นลมหมดสติที่ไม่จัดกลุ่มว่าเป็นจากเลือดออกในสมองหรือเนื้อสมองตายจากการขาดเลือด	รวม	14,169	21.79	2,869	24.59	3,100	18.69	2,159	23.30	5,266	24.06	775	13.84
		ชาย	7,626	23.91	1,542	26.91	1,707	21.17	1,113	24.38	2,820	25.88	444	16.82
		หญิง	6,543	19.76	1,327	22.35	1,393	16.33	1,046	22.25	2,446	22.25	331	11.19

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
156	Other cerebrovascular diseases	รวม	7,602	11.69	1,708	14.64	1,433	8.64	1,142	12.33	2,210	10.10	1,109	19.81
	(I65-I69)	ชาย	4,118	12.91	940	16.41	795	9.86	594	13.01	1,202	11.03	587	22.23
	โรคหลอดเลือดในสมองอื่น ๆ	หญิง	3,484	10.52	768	12.93	638	7.48	548	11.66	1,008	9.17	522	17.64
157	Atherosclerosis (I70)	รวม	918	1.41	125	1.07	184	1.11	113	1.22	49	0.22	447	7.98
	อะเธอโรสเคลอโรสิส	ชาย	509	1.60	59	1.03	102	1.27	75	1.64	22	0.20	251	9.51
		หญิง	409	1.23	66	1.11	82	0.96	38	0.81	27	0.25	196	6.62
158	Other peripheral vascular diseases	รวม	486	0.75	80	0.69	99	0.60	57	0.62	111	0.51	139	2.48
	(I73)	ชาย	305	0.96	45	0.79	67	0.83	28	0.61	71	0.65	94	3.56
	โรคหลอดเลือดส่วนปลายอื่น ๆ	หญิง	181	0.55	35	0.59	32	0.38	29	0.62	40	0.36	45	1.52
159	Aterial embolism and thrombosis	รวม	3,387	5.21	649	5.56	722	4.35	484	5.22	1,060	4.84	472	8.43
	(I74)	ชาย	1,912	5.99	351	6.13	390	4.84	298	6.53	589	5.40	284	10.76
	ลิ่มเลือดและก้อนเลือดอุดตันที่หลอดเลือด	หญิง	1,475	4.45	298	5.02	332	3.89	186	3.96	471	4.28	188	6.35
160	Other disease of arteries, arterioles	รวม	6,335	9.74	1,230	10.54	1,177	7.09	862	9.30	1,763	8.05	1,303	23.27
	and capillaries (I71-I72, I77-I79)	ชาย	4,075	12.78	695	12.13	732	9.08	604	13.23	1,148	10.53	896	33.94
	โรคของหลอดเลือดแดง หลอดเลือดแดง	หญิง	2,260	6.82	535	9.01	445	5.22	258	5.49	615	5.59	407	13.76
161	Phlebitis, thrombophlebitis, venous	รวม	4,543	6.99	812	6.96	960	5.79	572	6.17	1,782	8.14	417	7.45
	embolism and thrombosis (I80-I82)	ชาย	1,796	5.63	324	5.65	361	4.48	218	4.78	710	6.51	183	6.93
	หลอดเลือดดำอักเสบ หลอดเลือดดำ	หญิง	2,747	8.29	488	8.22	599	7.02	354	7.53	1,072	9.75	234	7.91

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
162	Varicose veins of lower extremities (I83) หลอดเลือดดำขอดของระยางส่วนล่าง	รวม	1,206	1.86	190	1.63	404	2.44	157	1.69	195	0.89	260	4.64
		ชาย	450	1.41	66	1.15	158	1.96	50	1.10	84	0.77	92	3.48
		หญิง	756	2.28	124	2.09	246	2.88	107	2.28	111	1.01	168	5.68
163	Haemorrhoids (I84) ริดสีดวงทวาร	รวม	11,176	17.19	2,228	19.09	2,371	14.29	1,691	18.25	3,919	17.90	967	17.27
		ชาย	6,376	19.99	1,346	23.49	1,354	16.79	960	21.03	2,201	20.20	515	19.51
		หญิง	4,800	14.49	882	14.85	1,017	11.93	731	15.55	1,718	15.63	452	15.28
164	Other diseases of the circulatory system (I85-I99) โรคอื่น ๆ ของระบบไหลเวียนโลหิต	รวม	16,228	24.96	4,844	41.51	4,231	25.50	1,623	17.52	4,289	19.59	1,241	22.17
		ชาย	9,731	30.51	2,952	51.52	2,595	32.19	960	21.03	2,565	23.54	659	24.96
		หญิง	6,497	19.62	1,892	31.86	1,636	19.18	663	14.11	1,724	15.68	582	19.67
165	Acute pharyngitis and acute tonsillitis (J02-J03) คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบ	รวม	74,643	114.81	16,525	141.62	18,240	109.94	14,218	153.47	23,006	105.09	2,654	47.40
		ชาย	38,789	121.62	8,913	155.56	9,701	120.33	7,186	157.43	11,663	107.02	1,326	50.23
		หญิง	35,854	108.26	7,612	128.18	8,539	100.13	7,032	149.61	11,343	103.18	1,328	44.88
166	Acute laryngitis and tracheitis (J04) กล่องเสียงและหลอดลมใหญ่อักเสบเฉียบพลัน	รวม	682	1.05	115	0.99	137	0.83	65	0.70	301	1.37	64	1.14
		ชาย	372	1.17	53	0.93	70	0.87	44	0.96	171	1.57	34	1.29
		หญิง	310	0.94	62	1.04	67	0.79	21	0.45	130	1.18	30	1.01
167	Other acute upper respiratory infections (J00-J01, J05-J06) การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบ เฉียบพลันอื่น ๆ	รวม	47,440	72.97	8,131	69.68	12,159	73.29	9,239	99.72	15,865	72.47	2,046	36.54
		ชาย	26,506	83.11	4,620	80.63	7,271	90.19	4,754	104.15	8,795	80.70	1,066	40.38
		หญิง	20,934	63.21	3,511	59.12	4,888	57.32	4,485	95.42	7,070	64.31	980	33.12

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
168	Influenza (J09-J11) ไข้หวัดใหญ่	รวม	41,556	63.92	7,263	62.25	11,835	71.34	4,563	49.25	13,545	61.87	4,350	77.69
		ชาย	21,443	67.23	3,836	66.95	6,304	78.19	2,271	49.75	6,809	62.48	2,223	84.20
		หญิง	20,113	60.73	3,427	57.71	5,531	64.86	2,292	48.76	6,736	61.27	2,127	71.89
169	Pneumonia (J12-J18) ปอดบวม	รวม	357,284	549.55	61,052	523.23	81,427	490.81	54,867	592.22	143,799	656.87	16,139	288.25
		ชาย	193,932	608.04	33,571	585.91	43,992	545.67	30,419	666.44	77,050	707.00	8,900	337.11
		หญิง	163,352	493.23	27,481	462.76	37,435	438.95	24,448	520.15	66,749	607.18	7,239	244.66
170	Acute bronchitis and acute bronchiolitis (J20-J21) หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็ก	รวม	155,087	238.55	29,081	249.23	32,501	195.90	28,169	304.05	60,434	276.06	4,902	87.55
		ชาย	85,203	267.14	16,140	281.69	17,626	218.63	15,684	343.61	33,010	302.90	2,743	103.90
		หญิง	69,884	211.01	12,941	217.92	14,875	174.42	12,485	265.63	27,424	249.46	2,159	72.97
171	Chronic sinusitis (J32) ไซนัสอักเสบเรื้อรัง	รวม	2,610	4.01	515	4.41	581	3.50	297	3.21	712	3.25	505	9.02
		ชาย	1,315	4.12	267	4.66	298	3.70	136	2.98	343	3.15	271	10.26
		หญิง	1,295	3.91	248	4.18	283	3.32	161	3.43	369	3.36	234	7.91
172	Other diseases of nose and nasal sinuses (J30-J31, J33-J34) โรคอื่นของจมูกและไซนัส	รวม	3,184	4.90	654	5.60	626	3.77	414	4.47	919	4.20	571	10.20
		ชาย	1,850	5.80	378	6.60	367	4.55	242	5.30	524	4.81	339	12.84
		หญิง	1,334	4.03	276	4.65	259	3.04	172	3.66	395	3.59	232	7.84
173	Chronic diseases of tonsils and adenoids (J35) โรคเรื้อรังของต่อมทอนซิล และต่อมน้ำเหลืองในคอ	รวม	7,362	11.32	1,396	11.96	1,438	8.67	1,043	11.26	2,267	10.36	1,218	21.75
		ชาย	3,848	12.06	737	12.86	745	9.24	518	11.35	1,114	10.22	734	27.80
		หญิง	3,514	10.61	659	11.10	693	8.13	525	11.17	1,153	10.49	484	16.36

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
174	Other diseases of upper respiratory tract (J36-J39) โรคอื่น ๆ ของระบบหายใจส่วนบน	รวม	4,667	7.18	896	7.68	828	4.99	661	7.13	1,427	6.52	855	15.27
		ชาย	2,789	8.74	562	9.81	495	6.14	414	9.07	839	7.70	479	18.14
		หญิง	1,878	5.67	334	5.62	333	3.90	247	5.26	588	5.35	376	12.71
175	Bronchitis, emphysema and other chronic obstructive pulmonary diseases (J40-J44) โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น	รวม	150,616	231.67	43,561	373.33	29,922	180.36	31,118	335.88	41,598	190.02	4,417	78.89
		ชาย	111,164	348.54	27,550	480.82	23,441	290.76	23,777	520.92	33,060	303.35	3,336	126.36
		หญิง	39,452	119.12	16,011	269.61	6,481	75.99	7,341	156.19	8,538	77.67	1,081	36.54
176	Asthma (J45-J46) โรคหืด	รวม	59,268	91.16	8,898	76.26	14,232	85.79	13,223	142.73	20,089	91.77	2,826	50.47
		ชาย	22,594	70.84	3,403	59.39	5,410	67.10	4,877	106.85	7,701	70.66	1,203	45.57
		หญิง	36,674	110.73	5,495	92.53	8,822	103.44	8,346	177.57	12,388	112.69	1,623	54.85
177	Bronchioectasis (J47) โรคหลอดลมเล็กโป่งพอง	รวม	9,092	13.98	1,486	12.74	1,621	9.77	1,118	12.07	4,372	19.97	495	8.84
		ชาย	4,201	13.17	781	13.63	762	9.45	448	9.82	1,961	17.99	249	9.43
		หญิง	4,891	14.77	705	11.87	859	10.07	670	14.25	2,411	21.93	246	8.31
178	Pneumoconiosis (J60-J65) โรคฝุ่นสะสมในปอด	รวม	79	0.12	10	0.09	10	0.06	7	0.08	44	0.20	8	0.14
		ชาย	62	0.19	8	0.14	4	0.05	5	0.11	42	0.39	3	0.11
		หญิง	17	0.05	2	0.03	6	0.07	2	0.04	2	0.02	5	0.17
179	Other diseases of the respiratory system (J22, J66-J99) โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินหายใจ	รวม	44,282	68.11	9,415	80.69	10,358	62.43	5,924	63.94	14,474	66.12	4,111	73.43
		ชาย	27,038	84.77	5,689	99.29	6,239	77.39	3,584	78.52	9,108	83.57	2,418	91.59
		หญิง	17,244	52.07	3,726	62.74	4,119	48.30	2,340	49.79	5,366	48.81	1,693	57.22

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
180	Dental caries (K02) ฟันผุ	รวม	957	1.47	155	1.33	216	1.30	206	2.22	226	1.03	154	2.75
		ชาย	482	1.51	73	1.27	122	1.51	104	2.28	106	0.97	77	2.92
		หญิง	475	1.43	82	1.38	94	1.10	102	2.17	120	1.09	77	2.60
181	Other disorders of teeth and supporting structures (K00-K01, K03-K08) ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง	รวม	5,172	7.96	956	8.19	1,059	6.38	795	8.58	2,065	9.43	297	5.30
		ชาย	2,469	7.74	457	7.98	503	6.24	415	9.09	958	8.79	136	5.15
		หญิง	2,703	8.16	499	8.40	556	6.52	380	8.08	1,107	10.07	161	5.44
182	Other diseases of the oral cavity, salivary glands and jaws (K09-K14) โรคอื่น ๆ ของช่องปาก ต่อมน้ำลายและ ขากรรไกร	รวม	12,068	18.56	2,192	18.79	2,020	12.18	1,605	17.32	5,520	25.22	731	13.06
		ชาย	6,072	19.04	1,099	19.18	1,034	12.83	843	18.47	2,729	25.04	367	13.90
		หญิง	5,996	18.10	1,093	18.41	986	11.56	762	16.21	2,791	25.39	364	12.30
183	Gastric and duodenal ulcer (K25-K27) แผลเปื่อยของกระเพาะอาหารดูโอเดนิ้ม	รวม	28,884	44.43	6,576	56.36	7,659	46.17	2,160	23.31	10,285	46.98	2,204	39.37
		ชาย	19,704	61.78	4,450	77.66	5,019	62.25	1,432	31.37	7,406	67.96	1,397	52.91
		หญิง	9,180	27.72	2,126	35.80	2,640	30.96	728	15.49	2,879	26.19	807	27.27
184	Gastritis and duodenitis (K29) กระเพาะอาหารอักเสบและดูโอเดนิ้มอักเสบ	รวม	68,222	104.94	12,162	104.23	16,577	99.92	11,557	124.74	24,597	112.36	3,329	59.46
		ชาย	35,048	109.89	6,254	109.15	8,388	104.04	5,732	125.58	13,014	119.41	1,660	62.88
		หญิง	33,174	100.17	5,908	99.49	8,189	96.02	5,825	123.93	11,583	105.36	1,669	56.41

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
185	Other diseases of oesophagus, stomach and duodenum (K20-K23, K28, K30-K31) โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอดีนัม	รวม	80,988	124.57	14,000	119.98	14,262	85.97	15,429	166.54	35,250	161.02	2,047	36.56
		ชาย	36,438	114.25	6,202	108.24	6,449	79.99	6,829	149.61	15,943	146.29	1,015	38.45
		หญิง	44,550	134.51	7,798	131.31	7,813	91.61	8,600	182.97	19,307	175.63	1,032	34.88
186	Diseases of appendix (K35-K38) โรคของไส้ติ่ง	รวม	91,940	141.42	18,931	162.24	19,270	116.15	12,360	133.41	35,788	163.48	5,591	99.86
		ชาย	43,529	136.48	9,008	157.21	9,403	116.63	6,015	131.78	16,200	148.65	2,903	109.96
		หญิง	48,411	146.17	9,923	167.09	9,867	115.70	6,345	134.99	19,588	178.18	2,688	90.85
187	Inguinal hernia (K40) ไส้เลื่อนที่บริเวณขาหนีบ	รวม	31,890	49.05	7,180	61.53	6,827	41.15	5,053	54.54	9,944	45.42	2,886	51.55
		ชาย	30,115	94.42	6,797	118.63	6,461	80.14	4,723	103.47	9,418	86.42	2,716	102.87
		หญิง	1,775	5.36	383	6.45	366	4.29	330	7.02	526	4.78	170	5.75
188	Other hernia (K41-K46) ไส้เลื่อนอื่น ๆ	รวม	3,849	5.92	793	6.80	1,007	6.07	582	6.28	822	3.75	645	11.52
		ชาย	1,601	5.02	333	5.81	380	4.71	238	5.21	390	3.58	260	9.85
		หญิง	2,248	6.79	460	7.75	627	7.35	344	7.32	432	3.93	385	13.01
189	Crohn's disease and ulcerative colitis (K50-K51) โรคโครนและลำไส้ใหญ่อักเสบแผลเปื่อย	รวม	789	1.21	148	1.27	175	1.05	87	0.94	210	0.96	169	3.02
		ชาย	385	1.21	54	0.94	80	0.99	47	1.03	102	0.94	102	3.86
		หญิง	404	1.22	94	1.58	95	1.11	40	0.85	108	0.98	67	2.26
190	Paralytic ileus and intestinal obstruction without hernia (K56) ลำไส้ไม่ทำงานและลำไส้เกิดอุดตันแบบไม่มีไส้เลื่อน	รวม	22,881	35.19	5,292	45.35	4,763	28.71	3,045	32.87	8,272	37.79	1,509	26.95
		ชาย	14,113	44.25	3,233	56.42	2,878	35.70	1,956	42.85	5,241	48.09	805	30.49
		หญิง	8,768	26.47	2,059	34.67	1,885	22.10	1,089	23.17	3,031	27.57	704	23.79

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
191	Diverticular disease of intestine (K57) โรคติ่งเนื้อของลำไส้	รวม	5,170	7.95	1,226	10.51	1,325	7.99	541	5.84	1,341	6.13	737	13.16
		ชาย	2,549	7.99	565	9.86	637	7.90	277	6.07	703	6.45	367	13.90
		หญิง	2,621	7.91	661	11.13	688	8.07	264	5.62	638	5.80	370	12.51
192	Other diseases of intestine and peritoneum (K52-K55, K58-K67) โรคอื่น ๆ ของลำไส้และเยื่อช่องท้อง	รวม	50,534	77.73	10,718	91.86	11,842	71.38	6,382	68.89	17,192	78.53	4,400	78.59
		ชาย	28,633	89.77	6,070	105.94	6,504	80.67	3,535	77.45	9,973	91.51	2,551	96.62
		หญิง	21,901	66.13	4,648	78.27	5,338	62.59	2,847	60.57	7,219	65.67	1,849	62.49
193	Alcoholic liver disease (K70) โรคตับเกี่ยวกับแอลกอฮอล์	รวม	13,193	20.29	2,653	22.74	3,318	20.00	969	10.46	5,459	24.94	794	14.18
		ชาย	10,285	32.25	2,125	37.09	2,389	29.63	850	18.62	4,278	39.25	643	24.36
		หญิง	2,908	8.78	528	8.89	929	10.89	119	2.53	1,181	10.74	151	5.10
194	Other disease of liver (K71-K77) โรคอื่น ๆ ของตับ	รวม	30,821	47.41	6,206	53.19	6,978	42.06	2,948	31.82	12,521	57.20	2,168	38.72
		ชาย	18,781	58.88	3,983	69.51	3,947	48.96	1,782	39.04	7,863	72.15	1,206	45.68
		หญิง	12,040	36.35	2,223	37.43	3,031	35.54	1,166	24.81	4,658	42.37	962	32.51
195	Cholelithiasis and cholecystitis (K80-K81) โรคนิ่วในระบบน้ำดีและถุงน้ำดีอักเสบ	รวม	53,816	82.78	10,361	88.80	11,487	69.24	4,625	49.92	21,860	99.86	5,483	97.93
		ชาย	20,918	65.59	3,955	69.03	4,349	53.94	1,667	36.52	8,658	79.44	2,289	86.70
		หญิง	32,898	99.33	6,406	107.87	7,138	83.70	2,958	62.93	13,202	120.09	3,194	107.95
196	Acute pancreatitis and other disease of the pancreas (K85-K86) ตับอ่อนอักเสบ เฉียบพลันและโรคอื่น ๆ ของตับอ่อน	รวม	15,602	24.00	3,359	28.79	4,028	24.28	1,512	16.32	5,130	23.43	1,573	28.09
		ชาย	11,522	36.13	2,539	44.31	2,889	35.83	1,010	22.13	4,050	37.16	1,034	39.16
		หญิง	4,080	12.32	820	13.81	1,139	13.36	502	10.68	1,080	9.82	539	18.22
197	Other diseases of the digestive system (K82-K83, K87-K93) โรคอื่น ๆ ของระบบย่อยอาหาร	รวม	67,306	103.53	16,995	145.65	16,608	100.11	6,657	71.85	22,894	104.58	4,152	74.16
		ชาย	43,251	135.61	11,107	193.85	10,308	127.86	4,121	90.29	15,386	141.18	2,329	88.22
		หญิง	24,055	72.63	5,888	99.15	6,300	73.87	2,536	53.96	7,508	68.30	1,823	61.61

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
198	Infection of the skin and subcutaneous tissue (L00-L08) โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	รวม	107,116	164.76	20,111	172.36	23,091	139.18	17,772	191.83	42,229	192.90	3,913	69.89
		ชาย	60,234	188.85	11,603	202.50	12,332	152.96	9,837	215.51	24,406	223.95	2,056	77.88
		หญิง	46,882	141.56	8,508	143.27	10,759	126.16	7,935	168.82	17,823	162.13	1,857	62.76
199	Other diseases of the skin and subcutaneous tissue (L10-L99) โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	รวม	40,598	62.45	8,008	68.63	9,939	59.91	5,617	60.63	13,946	63.71	3,088	55.15
		ชาย	20,926	65.61	4,053	70.74	4,931	61.16	2,926	64.10	7,468	68.53	1,548	58.63
		หญิง	19,672	59.40	3,955	66.60	5,008	58.72	2,691	57.25	6,478	58.93	1,540	52.05
200	Rheumatoid arthritis and other inflammatory polyarthropathies (M05-M14) ข้ออักเสบรูมาตอยและข้ออักเสบหลายข้อ	รวม	17,472	26.87	3,885	33.30	3,164	19.07	2,013	21.73	7,531	34.40	879	15.70
		ชาย	10,409	32.64	2,300	40.14	1,843	22.86	1,290	28.26	4,543	41.69	433	16.40
		หญิง	7,063	21.33	1,585	26.69	1,321	15.49	723	15.38	2,988	27.18	446	15.07
201	Arthrosis (M15-M19) โรคข้อเสื่อม	รวม	25,889	39.82	6,638	56.89	8,819	53.16	1,712	18.48	2,901	13.25	5,819	103.93
		ชาย	5,117	16.04	1,461	25.50	1,566	19.42	326	7.14	734	6.74	1,030	39.01
		หญิง	20,772	62.72	5,177	87.18	7,253	85.05	1,386	29.49	2,167	19.71	4,789	161.86
202	Acquired deformities of limbs (M20-M21) ความพิการของแขนขา	รวม	1,102	1.70	187	1.60	181	1.09	92	0.99	194	0.89	448	8.00
		ชาย	477	1.50	68	1.19	73	0.91	50	1.10	105	0.96	181	6.86
		หญิง	625	1.89	119	2.00	108	1.27	42	0.89	89	0.81	267	9.02
203	Other disorders of joints (M00-M03, M22-M25) ความผิดปกติอื่น ๆ ของข้อ	รวม	16,541	25.44	3,340	28.62	3,530	21.28	1,680	18.13	5,880	26.86	2,111	37.70
		ชาย	10,123	31.74	1,883	32.86	2,246	27.86	1,074	23.53	3,481	31.94	1,439	54.51
		หญิง	6,418	19.38	1,457	24.53	1,284	15.06	606	12.89	2,399	21.82	672	22.71

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
204	Systemic connective tissue disorders (M30-M36) ความผิดปกติของระบบเนื้อเยื่อประสาน	รวม	9,173	14.11	1,869	16.02	1,742	10.50	1,088	11.74	3,066	14.01	1,408	25.15
		ชาย	2,096	6.57	428	7.47	414	5.14	217	4.75	653	5.99	384	14.54
		หญิง	7,077	21.37	1,441	24.27	1,328	15.57	871	18.53	2,413	21.95	1,024	34.61
205	Cervical and other intervertebral disc disorders (M50-M51) กระดูกสันหลังและหมอนรองกระดูกสัน	รวม	6,476	9.96	1,504	12.89	1,279	7.71	691	7.46	2,136	9.76	866	15.47
		ชาย	3,341	10.48	723	12.62	659	8.17	370	8.11	1,144	10.50	445	16.86
		หญิง	3,135	9.47	781	13.15	620	7.27	321	6.83	992	9.02	421	14.23
206	Other dorsopathies (M40-M49, M53-M54) พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ	รวม	29,902	45.99	9,217	78.99	5,860	35.32	2,770	29.90	8,365	38.21	3,690	65.91
		ชาย	11,714	36.73	3,404	59.41	2,237	27.75	1,186	25.98	3,430	31.47	1,457	55.19
		หญิง	18,188	54.92	5,813	97.89	3,623	42.48	1,584	33.70	4,935	44.89	2,233	75.47
207	Soft tissue disorders (M60-M79) เนื้อเยื่อผิดปกติ	รวม	46,710	71.85	9,574	82.05	8,093	48.78	5,825	62.87	20,540	93.83	2,678	47.83
		ชาย	24,719	77.50	4,927	85.99	4,360	54.08	2,956	64.76	11,184	102.62	1,292	48.94
		หญิง	21,991	66.40	4,647	78.25	3,733	43.77	2,869	61.04	9,356	85.11	1,386	46.84
208	Disorders of bone density and structure (M80-M85) ความผิดปกติของความหนาแน่นของเนื้อ	รวม	5,523	8.50	1,050	9.00	1,164	7.02	727	7.85	1,718	7.85	864	15.43
		ชาย	2,748	8.62	466	8.13	616	7.64	382	8.37	864	7.93	420	15.91
		หญิง	2,775	8.38	584	9.83	548	6.43	345	7.34	854	7.77	444	15.01
209	Osteomyelitis (M86) กระดูกอักเสบ	รวม	7,952	12.23	1,658	14.21	1,661	10.01	808	8.72	3,277	14.97	548	9.79
		ชาย	4,903	15.37	1,010	17.63	1,039	12.89	518	11.35	1,974	18.11	362	13.71
		หญิง	3,049	9.21	648	10.91	622	7.29	290	6.17	1,303	11.85	186	6.29

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
210	Other diseases of the musculoskeletal system and connective tissue (M87-M99) โรคอื่น ๆ ของระบบกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อประสาน	รวม	7,809	12.01	1,497	12.83	2,049	12.35	1,039	11.21	2,135	9.75	1,089	19.45
		ชาย	4,123	12.93	773	13.49	1,040	12.90	539	11.81	1,242	11.40	529	20.04
		หญิง	3,686	11.13	724	12.19	1,009	11.83	500	10.64	893	8.12	560	18.93
211	Acute and rapidly progressive nephritic syndromes (N00-N01) กลุ่มอาการไตอักเสบเฉียบพลันและชนิดกำเริบเร็ว	รวม	3,736	5.75	593	5.08	510	3.07	808	8.72	1,611	7.36	214	3.82
		ชาย	2,305	7.23	364	6.35	320	3.97	493	10.80	1,019	9.35	109	4.13
		หญิง	1,431	4.32	229	3.86	190	2.23	315	6.70	592	5.39	105	3.55
212	Other glomerular diseases (N02-N08) โรคของหน่วยไตอื่น ๆ	รวม	6,218	9.56	1,099	9.42	1,255	7.56	1,141	12.32	2,110	9.64	613	10.95
		ชาย	3,443	10.79	614	10.72	718	8.91	653	14.31	1,146	10.52	312	11.82
		หญิง	2,775	8.38	485	8.17	537	6.30	488	10.38	964	8.77	301	10.17
213	Renal tubulo-interstitial diseases (N10-N16) โรคของท่อและเนื้อเยื่อระหว่างท่อในไต	รวม	73,122	112.47	17,272	148.02	15,288	92.15	10,181	109.89	27,414	125.23	2,967	52.99
		ชาย	24,870	77.98	6,326	110.41	4,379	54.32	2,879	63.07	10,249	94.04	1,037	39.28
		หญิง	48,252	145.69	10,946	184.32	10,909	127.92	7,302	155.36	17,165	156.14	1,930	65.23
214	Renal failure (N17-N19) ไตวาย	รวม	144,551	222.34	30,878	264.63	25,677	154.77	11,751	126.84	70,314	321.19	5,931	105.93
		ชาย	63,369	198.68	14,564	254.18	11,711	145.26	5,509	120.69	28,781	264.09	2,804	106.21
		หญิง	81,182	245.12	16,314	274.71	13,966	163.76	6,242	132.80	41,533	377.80	3,127	105.69
215	Urolithiasis (N20-N23) นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ	รวม	37,863	58.24	9,314	79.82	4,427	26.68	5,096	55.01	17,307	79.06	1,719	30.70
		ชาย	23,361	73.24	6,102	106.50	2,466	30.59	2,985	65.40	10,849	99.55	959	36.32
		หญิง	14,502	43.79	3,212	54.09	1,961	22.99	2,111	44.91	6,458	58.74	760	25.69

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		ล่าง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
216	Cystitis (N30) กระเพาะปัสสาวะอักเสบ	รวม	11,855	18.23	2,764	23.69	2,770	16.70	1,796	19.39	4,120	18.82	405	7.23
		ชาย	3,369	10.56	815	14.22	760	9.43	435	9.53	1,246	11.43	113	4.28
		หญิง	8,486	25.62	1,949	32.82	2,010	23.57	1,361	28.96	2,874	26.14	292	9.87
217	Other diseases of the urinary system (N25-N29, N31-N39) โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะ	รวม	100,531	154.63	22,806	195.45	26,052	157.03	12,189	131.57	32,421	148.10	7,063	126.15
		ชาย	38,949	122.12	9,192	160.43	9,442	117.12	4,482	98.19	13,091	120.12	2,742	103.86
		หญิง	61,582	185.94	13,614	229.25	16,610	194.76	7,707	163.97	19,330	175.83	4,321	146.04
218	Hyperplasia of prostate (N40) ต่อมลูกหมากโตจากการเพิ่มจำนวนเซลล์	รวม	10,338	32.41	2,086	36.41	2,181	27.05	1,653	36.21	2,778	25.49	1,640	62.12
		ชาย	10,338	32.41	2,086	36.41	2,181	27.05	1,653	36.21	2,778	25.49	1,640	62.12
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
219	Other disorders of prostate (N41-N42) ความผิดปกติอื่น ๆ ของต่อมลูกหมาก	รวม	391	1.23	77	1.34	51	0.63	25	0.55	128	1.17	110	4.17
		ชาย	391	1.23	77	1.34	51	0.63	25	0.55	128	1.17	110	4.17
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
220	Hydrocele and spermatocele (N43) ถุงน้ำและถุงที่มีอสุจิที่อัณฑะ	รวม	2,648	8.30	507	8.85	478	5.93	469	10.28	996	9.14	198	7.50
		ชาย	2,648	8.30	507	8.85	478	5.93	469	10.28	996	9.14	198	7.50
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
221	Redundant prepuce, phimosis and paraphimosis (N47)หนังหุ้ม ปลายองคชาตยาวเกินไป ปลายตีบรูเปิด หนังหุ้ม	รวม	3,429	10.75	800	13.96	745	9.24	458	10.03	1,227	11.26	199	7.54
		ชาย	3,429	10.75	800	13.96	745	9.24	458	10.03	1,227	11.26	199	7.54
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
222	Other disease of male genital organs (N44-N46, N48-N51) โรคอื่น ๆ ของอวัยวะสืบพันธุ์ชาย	รวม	8,898	27.90	1,580	27.58	1,872	23.22	1,184	25.94	3,834	35.18	428	16.21
		ชาย	8,898	27.90	1,580	27.58	1,872	23.22	1,184	25.94	3,834	35.18	428	16.21
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
223	Disorders of breast (N60-N64) ความผิดปกติของเต้านม	รวม	7,929	12.20	1,700	14.57	1,415	8.53	1,691	18.25	2,574	11.76	549	9.81
		ชาย	466	1.46	89	1.55	97	1.20	94	2.06	141	1.29	45	1.70
		หญิง	7,463	22.53	1,611	27.13	1,318	15.45	1,597	33.98	2,433	22.13	504	17.03
224	Salpingitis and oophoritis (N70) ปีกมดลูกและรังไข่อักเสบ	รวม	1,925	5.81	299	5.03	477	5.59	232	4.94	708	6.44	209	7.06
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	1,925	5.81	299	5.03	477	5.59	232	4.94	708	6.44	209	7.06
225	Inflammatory disease of cervix uteri (N72) ปากมดลูกอักเสบ	รวม	203	0.61	46	0.77	43	0.50	33	0.70	65	0.59	16	0.54
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	203	0.61	46	0.77	43	0.50	33	0.70	65	0.59	16	0.54
226	Other inflammatory diseases of female pelvic organs (N71, N73-N77) การอักเสบอื่น ๆ ของอวัยวะในอุ้งเชิงกรานสตรี	รวม	12,231	36.93	2,168	36.51	3,049	35.75	1,992	42.38	4,418	40.19	604	20.41
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	12,231	36.93	2,168	36.51	3,049	35.75	1,992	42.38	4,418	40.19	604	20.41

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
227	Endometriosis (N80) เยื่อบุมดลูกอยู่ผิดที่	รวม	7,757	23.42	1,230	20.71	1,253	14.69	1,118	23.79	2,898	26.36	1,258	42.52
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	7,757	23.42	1,230	20.71	1,253	14.69	1,118	23.79	2,898	26.36	1,258	42.52
228	Female genital prolapse (N81) การหย่อนตัวของอวัยวะสืบพันธุ์สตรี	รวม	3,469	10.47	715	12.04	635	7.45	292	6.21	1,287	11.71	540	18.25
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	3,469	10.47	715	12.04	635	7.45	292	6.21	1,287	11.71	540	18.25
229	Noninflammatory disorder of ovary, fallopian tube and broad ligament (N83) ความผิดปกติอื่นที่ไม่ใช่การอักเสบของ รังไข่ ท่อรังไข่และเอ็นยึดมดลูก	รวม	5,402	16.31	880	14.82	1,269	14.88	859	18.28	1,845	16.78	549	18.56
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	5,402	16.31	880	14.82	1,269	14.88	859	18.28	1,845	16.78	549	18.56
230	Disorder of menstruation (N91-N92) ความผิดปกติของระดู	รวม	6,276	18.95	1,056	17.78	1,338	15.69	1,279	27.21	2,414	21.96	189	6.39
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	6,276	18.95	1,056	17.78	1,338	15.69	1,279	27.21	2,414	21.96	189	6.39
231	Menopausal and other perimenopausal disorders (N95) การหมดประจำเดือนและความผิดปกติ	รวม	3,615	10.92	736	12.39	771	9.04	674	14.34	1,226	11.15	208	7.03
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	3,615	10.92	736	12.39	771	9.04	674	14.34	1,226	11.15	208	7.03

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
232	Female infertility (N97) ภาวะมีบุตรยากในสตรี	รวม	24	0.07	7	0.12	4	0.05	7	0.15	4	0.04	2	0.07
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	24	0.07	7	0.12	4	0.05	7	0.15	4	0.04	2	0.07
233	Other disorders of genitourinary tract (N82, N84-N90, N93-N94, N96, N98-N99) ความผิดปกติอื่น ๆ ของท่อ ทางเดินปัสสาวะและสืบพันธุ์	รวม	16,215	48.96	3,362	56.61	3,155	36.99	3,006	63.96	5,552	50.50	1,140	38.53
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	16,215	48.96	3,362	56.61	3,155	36.99	3,006	63.96	5,552	50.50	1,140	38.53
234	Spontaneous abortion (O03) แท้งเอง	รวม	12,619	38.10	1,634	27.52	2,962	34.73	2,958	62.93	4,113	37.41	952	32.18
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	12,619	38.10	1,634	27.52	2,962	34.73	2,958	62.93	4,113	37.41	952	32.18
235	Medical abortion (O04) การทำแท้งโดยเหตุผลทางการแพทย์	รวม	1,065	3.22	192	3.23	150	1.76	138	2.94	504	4.58	81	2.74
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	1,065	3.22	192	3.23	150	1.76	138	2.94	504	4.58	81	2.74
236	Other pregnancies with abortive outcome (O00-O02, O05-O08) การตั้งครรภ์อื่น ๆ ที่สิ้นสุดโดยการแท้ง	รวม	24,931	75.28	4,196	70.66	5,623	65.93	6,520	138.72	7,057	64.19	1,535	51.88
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	24,931	75.28	4,196	70.66	5,623	65.93	6,520	138.72	7,057	64.19	1,535	51.88

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
237	Oedema, proteinuria and hypertensive disorders in pregnancy, childbirth and the puerperium (O10-O16)การบวม การมีโปรตีนในปัสสาวะ และความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด	รวม	16,313	49.26	2,255	37.97	3,836	44.98	4,587	97.59	4,838	44.01	797	26.94
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	16,313	49.26	2,255	37.97	3,836	44.98	4,587	97.59	4,838	44.01	797	26.94
238	Placenta praevia, premature separation of placenta and antepartum haemorrhage (O44-O46) รกเกาะต่ำ รกลอกตัวก่อนกำหนด และตกเลือดก่อนคลอด	รวม	4,348	13.13	704	11.85	880	10.32	1,112	23.66	1,420	12.92	232	7.84
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	4,348	13.13	704	11.85	880	10.32	1,112	23.66	1,420	12.92	232	7.84
239	Other maternal care related to fetus and amniotic cavity and possible delivery problems (O30-O43, O47-O48) การดูแลมารดาอื่น ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการรกในครรภ์ และถุงน้ำคร่ำ และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในระยะคลอด	รวม	122,870	371.00	19,758	332.71	27,264	319.69	29,230	621.89	39,522	359.51	7,096	239.83
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	122,870	371.00	19,758	332.71	27,264	319.69	29,230	621.89	39,522	359.51	7,096	239.83

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
240	Obstructed labour (O64-O66) การคลอดติดขัด	รวม	21,723	65.59	3,455	58.18	4,196	49.20	3,874	82.42	8,971	81.60	1,227	41.47
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	21,723	65.59	3,455	58.18	4,196	49.20	3,874	82.42	8,971	81.60	1,227	41.47
241	Postpartum haemorrhage (O72) ตกเลือดหลังคลอด	รวม	7,863	23.74	1,343	22.61	1,673	19.62	2,029	43.17	2,586	23.52	232	7.84
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	7,863	23.74	1,343	22.61	1,673	19.62	2,029	43.17	2,586	23.52	232	7.84
242	Other complications of pregnancy and delivery (O20-O29, O60-O63, O67-O71, O73-O75, O81-O84) ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆของการตั้งครรภ์ และ การคลอด	รวม	117,244	354.01	17,371	292.51	24,267	284.55	33,765	718.38	36,465	331.70	5,376	181.70
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	117,244	354.01	17,371	292.51	24,267	284.55	33,765	718.38	36,465	331.70	5,376	181.70
243	Single spontaneous delivery (O80) การคลอดของครรภ์เดียว	รวม	164,961	498.09	27,136	456.95	37,390	438.43	36,433	775.14	57,555	523.55	6,447	217.90
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	164,961	498.09	27,136	456.95	37,390	438.43	36,433	775.14	57,555	523.55	6,447	217.90

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
244	Complications predominantly related to the puerperium and other obstetric conditions, not Elsewhere classified (O85-O99) ภาวะแทรกซ้อนที่ส่วนใหญ่พบในระยะหลังคลอด และภาวะทางสูติกรรมอื่น ๆ ที่มีได้ระบุรายละเอียด	รวม	27,329	82.52	3,937	66.30	5,331	62.51	7,174	152.63	9,147	83.21	1,740	58.81
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	27,329	82.52	3,937	66.30	5,331	62.51	7,174	152.63	9,147	83.21	1,740	58.81
245	Fetus and newborn affected by maternal factors and by complications of pregnancy, labor and delivery (P00-P04) ทารกในครรภ์และแรกเกิดที่ได้รับผลจากปัจจัยทางมารดา และโรคแทรกในระยะตั้งครรภ์ เจ็บครรภ์ และคลอด	รวม	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
246	Slow fetal growth, fetal malnutrition and disorders related to short gestation and low birth weight (P05-P07) ทารกในครรภ์โตช้า ทารกในครรภ์ขาดสารอาหาร และความผิดปกติเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ระยะสั้น และน้ำหนักทารกแรกเกิดน้อย	รวม	61,883	95.18	8,827	75.65	15,819	95.35	11,236	121.28	18,394	84.02	7,607	135.87
		ชาย	30,505	95.64	4,382	76.48	7,880	97.74	5,560	121.81	8,786	80.62	3,897	147.61
		หญิง	31,378	94.74	4,445	74.85	7,939	93.09	5,676	120.76	9,608	87.40	3,710	125.39
247	Birth trauma (P10-P15) บาดเจ็บจากการคลอด	รวม	3,430	5.28	583	5.00	720	4.34	358	3.86	1,104	5.04	665	11.88
		ชาย	1,958	6.14	329	5.74	400	4.96	221	4.84	634	5.82	374	14.17
		หญิง	1,472	4.44	254	4.28	320	3.75	137	2.91	470	4.28	291	9.84
248	Intrauterine hypoxia and birth asphyxia (P20-P21) ขาดออกซิเจนขณะอยู่ในโพรงมดลูก และภาวะแอสฟิกเซียเมื่อแรกเกิด	รวม	6,096	9.38	670	5.74	1,176	7.09	668	7.21	2,669	12.19	913	16.31
		ชาย	3,303	10.36	380	6.63	658	8.16	363	7.95	1,409	12.93	493	18.67
		หญิง	2,793	8.43	290	4.88	518	6.07	305	6.49	1,260	11.46	420	14.20
249	Other respiratory disorders originating in the perinatal period (P22-P28) ภาวะหายใจผิดปกติอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด	รวม	29,968	46.10	3,165	27.12	7,993	48.18	5,478	59.13	10,103	46.15	3,229	57.67
		ชาย	18,321	57.44	1,902	33.20	4,916	60.98	3,319	72.71	6,264	57.48	1,920	72.72
		หญิง	11,647	35.17	1,263	21.27	3,077	36.08	2,159	45.93	3,839	34.92	1,309	44.24

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
250	Congenital infectious and parasitic diseases (P35-P37) การติดเชื้อแต่กำเนิดและโรคปรสิต	รวม	19,121	29.41	2,290	19.63	5,064	30.52	2,910	31.41	7,394	33.78	1,463	26.13
		ชาย	10,320	32.36	1,246	21.75	2,687	33.33	1,565	34.29	3,997	36.68	825	31.25
		หญิง	8,801	26.57	1,044	17.58	2,377	27.87	1,345	28.62	3,397	30.90	638	21.56
251	Other infections specific to the perinatal period (P38-P39) การติดเชื้อเฉพาะอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด	รวม	2,326	3.58	332	2.85	654	3.94	427	4.61	800	3.65	113	2.02
		ชาย	1,280	4.01	188	3.28	366	4.54	224	4.91	427	3.92	75	2.84
		หญิง	1,046	3.16	144	2.42	288	3.38	203	4.32	373	3.39	38	1.28
252	Haemolytic disease of fetus and newborn (P55) โรคเม็ดเลือดแดงของทารกในครรภ์และแรก	รวม	4,844	7.45	581	4.98	1,600	9.64	671	7.24	1,556	7.11	436	7.79
		ชาย	2,419	7.58	308	5.38	833	10.33	315	6.90	751	6.89	212	8.03
		หญิง	2,425	7.32	273	4.60	767	8.99	356	7.57	805	7.32	224	7.57
253	Other conditions originating in the perinatal period (P08, P29, P50-P54, P56-P96)	รวม	124,566	191.60	22,067	189.12	32,070	193.31	16,981	183.29	43,122	196.98	10,326	184.43
		ชาย	67,579	211.88	11,975	209.00	17,552	217.71	9,034	197.92	23,365	214.39	5,653	214.12
		หญิง	56,987	172.07	10,092	169.94	14,518	170.23	7,947	169.08	19,757	179.72	4,673	157.94
254	Spina bifida (Q05) กระดูกสันหลังแยก	รวม	266	0.41	29	0.25	39	0.24	31	0.33	56	0.26	111	1.98
		ชาย	119	0.37	14	0.24	16	0.20	13	0.28	24	0.22	52	1.97
		หญิง	147	0.44	15	0.25	23	0.27	18	0.38	32	0.29	59	1.99
255	Other congenital malformations of the nervous system (Q00-Q04, Q06-Q07) ความผิดปกติอื่น ๆ แต่กำเนิดของระบบประสาท	รวม	1,034	1.59	150	1.29	158	0.95	139	1.50	286	1.31	301	5.38
		ชาย	522	1.64	84	1.47	91	1.13	65	1.42	162	1.49	120	4.55
		หญิง	512	1.55	66	1.11	67	0.79	74	1.57	124	1.13	181	6.12

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
256	Congenital malformation of the circulatory system (Q20-Q28)ความผิดปกติแต่กำเนิดของระบบไหลเวียนโลหิต	รวม	9,351	14.38	1,253	10.74	1,423	8.58	1,091	11.78	2,027	9.26	3,557	63.53
		ชาย	4,488	14.07	618	10.79	625	7.75	515	11.28	958	8.79	1,772	67.12
		หญิง	4,863	14.68	635	10.69	798	9.36	576	12.25	1,069	9.72	1,785	60.33
257	Cleft lip and cleft palate (Q35-Q37) ปากแหว่งและเพดานโหว่	รวม	3,127	4.81	515	4.41	603	3.63	579	6.25	975	4.45	455	8.13
		ชาย	1,679	5.26	324	5.65	338	4.19	256	5.61	520	4.77	241	9.13
		หญิง	1,448	4.37	191	3.22	265	3.11	323	6.87	455	4.14	214	7.23
258	Absence, atresia and stenosis of small intestine (Q41) ลำไส้เล็กไม่มี ตันและตีบ	รวม	146	0.22	33	0.28	28	0.17	32	0.35	29	0.13	24	0.43
		ชาย	78	0.24	21	0.37	16	0.20	18	0.39	13	0.12	10	0.38
		หญิง	68	0.21	12	0.20	12	0.14	14	0.30	16	0.15	14	0.47
259	Other congenital malformations of the digestive system (Q38-Q40, Q42-Q45) ความผิดปกติแต่กำเนิดอื่น ๆ ของระบบย่อยอาหาร	รวม	15,708	24.16	2,296	19.68	4,725	28.48	1,772	19.13	4,202	19.19	2,713	48.46
		ชาย	9,441	29.60	1,391	24.28	2,883	35.76	1,106	24.23	2,532	23.23	1,529	57.91
		หญิง	6,267	18.92	905	15.24	1,842	21.60	666	14.17	1,670	15.19	1,184	40.02
260	Undescended testicle (Q53) อัณฑะไม่ลงถุง	รวม	1,408	4.41	241	4.21	318	3.94	195	4.27	421	3.86	233	8.83
		ชาย	1,408	4.41	241	4.21	318	3.94	195	4.27	421	3.86	233	8.83
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
261	Other malformations of the genitourinary system (Q50-Q52, Q54-Q64)ความผิดปกติอื่น ๆ ของระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ	รวม	1,875	2.88	343	2.94	232	1.40	300	3.24	435	1.99	565	10.09
		ชาย	1,316	4.13	220	3.84	146	1.81	223	4.89	312	2.86	415	15.72
		หญิง	559	1.69	123	2.07	86	1.01	77	1.64	123	1.12	150	5.07

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
262	Congenital deformities of hip (Q65) ความพิการแต่กำเนิดของสะโพก	รวม	214	0.33	17	0.15	21	0.13	25	0.27	51	0.23	100	1.79
		ชาย	66	0.21	4	0.07	12	0.15	3	0.07	15	0.14	32	1.21
		หญิง	148	0.45	13	0.22	9	0.11	22	0.47	36	0.33	68	2.30
263	Congenital deformities of feet (Q66) ความพิการแต่กำเนิดของเท้า	รวม	1,440	2.21	179	1.53	332	2.00	267	2.88	447	2.04	215	3.84
		ชาย	728	2.28	96	1.68	150	1.86	134	2.94	227	2.08	121	4.58
		หญิง	712	2.15	83	1.40	182	2.13	133	2.83	220	2.00	94	3.18
264	Other congenital malformations and deformations of the musculoskeletal system (Q67-Q79) ความผิดปกติและความพิการแต่กำเนิดอื่น ๆ ของระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง	รวม	2,930	4.51	455	3.90	472	2.85	336	3.63	828	3.78	839	14.99
		ชาย	1,537	4.82	233	4.07	248	3.08	174	3.81	440	4.04	442	16.74
		หญิง	1,393	4.21	222	3.74	224	2.63	162	3.45	388	3.53	397	13.42
265	Other congenital malformations (Q10-Q18, Q30-Q34, Q80-Q89) ความผิดปกติแต่กำเนิดอื่น ๆ	รวม	4,941	7.60	724	6.20	768	4.63	777	8.39	1,200	5.48	1,472	26.29
		ชาย	2,555	8.01	358	6.25	401	4.97	388	8.50	640	5.87	768	29.09
		หญิง	2,386	7.20	366	6.16	367	4.30	389	8.28	560	5.09	704	23.79
266	Chromosomal abnormalities, not Elsewhere classified (Q90-Q99)ความ ผิดปกติของโครโมโซมที่ไม่ได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น	รวม	483	0.74	101	0.87	110	0.66	64	0.69	110	0.50	98	1.75
		ชาย	215	0.67	46	0.80	50	0.62	30	0.66	50	0.46	39	1.48
		หญิง	268	0.81	55	0.93	60	0.70	34	0.72	60	0.55	59	1.99

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
267	Abdominal and pelvic pain (R10) ปวดท้องและปวดอุ้งเชิงกราน	รวม	23,661	36.39	6,438	55.18	4,593	27.68	4,743	51.19	7,161	32.71	726	12.97
		ชาย	9,449	29.63	2,670	46.60	1,777	22.04	1,836	40.22	2,895	26.56	271	10.26
		หญิง	14,212	42.91	3,768	63.45	2,816	33.02	2,907	61.85	4,266	38.81	455	15.38
268	Fever of unknown origin (R50) ไข้ไม่ทราบสาเหตุ	รวม	59,407	91.38	12,234	104.85	8,548	51.52	9,663	104.30	27,155	124.04	1,807	32.27
		ชาย	30,527	95.71	6,484	113.16	4,328	53.68	4,936	108.14	13,856	127.14	923	34.96
		หญิง	28,880	87.20	5,750	96.83	4,220	49.48	4,727	100.57	13,299	120.97	884	29.88
269	Senility (R54) ชราภาพ	รวม	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
270	Other symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not Elsewhere classified (R00-R09, R11-R49, R51-R53, R55-R99) อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบจาก การตรวจทางคลินิกและตรวจทาง ห้องปฏิบัติการที่มีได้มีรหัสระบุไว้	รวม	209,144	321.69	39,763	340.78	46,033	277.47	40,639	438.65	73,513	335.81	9,196	164.25
		ชาย	100,197	314.15	19,758	344.83	22,379	277.58	18,230	399.39	35,219	323.17	4,611	174.65
		หญิง	108,947	328.96	20,005	336.87	23,654	277.36	22,409	476.77	38,294	348.34	4,585	154.96
271	Fracture of skull and facial bones (S02)กระดูกแตกหักกับบริเวณกระโหลกศีรษะ และกระดูกหน้า	รวม	13,588	20.90	2,134	18.29	4,240	25.56	1,863	20.11	3,976	18.16	1,375	24.56
		ชาย	10,658	33.42	1,688	29.46	3,274	40.61	1,345	29.47	3,249	29.81	1,102	41.74
		หญิง	2,930	8.85	446	7.51	966	11.33	518	11.02	727	6.61	273	9.23

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
272	Fracture of neck, thorax and pelvis (S12, S22, S32, T08)กระดูกคอ กระดูกซี่โครง หรือกระดูกเชิงกรานหัก	รวม	15,726	24.19	3,906	33.48	4,200	25.32	2,169	23.41	4,282	19.56	1,169	20.88
		ชาย	9,808	30.75	2,466	43.04	2,511	31.15	1,354	29.66	2,795	25.65	682	25.83
		หญิง	5,918	17.87	1,440	24.25	1,689	19.80	815	17.34	1,487	13.53	487	16.46
273	Fracture of femur (S72) กระดูกต้นขาแตก หัก ร้าว	รวม	34,992	53.82	8,829	75.67	10,163	61.26	4,371	47.18	7,878	35.99	3,751	67.00
		ชาย	14,870	46.62	3,377	58.94	4,519	56.05	2,009	44.01	3,471	31.85	1,494	56.59
		หญิง	20,122	60.76	5,452	91.81	5,644	66.18	2,362	50.25	4,407	40.09	2,257	76.28
274	Fracture of other limb bones (S42, S52, S62, S82, S92, T10, T12) กระดูกแตกหักของแขนขาอื่น ๆ	รวม	98,778	151.93	20,666	177.11	25,684	154.81	13,046	140.82	31,892	145.68	7,490	133.78
		ชาย	65,177	204.35	13,115	228.89	17,037	211.32	8,473	185.63	21,469	197.00	5,083	192.53
		หญิง	33,601	101.46	7,551	127.15	8,647	101.39	4,573	97.29	10,423	94.81	2,407	81.35
275	Fracture involving multiple body regions (T02) กระดูกแตกหักหลายบริเวณในร่างกาย	รวม	19	0.03	0	0.00	5	0.03	6	0.06	8	0.04	0	0.00
		ชาย	14	0.04	0	0.00	3	0.04	4	0.09	7	0.06	0	0.00
		หญิง	5	0.02	0	0.00	2	0.02	2	0.04	1	0.01	0	0.00
276	Dislocations, sprains and strains of specified and multiple body regions (S03, S13, S23, S33, S43, S53, S63, S73, S83, S93, T03) กระดูกเคลื่อน เคล็ด ชัด บริเวณร่างกายหลายแห่งที่ระบุเฉพาะ	รวม	11,058	17.01	2,163	18.54	2,845	17.15	1,650	17.81	3,523	16.09	877	15.66
		ชาย	7,275	22.81	1,363	23.79	1,879	23.31	1,025	22.46	2,397	21.99	611	23.14
		หญิง	3,783	11.42	800	13.47	966	11.33	625	13.30	1,126	10.24	266	8.99

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
277	Injury of eye and orbi (S05) การบาดเจ็บของตาและเบ้าตา	รวม	7,143	10.99	1,578	13.52	1,601	9.65	1,153	12.45	2,464	11.26	347	6.20
		ชาย	5,551	17.40	1,228	21.43	1,227	15.22	954	20.90	1,892	17.36	250	9.47
		หญิง	1,592	4.81	350	5.89	374	4.39	199	4.23	572	5.20	97	3.28
278	Intracranial injury (S06) การบาดเจ็บภายในกะโหลกศีรษะ	รวม	51,735	79.58	9,314	79.82	11,544	69.58	8,125	87.70	20,162	92.10	2,590	46.26
		ชาย	36,006	112.89	6,574	114.73	8,037	99.69	5,242	114.84	14,318	131.38	1,835	69.50
		หญิง	15,729	47.49	2,740	46.14	3,507	41.12	2,883	61.34	5,844	53.16	755	25.52
279	Injury of other internal organs (S26-S27, S36-S37) การบาดเจ็บของอวัยวะภายในอื่น ๆ	รวม	10,763	16.56	1,911	16.38	2,805	16.91	2,000	21.59	3,274	14.96	773	13.81
		ชาย	8,991	28.19	1,573	27.45	2,330	28.90	1,674	36.67	2,779	25.50	635	24.05
		หญิง	1,772	5.35	338	5.69	475	5.57	326	6.94	495	4.50	138	4.66
280	Crushing injuries and traumatic amputations of specified and multiple body regions (S07-S08, S17-S18, S28, S38, S47-S48, S57-S58, S67-S68, S77-S78, S87-S88, S97-S98, T04-T05) การบาดเจ็บจากการบดอัดและการบาดเจ็บที่ เกิดจากตัดขาบริเวณร่างกายหลายแห่งที่ระบุ เฉพาะ	รวม	4,992	7.68	1,068	9.15	1,240	7.47	614	6.63	1,794	8.19	276	4.93
		ชาย	4,057	12.72	869	15.17	989	12.27	482	10.56	1,478	13.56	239	9.05
		หญิง	935	2.82	199	3.35	251	2.94	132	2.81	316	2.87	37	1.25

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
281	Other injuries of specified, unspecified and multiple body regions (S00-S01, S04, S09-S11, S14-S16, S19-S21, S24-S25, S29-S31, S34-S35, S39-S41, S44-S46, S49-S51, S54-S56, S59-S61, S64-S66, S69-S71, S74-S76, S79-S81, S84-S86, S89-S91, S94-S96, S99, T00-T01, T06-T07, T09, T11, T13-T14) การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะ และหลายบริเวณในร่างกาย	รวม	97,433	149.87	19,555	167.59	23,106	139.27	16,418	177.21	33,800	154.40	4,554	81.34
		ชาย	66,886	209.71	13,403	233.92	15,104	187.35	10,984	240.64	24,224	222.28	3,171	120.11
		หญิง	30,547	92.23	6,152	103.59	8,002	93.83	5,434	115.61	9,576	87.11	1,383	46.74
282	Effects of foreign body entering through natural orifice (T15-T19) ผลของวัตถุแปลกปลอมผ่านเข้าทางทวาร ธรรมชาติของร่างกาย	รวม	5,526	8.50	892	7.64	1,314	7.92	1,225	13.22	1,780	8.13	315	5.63
		ชาย	3,224	10.11	532	9.28	802	9.95	650	14.24	1,045	9.59	195	7.39
		หญิง	2,302	6.95	360	6.06	512	6.00	575	12.23	735	6.69	120	4.06
283	Burns and corrosions (T20-T32) แผลถูกความร้อนและถูกสารกัดกร่อน	รวม	9,548	14.69	1,751	15.01	2,208	13.31	1,529	16.50	3,542	16.18	518	9.25
		ชาย	6,057	18.99	1,096	19.13	1,391	17.25	988	21.65	2,269	20.82	313	11.86
		หญิง	3,491	10.54	655	11.03	817	9.58	541	11.51	1,273	11.58	205	6.93

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
284	Poisoning by drugs and biological substances (T36-T50) การเป็นพิษจากยา เครื่องยาและชีววัตถุ	รวม	18,325	28.19	3,626	31.08	5,305	31.98	2,711	29.26	5,519	25.21	1,164	20.79
		ชาย	6,910	21.67	1,349	23.54	1,866	23.15	1,043	22.85	2,179	19.99	473	17.92
		หญิง	11,415	34.47	2,277	38.34	3,439	40.32	1,668	35.49	3,340	30.38	691	23.35
285	Toxic effects of substances chiefly nonmedicinal as to source (T51-T65) การเป็นพิษจากสารที่โดยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ใช้เป็นยา	รวม	38,863	59.78	7,098	60.83	11,151	67.21	8,618	93.02	11,257	51.42	739	13.20
		ชาย	22,628	70.95	4,227	73.77	6,388	79.24	5,117	112.11	6,508	59.72	388	14.70
		หญิง	16,235	49.02	2,871	48.35	4,763	55.85	3,501	74.49	4,749	43.20	351	11.86
286	Maltreatment syndromes (T74) กลุ่มอาการจากการทารุณ	รวม	247	0.38	75	0.64	36	0.22	22	0.24	103	0.47	11	0.20
		ชาย	30	0.09	9	0.16	7	0.09	3	0.07	10	0.09	1	0.04
		หญิง	217	0.66	66	1.11	29	0.34	19	0.40	93	0.85	10	0.34
287	Other and unspecified effects of external causes (T33-T35, T66-T73, T75-T78) อื่น ๆ และที่มีได้ระบุผลของสาเหตุภายนอก	รวม	27,190	41.82	4,980	42.68	7,594	45.77	4,577	49.40	9,236	42.19	803	14.34
		ชาย	15,457	48.46	2,782	48.55	4,336	53.78	2,544	55.74	5,321	48.82	474	17.95
		หญิง	11,733	35.43	2,198	37.01	3,258	38.20	2,033	43.25	3,915	35.61	329	11.12

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
288	Certain early complications of trauma and complications of surgical and medical care, note Elsewhere classified (T79-T88) ภาวะแทรกซ้อนระยะแรกของการบาดเจ็บบางชนิดและภาวะแทรกซ้อนของการรักษาทางศัลยกรรมและอายุรกรรมที่มีได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น	รวม	69,900	107.52	12,809	109.78	14,286	86.11	8,226	88.79	28,617	130.72	5,962	106.49
		ชาย	40,155	125.90	7,704	134.46	7,986	99.06	4,635	101.55	16,712	153.35	3,118	118.10
		หญิง	29,745	89.81	5,105	85.96	6,300	73.87	3,591	76.40	11,905	108.29	2,844	96.12
289	Sequela of injuries, of poisoning and of other consequences of external causes (T90-T98) ผลระยะล่าของการบาดเจ็บ การเป็นพิษและผลที่ตามมาจากสาเหตุภายนอกอื่น ๆ	รวม	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
290	Persons encountering health services for examination and investigation (Z00-Z13) บุคคลขอรับบริการเพื่อการตรวจและชันสูตร	รวม	6,830	10.51	1,667	14.29	1,924	11.60	802	8.66	725	3.31	1,712	30.58
		ชาย	3,297	10.34	823	14.36	890	11.04	424	9.29	361	3.31	799	30.26
		หญิง	3,533	10.67	844	14.21	1,034	12.12	378	8.04	364	3.31	913	30.86

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
291	Asymptomatic human	รวม	49	0.08	3	0.03	16	0.10	8	0.09	18	0.08	4	0.07
	immunodeficiency virus (HIV) infection	ชาย	28	0.09	2	0.03	6	0.07	5	0.11	11	0.10	4	0.15
	status (Z21)	หญิง	21	0.06	1	0.02	10	0.12	3	0.06	7	0.06	0	0.00
292	การติดเชื้อไวรัสโดยไม่มีอาการ	รวม	49	0.08	3	0.03	16	0.10	8	0.09	18	0.08	4	0.07
	Other persons with potential health	ชาย	863	2.71	102	1.78	242	3.00	86	1.88	351	3.22	82	3.11
	hazards related to communicable	หญิง	812	2.45	103	1.73	243	2.85	88	1.87	311	2.83	67	2.26
293	diseases (Z20, Z22-Z29)	รวม	6,885	10.59	887	7.60	2,390	14.41	1,029	11.11	2,205	10.07	374	6.68
	บุคคลที่มีอาการที่น่าจะเป็นอันตรายต่อ	ชาย	45	0.14	18	0.31	4	0.05	2	0.04	14	0.13	7	0.27
	สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่อ	หญิง	6,840	20.65	869	14.63	2,386	27.98	1,027	21.85	2,191	19.93	367	12.40
294	Contraceptive management (Z30)	รวม	264	0.80	26	0.44	39	0.46	87	1.85	107	0.97	5	0.17
	การรับบริการคุมกำเนิด	ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	การตรวจคัดกรองก่อนการคลอด และการให้	หญิง	264	0.80	26	0.44	39	0.46	87	1.85	107	0.97	5	0.17
294	Antenatal screening and other	รวม	264	0.80	26	0.44	39	0.46	87	1.85	107	0.97	5	0.17
	supervision of pregnancy (Z34-Z36)	ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	การตรวจคัดกรองก่อนการคลอด และการให้	หญิง	264	0.80	26	0.44	39	0.46	87	1.85	107	0.97	5	0.17
294	คำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งครรภ์อื่น ๆ	รวม	264	0.80	26	0.44	39	0.46	87	1.85	107	0.97	5	0.17
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	264	0.80	26	0.44	39	0.46	87	1.85	107	0.97	5	0.17

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
295	Liveborn infants according to place of birth (Z38) การเกิดของทารกตามสถานที่เกิด	รวม	334,383	514.33	48,825	418.44	85,826	517.33	73,681	795.30	106,259	485.39	19,792	353.50
		ชาย	168,521	528.37	24,688	430.87	43,225	536.15	37,328	817.80	53,399	489.98	9,881	374.26
		หญิง	165,862	500.81	24,137	406.45	42,601	499.53	36,353	773.44	52,860	480.84	9,911	334.97
296	Postpartum care and examination (Z39) การดูแลและการตรวจหลังคลอด	รวม	1,463	4.42	228	3.84	222	2.60	436	9.28	530	4.82	47	1.59
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	1,463	4.42	228	3.84	222	2.60	436	9.28	530	4.82	47	1.59
297	Persons encountering health services for specific procedures and health care (Z40-Z54, Z40-Z54) บุคคลขอรับบริการสุขภาพ เพื่อหัตถการหรือการบริการสุขภาพที่ระบุเฉพาะ	รวม	28,252	43.46	6,110	52.36	5,788	34.89	3,140	33.89	10,995	50.23	2,219	39.63
		ชาย	17,205	53.94	3,622	63.21	3,539	43.90	1,825	39.98	6,978	64.03	1,241	47.01
		หญิง	11,047	33.36	2,488	41.90	2,249	26.37	1,315	27.98	4,017	36.54	978	33.05
298	Persons encountering health services for other reasons (Z31-Z33, Z37, Z55-Z99) บุคคลขอรับบริการสุขภาพด้วยเหตุผลอื่น	รวม	1,028	1.58	126	1.08	244	1.47	371	4.00	255	1.16	32	0.57
		ชาย	451	1.41	46	0.80	97	1.20	189	4.14	103	0.95	16	0.61
		หญิง	577	1.74	80	1.35	147	1.72	182	3.87	152	1.38	16	0.54

รวบรวม / วิเคราะห์ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แหล่งข้อมูล : สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สทส.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ตารางที่ 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2558- 2559

รหัส/ กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย(โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2558		2559	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
รวมทุกกลุ่มโรค		รวม	8,517,257	89,754.84	8,923,915	90,200.64
		ชาย	3,955,414	93,674.94	4,177,110	94,736.51
		หญิง	4,561,843	86,612.14	4,746,805	86,553.91
001	Cholera (A00) อหิวาตกโรค	รวม	51	0.54	49	0.50
		ชาย	20	0.38	25	0.57
		หญิง	31	0.59	24	0.44
002	Typhoid and paratyphoid fever (A01) ไข้รากสาดน้อยและไข้รากสาดเทียม	รวม	702	7.40	666	6.73
		ชาย	298	5.66	309	7.01
		หญิง	404	7.67	357	6.51
003	Shigellosis (A03) โรคบิดจากเชื้อชิเกลลา	รวม	43	0.45	59	0.60
		ชาย	16	0.30	27	0.61
		หญิง	27	0.51	32	0.58
004	Amoebiasis (A06) โรคบิดมีตัว	รวม	963	10.15	1,077	10.89
		ชาย	409	7.77	418	9.48
		หญิง	554	10.52	659	12.02
005	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin (A09)อาการท้องร่วง กระเพาะ และลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ	รวม	117,407	1,237.23	127,454	1,288.27
		ชาย	42,851	813.58	46,627	1,057.50
		หญิง	74,556	1,415.54	80,827	1,473.81
006	Other intestinal infectious diseases (A02, A04-A05, A07-A08) โรคลำไส้อักเสบอื่น ๆ	รวม	11,718	123.48	12,736	128.73
		ชาย	4,354	82.67	4,851	110.02
		หญิง	7,364	139.81	7,885	143.78
007	Respiratory tuberculosis (A15-A16) วัณโรคทางเดินหายใจ	รวม	31,257	329.39	32,359	327.08
		ชาย	20,244	384.36	20,994	476.14
		หญิง	11,013	209.10	11,365	207.23
008	Other Tuberculosis (A17-A19) วัณโรคอื่น ๆ	รวม	5,239	55.21	5,501	55.60
		ชาย	2,881	54.70	3,030	68.72
		หญิง	2,358	44.77	2,471	45.06
009	Plaque (A20) กาฬโรค	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00

ตารางที่ 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2558- 2559 (ต่อ)

รหัส/ กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย(โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2558		2559	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
010	Brucellosis (A23) โรคติดเชื้อบรูเซลลา	รวม	5	0.05	3	0.03
		ชาย	2	0.04	2	0.05
		หญิง	3	0.06	1	0.02
011	Leprosy (A30) โรคเรื้อน	รวม	326	3.44	278	2.81
		ชาย	219	4.16	170	3.86
		หญิง	107	2.03	108	1.97
012	Tetanus neonatorum (A33) บาดทะยักในเด็กแรกเกิด	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
013	Other tetanus (A34-A35) บาดทะยักอื่น ๆ	รวม	153	1.61	121	1.22
		ชาย	88	1.67	67	1.52
		หญิง	65	1.23	54	0.98
014	Diphtheria (A36) โรคคอตีบ	รวม	24	0.25	12	0.12
		ชาย	12	0.23	4	0.09
		หญิง	12	0.23	8	0.15
015	Whooping cough (A37) โรคไอกรน	รวม	1	0.01	2	0.02
		ชาย	0	0.00	1	0.02
		หญิง	1	0.02	1	0.02
016	Meningococcal infection (A39) การติดเชื้อเมนิงโกคอคคัส	รวม	43	0.45	26	0.26
		ชาย	24	0.46	9	0.20
		หญิง	19	0.36	17	0.31
017	Septicemia (A40-A41) โลหิตเป็นพิษ	รวม	79,700	839.88	83,795	846.98
		ชาย	37,219	706.65	39,552	897.04
		หญิง	42,481	806.55	44,243	806.73
018	Other bacterial diseases (A21-A22, A24-A28,A31-A32, A38, A42-A49) โรคจากแบคทีเรียอื่น ๆ	รวม	17,448	183.87	17,716	179.07
		ชาย	8,976	170.42	9,224	209.20
		หญิง	8,472	160.85	8,492	154.84
019	Congenital syphilis (A50) ซิฟิลิสแต่กำเนิด	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00

ตารางที่ 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2558- 2559 (ต่อ)

รหัส/ กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย(โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2558		2559	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
020	Early syphilis (A51) ซิฟิลิสระยะเริ่ม	รวม	42	0.44	51	0.52
		ชาย	28	0.53	29	0.66
		หญิง	14	0.27	22	0.40
021	Other syphilis (A52-A53) ซิฟิลิสอื่น ๆ	รวม	926	9.76	999	10.10
		ชาย	532	10.10	564	12.79
		หญิง	394	7.48	435	7.93
022	Gonococcal infection (A54) การติดเชื้อหนองใน	รวม	16	0.17	22	0.22
		ชาย	7	0.13	16	0.36
		หญิง	9	0.17	6	0.11
023	Sexually transmitted chlamydial diseases (A55-A56) โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จากเชื้อคลามัยเดีย	รวม	4	0.04	7	0.07
		ชาย	1	0.02	6	0.14
		หญิง	3	0.06	1	0.02
024	Other infections with a predominantly sexual mode of transmission (A57-A64) โรคติดเชื้ออื่น ๆ ที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นส่วนใหญ่	รวม	307	3.24	299	3.02
		ชาย	109	2.07	92	2.09
		หญิง	198	3.76	207	3.77
025	Relapsing fever (A68) โรคไข้กลับซ้ำ	รวม	1	0.01	3	0.03
		ชาย	1	0.02	1	0.02
		หญิง	0	0.00	2	0.04
026	Trachoma (A71) ริดสีดวงตา	รวม	5	0.05	3	0.03
		ชาย	4	0.08	1	0.02
		หญิง	1	0.02	2	0.04
027	Typhus fever (A75) ไข้รากสาดใหญ่	รวม	3,310	34.88	2,653	26.82
		ชาย	1,623	30.81	1,326	30.07
		หญิง	1,687	32.03	1,327	24.20
028	Acute poliomyelitis (A80) โรคโปลิโอเฉียบพลัน	รวม	40	0.42	43	0.43
		ชาย	24	0.46	20	0.45
		หญิง	16	0.30	23	0.42
029	Rabies (A82) โรคพิษสุนัขบ้า	รวม	1	0.01	5	0.05
		ชาย	1	0.02	4	0.09
		หญิง	0	0.00	1	0.02

ตารางที่ 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2558- 2559 (ต่อ)

รหัส/ กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย(โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2558		2559	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
030	Viral encephalitis (A83-A86) สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส	รวม	192	2.02	217	2.19
		ชาย	97	1.84	116	2.63
		หญิง	95	1.80	101	1.84
031	Yellow fever (A95) ไข้เหลือง	รวม	1	0.01	3	0.03
		ชาย	1	0.02	1	0.02
		หญิง	0	0.00	2	0.04
032	Other arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers (A90-A94, A96-A99) ไข้จาก ไวรัสที่นำโดยแมลงและไข้เลือดออกที่เกิดจากไวรัส	รวม	6,141	64.71	4,352	43.99
		ชาย	2,293	43.54	1,848	41.91
		หญิง	3,848	73.06	2,504	45.66
033	Herpesviral infection (B00) เริม	รวม	1,677	17.67	1,883	19.03
		ชาย	764	14.51	817	18.53
		หญิง	913	17.33	1,066	19.44
034	Varicella and zoster (B01-B02) อีสุกอีใสและงูสวัด	รวม	4,698	49.51	4,652	47.02
		ชาย	2,046	38.85	1,983	44.97
		หญิง	2,652	50.35	2,669	48.67
035	Measles (B05) หัด	รวม	6	0.06	14	0.14
		ชาย	1	0.02	6	0.14
		หญิง	5	0.09	8	0.15
036	Rubella (B06) หัดเยอรมัน	รวม	3	0.03	1	0.01
		ชาย	1	0.02	1	0.02
		หญิง	2	0.04	0	0.00
037	Acute hepatitis B (B16) ตับอักเสบเฉียบพลันชนิดบี	รวม	1,735	18.28	1,843	18.63
		ชาย	1,016	19.29	1,083	24.56
		หญิง	719	13.65	760	13.86
038	Other viral hepatitis (B15, B17-B19) ตับอักเสบจากไวรัสอื่น ๆ	รวม	15,638	164.79	17,890	180.83
		ชาย	8,747	166.07	10,341	234.53
		หญิง	6,891	130.83	7,549	137.65
039	Human immunodeficiency virus [HIV] disease (B20-B24) ภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากไวรัส (HIV)	รวม	4,247	44.75	4,619	46.69
		ชาย	2,367	44.94	2,587	58.67
		หญิง	1,880	35.69	2,032	37.05

ตารางที่ 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2558- 2559 (ต่อ)

รหัส/ กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย(โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2558		2559	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
040	Mumps (B26)	รวม	24	0.25	26	0.26
	คางทูม	ชาย	12	0.23	9	0.20
		หญิง	12	0.23	17	0.31
041	Other viral diseases (A81, A87-A89, B03-B04, B07-B09, B25, B27-B34)	รวม	3,238	34.12	3,170	32.04
	โรคจากไวรัสอื่น	ชาย	1,250	23.73	1,238	28.08
		หญิง	1,988	37.74	1,932	35.23
042	Mycoses (B35-B49)	รวม	7,900	83.25	8,143	82.31
	โรคติดเชื้อรา	ชาย	3,975	75.47	3,957	89.74
		หญิง	3,925	74.52	4,186	76.33
043	Malaria (B50-B54)	รวม	286	3.01	340	3.44
	มาลาเรีย	ชาย	167	3.17	186	4.22
		หญิง	119	2.26	154	2.81
044	Leishmaniasis (B55)	รวม	1	0.01	0	0.00
	โรคไลชมาเนีย	ชาย	1	0.02	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
045	Trypanosomiasis (B56-B57)	รวม	11	0.12	6	0.06
	โรคทริปาโนโซม	ชาย	5	0.09	1	0.02
		หญิง	6	0.11	5	0.09
046	Schistosomiasis (B65)	รวม	8	0.08	5	0.05
	โรคติดเชื้อซิสโตโซม	ชาย	5	0.09	4	0.09
		หญิง	3	0.06	1	0.02
047	Other fluke infections (B66)	รวม	388	4.09	432	4.37
	โรคพยาธิใบไม้อื่น ๆ	ชาย	207	3.93	233	5.28
		หญิง	181	3.44	199	3.63
048	Echinococcosis (B67)	รวม	9	0.09	9	0.09
	โรคพยาธิเอคคิโนคอกคัส	ชาย	7	0.13	6	0.14
		หญิง	2	0.04	3	0.05
049	Dracunculiasis (B72)	รวม	0	0.00	0	0.00
	โรคพยาธิดราคันคูลัส	ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00

ตารางที่ 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2558- 2559 (ต่อ)

รหัส/ กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย(โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2558		2559	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
050	Onchocerciasis (B73) โรคพยาธิออนโคเชอร์คา	รวม	1	0.01	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	1	0.02	0	0.00
051	Filariasis (B74) โรคพยาธิฟิลาเรีย	รวม	15	0.16	8	0.08
		ชาย	7	0.13	5	0.11
		หญิง	8	0.15	3	0.05
052	Hookworm diseases (B76) โรคพยาธิปากขอ	รวม	286	3.01	246	2.49
		ชาย	118	2.24	98	2.22
		หญิง	168	3.19	148	2.70
053	Other helminthiasis (B68-B71, B75, B77-B83) โรคพยาธิตัวสัตว์อื่น ๆ	รวม	3,817	40.22	3,716	37.56
		ชาย	2,438	46.29	2,416	54.79
		หญิง	1,379	26.18	1,300	23.70
054	Sequelae of tuberculosis (B90) ผลตามหลังวัณโรค	รวม	17,278	182.08	18,372	185.70
		ชาย	10,678	202.73	11,610	263.31
		หญิง	6,600	125.31	6,762	123.30
055	Sequelae of poliomyelitis (B91) ผลตามหลังโรคโปลิโอ	รวม	18	0.19	19	0.19
		ชาย	9	0.17	11	0.25
		หญิง	9	0.17	8	0.15
056	Sequelae of leprosy (B92) ผลตามหลังโรคเรื้อน	รวม	52	0.55	41	0.41
		ชาย	33	0.63	25	0.57
		หญิง	19	0.36	16	0.29
057	Other infectious and parasitic diseases (A65-A67, A69-A70, A74, A77-A79, B58-B64, B85-B89, B94, B99)โรคติดเชื้อและปรสิตอื่น ๆ	รวม	2,096	22.09	1,930	19.51
		ชาย	1,070	20.32	982	22.27
		หญิง	1,026	19.48	948	17.29
058	Malignant neoplasm of lip, oral cavity and pharynx (C00-C14) เนื้องอกร้ายของริมฝีปาก ช่องปากและคอหอย	รวม	11,177	117.78	11,468	115.92
		ชาย	7,304	138.68	7,726	175.23
		หญิง	3,873	73.53	3,742	68.23
059	Malignant neoplasm of oesophagus (C15) เนื้องอกร้ายที่หลอดอาหาร	รวม	4,869	51.31	5,192	52.48
		ชาย	4,101	77.86	4,446	100.83
		หญิง	768	14.58	746	13.60

ตารางที่ 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2558- 2559 (ต่อ)

รหัส/ กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย(โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2558		2559	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
060	Malignant neoplasm of stomach (C16) เนื้องอกร้ายที่กระเพาะอาหาร	รวม	5,841	61.55	6,058	61.23
		ชาย	3,558	67.55	3,644	82.65
		หญิง	2,283	43.35	2,414	44.02
061	Malignant neoplasm of colon (C18) เนื้องอกร้ายของลำไส้ใหญ่	รวม	30,265	318.93	33,489	338.50
		ชาย	16,485	312.99	18,094	410.37
		หญิง	13,780	261.63	15,395	280.71
062	Malignant neoplasm of recto sigmoid junction, rectum, anus and anal canal (C19-C21)	รวม	20,450	215.50	22,751	229.96
		ชาย	12,420	235.81	13,836	313.80
		หญิง	8,030	152.46	8,915	162.56
063	Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts (C22) เนื้องอกร้ายที่ตับและท่อน้ำดีในตับ	รวม	30,490	321.30	31,850	321.93
		ชาย	19,643	372.95	20,809	471.95
		หญิง	10,847	205.94	11,041	201.32
064	Malignant neoplasm of pancreas (C25) เนื้องอกร้ายที่ตับอ่อน	รวม	3,132	33.01	3,339	33.75
		ชาย	1,605	30.47	1,661	37.67
		หญิง	1,527	28.99	1,678	30.60
065	Other malignant neoplasms of digestive organs (C17, C23-C24, C26) เนื้องอกร้ายที่อวัยวะย่อยอาหารอื่น ๆ	รวม	4,048	42.66	4,458	45.06
		ชาย	2,005	38.07	2,243	50.87
		หญิง	2,043	38.79	2,215	40.39
066	Malignant neoplasm of larynx (C32) เนื้องอกร้ายที่กล่องเสียง	รวม	2,914	30.71	3,076	31.09
		ชาย	2,699	51.24	2,841	64.43
		หญิง	215	4.08	235	4.29
067	Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung (C33-C34) เนื้องอกร้ายที่หลอดคอ หลอดลม และปอด	รวม	28,048	295.57	28,934	292.46
		ชาย	18,306	347.56	18,628	422.48
		หญิง	9,742	184.96	10,306	187.92
068	Other malignant neoplasm of respiratory and intrathoracic organs (C30-C31, C37-C39) เนื้องอกร้ายที่อวัยวะหายใจและอวัยวะช่องอก	รวม	880	9.27	928	9.38
		ชาย	520	9.87	559	12.68
		หญิง	360	6.84	369	6.73
069	Malignant neoplasm of bone and articular cartilage (C40-C41) เนื้องอกร้ายที่กระดูกและกระดูกอ่อนผิวข้อ	รวม	730	7.69	715	7.23
		ชาย	398	7.56	403	9.14
		หญิง	332	6.30	312	5.69

ตารางที่ 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2558- 2559 (ต่อ)

รหัส/ กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย(โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2558		2559	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
070	Malignant melanoma of skin (C43)	รวม	516	5.44	486	4.91
	เนื้องอกร้ายที่เมลาโนมาของผิวหนัง	ชาย	259	4.92	268	6.08
		หญิง	257	4.88	218	3.98
071	Other malignant neoplasm of skin (C44)	รวม	1,894	19.96	1,948	19.69
	เนื้องอกร้ายที่ผิวหนังอื่น ๆ	ชาย	891	16.92	958	21.73
		หญิง	1,003	19.04	990	18.05
072	Malignant neoplasm of mesothelial and soft tissue (C45-C49)	รวม	1,743	18.37	1,914	19.35
	เนื้องอกร้ายที่เมโสซีเรียลและเนื้อเยื่ออ่อน	ชาย	638	12.11	709	16.08
		หญิง	1,105	20.98	1,205	21.97
073	Malignant neoplasm of breast (C50)	รวม	15,701	165.46	17,082	172.66
	เนื้องอกร้ายที่เต้านม	ชาย	274	5.20	266	6.03
		หญิง	15,427	292.90	16,816	306.63
074	Malignant neoplasm of cervix uteri (C53)	รวม	9,763	102.88	10,249	103.59
	เนื้องอกร้ายที่ปากมดลูก	ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	9,763	185.36	10,249	186.88
075	Malignant neoplasm of other and unspecified parts of uterus (C54-C55)	รวม	4,687	49.39	5,436	54.95
	เนื้องอกร้ายอื่น ๆ ที่มีได้ระบุส่วนของมดลูก	ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	4,687	88.99	5,436	99.12
076	Other malignant neoplasm of female genital organs (C51-C52, C56-C58)	รวม	7,370	77.67	7,929	80.14
	เนื้องอกร้ายของอวัยวะสืบพันธุ์หญิง	ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	7,370	139.93	7,929	144.58
077	Malignant neoplasm of prostate (C61)	รวม	8,548	90.08	9,184	92.83
	เนื้องอกร้ายที่ต่อมลูกหมาก	ชาย	8,548	162.29	9,184	208.29
		หญิง	0	0.00	0	0.00
078	Other malignant neoplasms of male genital organs (C60, C62-C63)	รวม	922	9.72	934	9.44
	เนื้องอกร้ายของอวัยวะสืบพันธุ์ชาย	ชาย	922	17.51	934	21.18
		หญิง	0	0.00	0	0.00
079	Malignant neoplasm of bladder (C67)	รวม	8,342	87.91	8,647	87.40
	เนื้องอกร้ายที่กระเพาะปัสสาวะ	ชาย	6,489	123.20	6,836	155.04
		หญิง	1,853	35.18	1,811	33.02

ตารางที่ 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2558- 2559 (ต่อ)

รหัส/ กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย(โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2558		2559	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
080	Other malignant neoplasm of urinary tract (C64-C66, C68) เนื้องอกร้ายอื่น ๆ ที่ท่อปัสสาวะ	รวม	2,026	21.35	2,169	21.92
		ชาย	1,333	25.31	1,383	31.37
		หญิง	693	13.16	786	14.33
081	Malignant neoplasm of eye and adnexa (C69) เนื้องอกร้ายของตาและส่วนประกอบ	รวม	141	1.49	124	1.25
		ชาย	73	1.39	72	1.63
		หญิง	68	1.29	52	0.95
082	Malignant neoplasm of brain (C71) เนื้องอกร้ายของสมอง	รวม	1,215	12.80	1,182	11.95
		ชาย	651	12.36	624	14.15
		หญิง	564	10.71	558	10.17
083	Malignant neoplasm of other parts of central nervous system (C70, C72) เนื้องอกร้ายที่ส่วนอื่น ๆ ของระบบประสาทส่วนกลาง	รวม	144	1.52	169	1.71
		ชาย	77	1.46	83	1.88
		หญิง	67	1.27	86	1.57
084	Malignant neoplasm of other, ill-defined, secondary, unspecified and multiple sites (C73-C80, C97) เนื้องอกอื่น ๆ และที่ไม่ทราบสาเหตุ เนื้องอกทุติยภูมิที่มีได้ระบุรายละเอียดและเกิดขึ้นหลายแห่ง	รวม	77,077	812.24	82,910	838.03
		ชาย	40,435	767.71	43,646	989.89
		หญิง	36,642	695.69	39,264	715.95
085	Hodgkin's disease (C81) โรคฮอดกินส์	รวม	336	3.54	387	3.91
		ชาย	214	4.06	235	5.33
		หญิง	122	2.32	152	2.77
086	Non-Hodgkin's lymphoma (C82-C85) เนื้องอกร้ายลิมโฟมาที่มีไขโรคฮอดกินส์	รวม	10,040	105.80	10,209	103.19
		ชาย	5,442	103.32	5,767	130.80
		หญิง	4,598	87.30	4,442	81.00
087	Leukaemia (C91-C95) ลิวคีเมีย	รวม	5,753	60.63	6,214	62.81
		ชาย	3,138	59.58	3,303	74.91
		หญิง	2,615	49.65	2,911	53.08
088	Other malignant neoplasm of lymphoid, haematopoietic and related tissue (C88-C90, C96) เนื้องอกร้ายอื่น ๆ ของลิมโฟยด์ ระบบสร้างเม็ดเลือดและเนื้อเยื่อ	รวม	3,706	39.05	3,663	37.02
		ชาย	1,883	35.75	1,822	41.32
		หญิง	1,823	34.61	1,841	33.57

ตารางที่ 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2558- 2559 (ต่อ)

รหัส/ กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย(โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2558		2559	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
089	Carcinoma in situ of cervix uteri (D06) มะเร็งจำกัดเฉพาะที่ของปากมดลูก	รวม	205	2.16	208	2.10
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	205	3.89	208	3.79
090	Benign neoplasm of skin (D22-D23) เนื้องอกไม่ร้ายของผิวหนัง	รวม	174	1.83	200	2.02
		ชาย	74	1.40	89	2.02
		หญิง	100	1.90	111	2.02
091	Benign neoplasm of breast (D24) เนื้องอกไม่ร้ายของเต้านม	รวม	98	1.03	95	0.96
		ชาย	1	0.02	1	0.02
		หญิง	97	1.84	94	1.71
092	Leiomyoma of uterus (D25) ไลโอไมโอมาที่มดลูก	รวม	1,168	12.31	1,346	13.61
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	1,168	22.18	1,346	24.54
093	Benign neoplasm of ovary (D27) เนื้องอกไม่ร้ายที่รังไข่	รวม	457	4.82	507	5.12
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	457	8.68	507	9.24
094	Benign neoplasm of urinary organs (D30) เนื้องอกไม่ร้ายที่ระบบปัสสาวะ	รวม	111	1.17	151	1.53
		ชาย	65	1.23	91	2.06
		หญิง	46	0.87	60	1.09
095	Benign neoplasm of brain and other parts of central nervous system (D33) เนื้องอกไม่ร้ายของสมองและส่วนอื่นของระบบ	รวม	664	7.00	654	6.61
		ชาย	299	5.68	291	6.60
		หญิง	365	6.93	363	6.62
096	Other in situ and benign neoplasms and neoplasms of uncertain and unknown behaviour (D00-D05, D07-D21, D26,D28-D29 D31-D32, D34-D48)เนื้องอกไม่ร้ายจำกัด เฉพาะที่อื่น ๆ และเนื้องอกบางชนิดที่ไม่ทราบพฤติกรรม	รวม	24,811	261.46	26,689	269.77
		ชาย	11,620	220.62	12,570	285.09
		หญิง	13,191	250.45	14,119	257.45
097	Iron deficiency anaemia (D50) โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก	รวม	51,532	543.04	53,260	538.34
		ชาย	20,052	380.71	21,145	479.57
		หญิง	31,480	597.69	32,115	585.59

ตารางที่ 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2558- 2559 (ต่อ)

รหัส/ กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย(โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2558		2559	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
098	Other anaemia (D51-D64)	รวม	356,107	3,752.66	367,397	3,713.55
	โลหิตจางอื่น ๆ	ชาย	148,131	2,812.45	153,890	3,490.21
		หญิง	207,976	3,948.68	213,507	3,893.12
099	Haemorrhagic conditions and other diseases	รวม	67,641	712.80	73,383	741.74
	of blood and blood forming organs (D65-D77)	ชาย	34,699	658.80	38,039	862.72
	ภาวะเลือดออกอื่น ๆ โรคเลือดและอวัยวะที่สร้างเลือด	หญิง	32,942	625.44	35,344	644.47
100	Certain disorders involving the immune	รวม	154	1.62	171	1.73
	mechanism (D80-D89)	ชาย	73	1.39	94	2.13
	ความผิดปกติที่เกี่ยวกับกลไกของภูมิคุ้มกัน	หญิง	81	1.54	77	1.40
101	Iodine deficiency related thyroid disorders	รวม	541	5.70	604	6.11
	(E00-E02)	ชาย	151	2.87	199	4.51
	การขาดไอโอดีนที่มีความสัมพันธ์กับต่อมไธรอยด์	หญิง	390	7.40	405	7.38
102	Thyrotoxicosis (E05)	รวม	14,003	147.56	14,607	147.64
	โรคพิษไธรอยด์	ชาย	3,283	62.33	3,536	80.20
		หญิง	10,720	203.53	11,071	201.87
103	Other disorders of thyroid (E03-E04, E06-E07)	รวม	17,275	182.04	19,848	200.62
	ความผิดปกติของต่อมไธรอยด์อื่น ๆ	ชาย	4,029	76.50	4,585	103.99
		หญิง	13,246	251.49	15,263	278.31
104	Diabetes mellitus (E10-E14)	รวม	525,291	5,535.52	556,702	5,627.00
	เบาหวาน	ชาย	192,611	3,656.95	206,259	4,677.94
		หญิง	332,680	6,316.33	350,443	6,390.03
105	Malnutrition (E40-E46)	รวม	12,242	129.01	11,565	116.90
	ทุพโภชนาการ	ชาย	6,660	126.45	6,318	143.29
		หญิง	5,582	105.98	5,247	95.67
106	Vitamin A deficiency (E50)	รวม	31	0.33	32	0.32
	การขาดวิตามินเอ	ชาย	8	0.15	14	0.32
		หญิง	23	0.44	18	0.33
107	Other vitamin deficiencies (E51-E56)	รวม	961	10.13	1,191	12.04
	การขาดวิตามินอื่น ๆ	ชาย	400	7.59	452	10.25
		หญิง	561	10.65	739	13.48

ตารางที่ 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2558- 2559 (ต่อ)

รหัส/ กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย(โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2558		2559	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
108	Sequelae of malnutrition and other	รวม	50	0.53	35	0.35
	nutritional deficiencies (E64)	ชาย	19	0.36	15	0.34
	ผลที่ตามมาของภาวะทุพโภชนาการและภาวะพร่อง	หญิง	31	0.59	20	0.36
109	Obesity (E66)	รวม	1,895	19.97	2,043	20.65
	โรคอ้วน	ชาย	459	8.71	504	11.43
		หญิง	1,436	27.26	1,539	28.06
110	Volume depletion (E86)	รวม	18,292	192.76	13,365	135.09
	การขาดปริมาณของเหลวในร่างกาย	ชาย	7,517	142.72	5,487	124.44
		หญิง	10,775	204.58	7,878	143.65
111	Other Endocrine, nutritional and metabolic disorders	รวม	1,177,716	12,410.77	1,236,771	12,500.96
	(E15-E35, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E90)ความผิดปกติ	ชาย	497,198	9,439.91	526,093	11,931.75
	ของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิกอื่น ๆ	หญิง	680,518	12,920.46	710,678	12,958.60
112	Dementia (F00-F03)	รวม	9,972	105.08	11,036	111.55
	สมองเสื่อม	ชาย	4,265	80.98	4,684	106.23
		หญิง	5,707	108.35	6,352	115.82
113	Mental and behavioral disorders due to use	รวม	13,974	147.26	14,840	150.00
	of alcohol (F10) ความผิดปกติของพฤติกรรมและ	ชาย	11,350	215.49	12,047	273.22
	จิตประสาทที่เกิดจากการเสพแอลกอฮอล์	หญิง	2,624	49.82	2,793	50.93
114	Mental and behavioral disorders due to	รวม	1,361	14.34	1,432	14.47
	other psychoactive substance use	ชาย	1,115	21.17	1,162	26.35
	(F11-F19)ความผิดปกติทางพฤติกรรมและจิต	หญิง	246	4.67	270	4.92
115	Schizophrenia, schizotypal and delusional	รวม	10,289	108.43	10,867	109.84
	disorders (F20-F29)จิตเภท พฤติกรรมแบบจิตเภท	ชาย	4,638	88.06	4,826	109.45
	และความหลงผิด	หญิง	5,651	107.29	6,041	110.15
116	Mood(affective) disorders (F30-F39)	รวม	12,814	135.03	13,579	137.25
	ความผิดปกติทางอารมณ์	ชาย	4,022	76.36	4,274	96.93
		หญิง	8,792	166.93	9,305	169.67

ตารางที่ 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2558- 2559 (ต่อ)

รหัส/ กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย(โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2558		2559	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
117	Neurotic, stress related and somatoform disorders (F40-F48) โรคประสาท อาการทางกายที่เกิดจากจิตใจและ	รวม	8,318	87.66	8,016	81.02
		ชาย	2,334	44.31	2,167	49.15
		หญิง	5,984	113.61	5,849	106.65
118	Mental retardation (F70-F79) ภาวะปัญญาอ่อน	รวม	149	1.57	154	1.56
		ชาย	64	1.22	68	1.54
		หญิง	85	1.61	86	1.57
119	Other mental and behavioral disorders (F04-F09, F50-F69, F80-F99) ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมอื่น ๆ	รวม	25,453	268.22	27,772	280.71
		ชาย	12,633	239.85	13,953	316.45
		หญิง	12,820	243.40	13,819	251.98
120	Inflammatory diseases of the central nervous system (G00-G09) การอักเสบของระบบประสาทส่วนกลาง	รวม	6,210	65.44	6,555	66.26
		ชาย	3,411	64.76	3,576	81.10
		หญิง	2,799	53.14	2,979	54.32
121	Parkinson's disease (G20) โรคพาคินสัน	รวม	14,254	150.21	15,498	156.65
		ชาย	6,735	127.87	7,409	168.04
		หญิง	7,519	142.76	8,089	147.50
122	Alzheimer;s disease (G30) โรคอัลไซเมอร์	รวม	5,818	61.31	7,039	71.15
		ชาย	2,204	41.85	2,669	60.53
		หญิง	3,614	68.62	4,370	79.68
123	Multiple sclerosis (G35) มัลติเปิล สเคลอโรสิส	รวม	52	0.55	66	0.67
		ชาย	19	0.36	21	0.48
		หญิง	33	0.63	45	0.82
124	Epilepsy (G40-G41) ลมบ้าหมู	รวม	19,578	206.31	20,663	208.86
		ชาย	11,272	214.01	11,718	265.76
		หญิง	8,306	157.70	8,945	163.10
125	Migraine and other headache syndromes (G43-G44) โรคไมเกรนและกลุ่มอาการปวดศีรษะอื่น ๆ	รวม	4,369	46.04	3,943	39.85
		ชาย	1,480	28.10	1,315	29.82
		หญิง	2,889	54.85	2,628	47.92
126	Transient cerebral ischaemic attacks and related syndromes (G45)โรคเลือดไปเลี้ยงสมอง น้อยชั่วคราวและกลุ่มอาการต่อเนื่อง	รวม	6,847	72.15	7,218	72.96
		ชาย	3,639	69.09	3,890	88.22
		หญิง	3,208	60.91	3,328	60.68

ตารางที่ 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2558- 2559 (ต่อ)

รหัส/ กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย(โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2558		2559	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
127	Nerve, nerve root and plexus disorders (G50-G59)ความผิดปกติของเส้นประสาท ราก ประสาทและปมประสาท	รวม	4,848	51.09	5,327	53.84
		ชาย	2,068	39.26	2,357	53.46
		หญิง	2,780	52.78	2,970	54.16
128	Cerebral palsy and other paralytic syndromes (G80-G83) สมองพิการและกลุ่มอาการอัมพาตอื่น ๆ	รวม	20,758	218.75	23,760	240.16
		ชาย	11,524	218.80	13,204	299.47
		หญิง	9,234	175.32	10,556	192.48
129	Other diseases of the nervous system (G10-G13, G21-G26, G31-G32, G36-G37, G46-G47, G60-G73, G90-G99)โรคของระบบประสาทอื่น ๆ	รวม	43,031	453.46	47,409	479.20
		ชาย	20,365	386.65	22,848	518.19
		หญิง	22,666	430.34	24,561	447.85
130	Inflammation of eyelid (H00-H01) การอักเสบของหนังตา	รวม	585	6.16	735	7.43
		ชาย	223	4.23	285	6.46
		หญิง	362	6.87	450	8.21
131	Conjunctivitis and other disorders of conjunctiva (H10-H13) เยื่อตาอักเสบและความผิดปกติของเยื่อตาอื่น ๆ	รวม	11,590	122.14	10,779	108.95
		ชาย	4,254	80.77	4,039	91.60
		หญิง	7,336	139.28	6,740	122.90
132	Keratitis and other disorders of sclera and cornea (H15-H19) กระจกตาอักเสบและความผิดปกติของตาขาวและ	รวม	5,039	53.10	5,324	53.81
		ชาย	2,593	49.23	2,756	62.51
		หญิง	2,446	46.44	2,568	46.83
133	Cataract and other disorders of sclera and cornea (H25-H28) ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ	รวม	200,887	2,116.95	176,963	1,788.70
		ชาย	83,068	1,577.15	73,146	1,658.95
		หญิง	117,819	2,236.94	103,817	1,893.01
134	Retinal detachments and breaks (H33) จอประสาทตาหลุดออกและรอยฉีกของจอประสาทตา	รวม	2,722	28.68	2,644	26.72
		ชาย	1,627	30.89	1,584	35.92
		หญิง	1,095	20.79	1,060	19.33
135	Glaucoma (H40-H42) ต้อหิน	รวม	14,747	155.40	15,398	155.64
		ชาย	6,566	124.66	7,005	158.87
		หญิง	8,181	155.33	8,393	153.04

ตารางที่ 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2558- 2559 (ต่อ)

รหัส/ กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย(โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2558		2559	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
136	Strabismus (H49-H50) ตาเหล่	รวม	521	5.49	583	5.89
		ชาย	250	4.75	273	6.19
		หญิง	271	5.15	310	5.65
137	Disorders of refraction and accommodation (H52) ความผิดปกติของสายตาและการเพ่งมอง	รวม	826	8.70	662	6.69
		ชาย	376	7.14	285	6.46
		หญิง	450	8.54	377	6.87
138	Blindness and low vision (H54) ตาบอดและสายตาเลือนราง	รวม	194,162	2,046.08	170,892	1,727.33
		ชาย	79,998	1,518.86	70,283	1,594.01
		หญิง	114,164	2,167.54	100,609	1,834.52
139	Other diseases of the eye and adnexa (H02-H06, H20-H22, H30-H32, H34-H36, H43-H48, H51, H53, H55-H59)โรคของตาและส่วนประกอบของตาอื่น ๆ	รวม	19,723	207.84	20,891	211.16
		ชาย	8,469	160.79	8,953	203.05
		หญิง	11,254	213.67	11,938	217.68
140	Otitis media and other disorders of middle ear and mastoid (H65-H75)หูชั้นกลางอักเสบ และความผิดปกติของหูชั้นกลางและปุ่มกกหูอื่น ๆ	รวม	1,598	16.84	1,636	16.54
		ชาย	710	13.48	795	18.03
		หญิง	888	16.86	841	15.33
141	Hearing loss (H90-H91) การสูญเสียการได้ยิน	รวม	1,476	15.55	1,507	15.23
		ชาย	804	15.26	794	18.01
		หญิง	672	12.76	713	13.00
142	Other diseases of the ear and mastoid process (H60-H62, H80-H83, H92-H95) โรคของหูและปุ่มกกหูอื่น ๆ	รวม	15,050	158.60	14,403	145.58
		ชาย	4,654	88.36	4,531	102.76
		หญิง	10,396	197.38	9,872	180.01
143	Acute rheumatic fever (I00-I02) ไข้รูมาติกเฉียบพลัน	รวม	152	1.60	167	1.69
		ชาย	58	1.10	62	1.41
		หญิง	94	1.78	105	1.91
144	Chronic rheumatic heart disease (I05-I09) โรคหัวใจรูมาติกเรื้อรัง	รวม	13,814	145.57	14,196	143.49
		ชาย	5,238	99.45	5,388	122.20
		หญิง	8,576	162.83	8,808	160.61
145	Essential (primary) hypertension (I10) ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุ	รวม	893,130	9,411.80	950,830	9,610.75
		ชาย	371,584	7,054.97	399,445	9,059.38
		หญิง	521,546	9,902.18	551,385	10,054.03

ตารางที่ 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2558- 2559 (ต่อ)

รหัส/ กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย(โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2558		2559	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
146	Other hypertensive diseases (I11-I15) โรคความดันโลหิตสูงอื่น ๆ	รวม	7,365	77.61	6,064	61.29
		ชาย	3,163	60.05	2,598	58.92
		หญิง	4,202	79.78	3,466	63.20
147	Acute myocardial infarction (I21-I22) กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน	รวม	58,557	617.07	58,916	595.51
		ชาย	30,744	583.71	31,064	704.53
		หญิง	27,813	528.06	27,852	507.86
148	Other ischaemic heart diseases (I20, I23-I25) โรคหัวใจขาดเลือดอื่น ๆ	รวม	185,065	1,950.21	186,144	1,881.50
		ชาย	97,050	1,842.61	99,020	2,245.77
		หญิง	88,015	1,671.07	87,124	1,588.63
149	Pulmonary embolism (I26) ก้อนเลือดอุดตันในหลอดเลือดใหญ่ของปอด	รวม	2,990	31.51	3,349	33.85
		ชาย	1,027	19.50	1,267	28.74
		หญิง	1,963	37.27	2,082	37.96
150	Conduction disorders and cardiac arrhythmias (I44-I49)ความผิดปกติของการ นำกระแสไฟฟ้าหัวใจและหัวใจเต้นผิดจังหวะ	รวม	159,628	1,682.16	171,648	1,734.97
		ชาย	73,873	1,402.57	80,001	1,814.42
		หญิง	85,755	1,628.16	91,647	1,671.10
151	Heart failure (I50) หัวใจล้มเหลว	รวม	137,868	1,452.85	140,482	1,419.96
		ชาย	56,004	1,063.30	57,912	1,313.44
		หญิง	81,864	1,554.29	82,570	1,505.59
152	Other heart diseases (I27-I43, I51-I52) โรคหัวใจอื่น ๆ	รวม	69,492	732.31	73,010	737.97
		ชาย	30,759	584.00	32,785	743.56
		หญิง	38,733	735.39	40,225	733.47
153	Intracranial haemorrhage (I60-I62) เลือดออกในสมอง	รวม	29,448	310.32	31,694	320.35
		ชาย	15,586	295.92	17,131	388.53
		หญิง	13,862	263.19	14,563	265.54
154	Cerebral infarction (I63) เนื้อสมองตาย	รวม	71,417	752.59	73,796	745.91
		ชาย	36,887	700.34	38,067	863.36
		หญิง	34,530	655.59	35,729	651.49
155	Stroke, not specified as haemorrhage or infarction (I64)เป็นลมหมดสติที่ไม่จัดกลุ่มว่าเป็นจากเลือดออกในสมองหรือ เนื้อสมองตายจากการขาดเลือด	รวม	15,162	159.78	16,857	170.39
		ชาย	7,986	151.62	8,899	201.83
		หญิง	7,176	136.25	7,958	145.11

ตารางที่ 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2558- 2559 (ต่อ)

รหัส/ กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย(โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2558		2559	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
156	Other cerebrovascular diseases (I65-I69) โรคหลอดเลือดในสมองอื่น ๆ	รวม	82,199	866.21	85,351	862.71
		ชาย	43,956	834.56	45,803	1,038.81
		หญิง	38,243	726.09	39,548	721.12
157	Atherosclerosis (I70) อะเธอโรสเคลอโรซิส	รวม	1,700	17.91	1,739	17.58
		ชาย	849	16.12	867	19.66
		หญิง	851	16.16	872	15.90
158	Other peripheral vascular diseases (I73) โรคหลอดเลือดส่วนปลายอื่น ๆ	รวม	1,373	14.47	1,401	14.16
		ชาย	761	14.45	779	17.67
		หญิง	612	11.62	622	11.34
159	Aterial embolism and thrombosis (I74) ลิ่มเลือดและก้อนเลือดอุดตันที่หลอดเลือดแดง	รวม	4,635	48.84	4,552	46.01
		ชาย	2,457	46.65	2,359	53.50
		หญิง	2,178	41.35	2,193	39.99
160	Other disease of arteries, arterioles and capillaries (I71-I72, I77-I79)โรคของหลอดเลือดแดง หลอดเลือดแดงย่อยและแคปิลลารีอื่น ๆ	รวม	10,827	114.09	11,627	117.52
		ชาย	6,545	124.26	7,075	160.46
		หญิง	4,282	81.30	4,552	83.00
161	Phlebitis, thrombophlebitis, venous embolism and thrombosis (I80-I82) หลอดเลือดดำอักเสบ หลอดเลือดดำอักเสบมีลิ่มเลือด	รวม	12,187	128.43	13,596	137.42
		ชาย	4,856	92.20	5,390	122.24
		หญิง	7,331	139.19	8,206	149.63
162	Varicose veins of lower extremities (I83) หลอดเลือดดำขอดของระยางส่วนล่าง	รวม	685	7.22	760	7.68
		ชาย	318	6.04	351	7.96
		หญิง	367	6.97	409	7.46
163	Haemorrhoids (I84) ริดสีดวงทวาร	รวม	8,126	85.63	8,625	87.18
		ชาย	4,731	89.82	4,964	112.58
		หญิง	3,395	64.46	3,661	66.76
164	Other diseases of the circulatory system (I85-I99) โรคอื่น ๆ ของระบบไหลเวียนโลหิต	รวม	22,354	235.57	24,984	252.53
		ชาย	12,007	227.97	13,524	306.72
		หญิง	10,347	196.45	11,460	208.96
165	Acute pharyngitis and acute tonsillitis (J02-J03) คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน	รวม	5,112	53.87	5,249	53.06
		ชาย	1,888	35.85	1,965	44.57
		หญิง	3,224	61.21	3,284	59.88

ตารางที่ 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2558- 2559 (ต่อ)

รหัส/ กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย(โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2558		2559	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
166	Acute laryngitis and tracheitis (J04)	รวม	293	3.09	274	2.77
	กล่องเสียงและหลอดลมใหญ่อักเสบเฉียบพลัน	ชาย	145	2.75	136	3.08
		หญิง	148	2.81	138	2.52
167	Other acute upper respiratory infections (J00-J01, J05-J06)	รวม	9,374	98.78	9,869	99.75
		ชาย	3,751	71.22	3,796	86.09
	การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลัน	หญิง	5,623	106.76	6,073	110.74
168	Influenza (J09-J11)	รวม	3,781	39.84	6,776	68.49
	ไข้หวัดใหญ่	ชาย	1,585	30.09	2,811	63.75
		หญิง	2,196	41.69	3,965	72.30
169	Pneumonia (J12-J18)	รวม	212,010	2,234.16	236,268	2,388.14
	ปอดบวม	ชาย	111,675	2,120.29	125,764	2,852.32
		หญิง	100,335	1,904.98	110,504	2,014.95
170	Acute bronchitis and acute bronchiolitis (J20-J21)	รวม	31,399	330.88	33,295	336.54
		ชาย	13,568	257.60	14,357	325.62
	หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบ	หญิง	17,831	338.54	18,938	345.32
171	Chronic sinusitis (J32)	รวม	1,787	18.83	1,940	19.61
	ไซนัสอักเสบเรื้อรัง	ชาย	840	15.95	953	21.61
		หญิง	947	17.98	987	18.00
172	Other diseases of nose and nasal sinuses (J30-J31, J33-J34)	รวม	3,242	34.16	3,488	35.26
		ชาย	1,596	30.30	1,705	38.67
	โรคอื่นของจมูกและไซนัส	หญิง	1,646	31.25	1,783	32.51
173	Chronic diseases of tonsils and adenoids (J35)	รวม	175	1.84	178	1.80
	โรคเรื้อรังของต่อมทอนซิลและต่อมน้ำเหลืองในคอ	ชาย	66	1.25	71	1.61
		หญิง	109	2.07	107	1.95
174	Other diseases of upper respiratory tract (J36-J39)	รวม	2,354	24.81	2,631	26.59
		ชาย	1,242	23.58	1,395	31.64
	โรคอื่น ๆ ของระบบหายใจส่วนบน	หญิง	1,112	21.11	1,236	22.54

ตารางที่ 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2558- 2559 (ต่อ)

รหัส/ กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย(โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2558		2559	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
175	Bronchitis, emphysema and other chronic obstructive pulmonary diseases (J40-J44)โรคหลอดลมอักเสบ ถูกลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น	รวม	206,979	2,181.14	212,195	2,144.81
		ชาย	151,209	2,870.89	156,615	3,552.02
		หญิง	55,770	1,058.86	55,580	1,013.45
176	Asthma (J45-J46) โรคหืด	รวม	35,943	378.77	38,963	393.83
		ชาย	7,504	142.47	7,769	176.20
		หญิง	28,439	539.95	31,194	568.80
177	Bronchioectasis (J47) โรคหลอดลมเล็กโป่งพอง	รวม	9,890	104.22	11,046	111.65
		ชาย	4,208	79.89	4,672	105.96
		หญิง	5,682	107.88	6,374	116.22
178	Pneumoconiosis (J60-J65) โรคฝุ่นสะสมในปอด	รวม	82	0.86	95	0.96
		ชาย	54	1.03	61	1.38
		หญิง	28	0.53	34	0.62
179	Other diseases of the respiratory system (J22, J66-J99) โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินหายใจ	รวม	187,124	1,971.91	199,137	2,012.83
		ชาย	101,623	1,929.44	109,307	2,479.07
		หญิง	85,501	1,623.34	89,830	1,637.97
180	Dental caries (K02) ฟันผุ	รวม	1,657	17.46	1,757	17.76
		ชาย	748	14.20	802	18.19
		หญิง	909	17.26	955	17.41
181	Other disorders of teeth and supporting structures (K00-K01, K03-K08) ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง	รวม	4,846	51.07	4,844	48.96
		ชาย	2,172	41.24	2,148	48.72
		หญิง	2,674	50.77	2,696	49.16
182	Other diseases of the oral cavity, salivary glands and jaws (K09-K14)โรคอื่น ๆ ของช่องปาก ต่อมน้ำลายและขากรรไกร	รวม	6,021	63.45	6,370	64.39
		ชาย	2,526	47.96	2,720	61.69
		หญิง	3,495	66.36	3,650	66.55
183	Gastric and duodenal ulcer (K25-K27) แผลเปื่อยของกระเพาะอาหารดูโอเดนิ้ม	รวม	25,737	271.22	24,947	252.16
		ชาย	15,042	285.59	14,797	335.59
		หญิง	10,695	203.06	10,150	185.08
184	Gastritis and duodenitis (K29) กระเพาะอาหารอักเสบและดูโอเดนิ้มอักเสบ	รวม	23,126	243.70	23,514	237.67
		ชาย	11,009	209.02	11,242	254.97
		หญิง	12,117	230.06	12,272	223.77

ตารางที่ 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2558- 2559 (ต่อ)

รหัส/ กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย(โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2558		2559	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
185	Other diseases of oesophagus, stomach and duodenum (K20-K23, K28, K30-K31) โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนิม	รวม	79,237	835.00	76,748	775.75
		ชาย	31,419	596.53	30,646	695.05
		หญิง	47,818	907.88	46,102	840.63
186	Diseases of appEndix (K35-K38) โรคของไส้ติ่ง	รวม	15,067	158.78	15,068	152.30
		ชาย	6,489	123.20	6,477	146.90
		หญิง	8,578	162.86	8,591	156.65
187	Inguinal hernia (K40) ไส้เลื่อนที่บริเวณขาหนีบ	รวม	17,566	185.11	17,989	181.83
		ชาย	16,906	320.98	17,326	392.95
		หญิง	660	12.53	663	12.09
188	Other hernia (K41-K46) ไส้เลื่อนอื่น ๆ	รวม	3,323	35.02	3,573	36.11
		ชาย	1,336	25.37	1,407	31.91
		หญิง	1,987	37.73	2,166	39.50
189	Crohn's disease and ulcerative colitis (K50-K51) โรคโครนและลำไส้ใหญ่อักเสบแผลเปื่อย	รวม	435	4.58	448	4.53
		ชาย	195	3.70	198	4.49
		หญิง	240	4.56	250	4.56
190	Paralytic ileus and intestinal obstruction without hernia (K56) ลำไส้ไม่ทำงานและลำไส้เกิดอุดตันแบบไม่มีไส้เลื่อน	รวม	19,848	209.16	20,988	212.14
		ชาย	11,581	219.88	12,478	283.00
		หญิง	8,267	156.96	8,510	155.17
191	Diverticular disease of intestine (K57) โรคติ่งเนื้อของลำไส้	รวม	5,024	52.94	5,575	56.35
		ชาย	2,320	44.05	2,751	62.39
		หญิง	2,704	51.34	2,824	51.49
192	Other diseases of intestine and peritoneum (K52-K55, K58-K67) โรคอื่น ๆ ของลำไส้และเยื่อช่องท้อง	รวม	51,672	544.52	53,759	543.38
		ชาย	25,773	489.33	26,841	608.75
		หญิง	25,899	491.72	26,918	490.83
193	Alcoholic liver disease (K70) โรคตับเกี่ยวกับแอลกอฮอล์	รวม	11,098	116.95	11,761	118.88
		ชาย	7,648	145.21	8,216	186.34
		หญิง	3,450	65.50	3,545	64.64
194	Other disease of liver (K71-K77) โรคอื่น ๆ ของตับ	รวม	60,306	635.50	63,636	643.22
		ชาย	31,038	589.29	32,810	744.13
		หญิง	29,268	555.69	30,826	562.09

ตารางที่ 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2558- 2559 (ต่อ)

รหัส/ กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย(โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2558		2559	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
195	Cholelithiasis and cholecystitis (K80-K81)	รวม	35,752	376.75	36,776	371.72
	โรคนิ่วในระบบน้ำดีและถุงน้ำดีอักเสบ	ชาย	15,576	295.73	16,122	365.65
		หญิง	20,176	383.07	20,654	376.61
196	Acute pancreatitis and other disease of the pancreas (K85-K86)	รวม	4,899	51.63	5,339	53.97
	ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันและโรคอื่น ๆ ของตับอ่อน	ชาย	2,773	52.65	2,939	66.66
		หญิง	2,126	40.36	2,400	43.76
197	Other diseases of the digestive system (K82-K83, K87-K93)	รวม	72,489	763.89	74,129	749.28
	โรคอื่น ๆ ของระบบย่อยอาหาร	ชาย	40,220	763.63	41,637	944.32
		หญิง	32,269	612.67	32,492	592.46
198	Infection of the skin and subcutaneous tissue (L00-L08)	รวม	63,579	670.00	58,773	594.06
	โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	ชาย	32,551	618.02	30,128	683.30
		หญิง	31,028	589.10	28,645	522.32
199	Other diseases of the skin and subcutaneous tissue (L10-L99)	รวม	53,562	564.44	56,150	567.55
	โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	ชาย	25,172	477.92	25,845	586.16
		หญิง	28,390	539.02	30,305	552.59
200	Rheumatoid arthritis and other inflammatory polyarthropathies (M05-M14)	รวม	115,684	1,219.08	122,134	1,234.50
	ข้ออักเสบรูมาตอยและข้ออักเสบหลายข้อ	ชาย	73,704	1,399.36	78,064	1,770.49
		หญิง	41,980	797.04	44,070	803.58
201	Arthrosis (M15-M19)	รวม	28,051	295.60	28,771	290.81
	โรคข้อเสื่อม	ชาย	6,251	118.68	6,349	143.99
		หญิง	21,800	413.90	22,422	408.85
202	Acquired deformities of limbs (M20-M21)	รวม	465	4.90	517	5.23
	ความพิการของแขนขา	ชาย	126	2.39	165	3.74
		หญิง	339	6.44	352	6.42
203	Other disorders of joints (M00-M03, M22-M25)	รวม	8,569	90.30	8,860	89.55
	ความผิดปกติอื่น ๆ ของข้อ	ชาย	3,927	74.56	4,030	91.40
		หญิง	4,642	88.13	4,830	88.07
204	Systemic connective tissue disorders (M30-M36)	รวม	4,620	48.69	5,112	51.67
	ความผิดปกติของระบบเนื้อเยื่อประสาน	ชาย	1,210	22.97	1,351	30.64
		หญิง	3,410	64.74	3,761	68.58

ตารางที่ 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2558- 2559 (ต่อ)

รหัส/ กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย(โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2558		2559	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
205	Cervical and other intervertebral disc disorders (M50-M51) กระดูกสันหลังและหมอนรองกระดูกสันหลังอื่น ๆ	รวม	2,087	21.99	2,084	21.06
		ชาย	1,040	19.75	1,082	24.54
		หญิง	1,047	19.88	1,002	18.27
206	Other dorsopathies (M40-M49, M53-M54) พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ	รวม	37,077	390.72	36,821	372.18
		ชาย	14,627	277.71	15,150	343.60
		หญิง	22,450	426.24	21,671	395.15
207	Soft tissue disorders (M60-M79) เนื้อเยื่อผิดปกติ	รวม	40,427	426.02	38,701	391.18
		ชาย	18,630	353.71	17,731	402.14
		หญิง	21,797	413.84	20,970	382.37
208	Disorders of bone density and structure (M80-M85)ความผิดปกติของความหนาแน่นของเนื้อกระดูกและโครงสร้าง	รวม	10,447	110.09	10,473	105.86
		ชาย	2,150	40.82	2,154	48.85
		หญิง	8,297	157.53	8,319	151.69
209	Osteomyelitis (M86) กระดูกอักเสบ	รวม	4,469	47.09	4,517	45.66
		ชาย	2,411	45.78	2,486	56.38
		หญิง	2,058	39.07	2,031	37.03
210	Other diseases of the musculoskeletal system and connective tissue (M87-M99) โรคอื่น ๆ ของระบบกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อประสาน	รวม	5,216	54.97	5,048	51.02
		ชาย	2,160	41.01	2,153	48.83
		หญิง	3,056	58.02	2,895	52.79
211	Acute and rapidly progressive nephritic syndromes (N00-N01)กลุ่มอาการไตอักเสบเฉียบพลันและชนิดกำเริบเร็ว	รวม	328	3.46	336	3.40
		ชาย	147	2.79	160	3.63
		หญิง	181	3.44	176	3.21
212	Other glomerular diseases (N02-N08) โรคของหน่วยไตอื่น ๆ	รวม	17,822	187.81	18,636	188.37
		ชาย	6,881	130.64	7,297	165.50
		หญิง	10,941	207.73	11,339	206.76
213	Renal tubulo-interstitial diseases (N10-N16) โรคของท่อและเนื้อเยื่อระหว่างท่อในไต	รวม	55,155	581.22	56,719	573.30
		ชาย	21,120	400.99	22,150	502.36
		หญิง	34,035	646.20	34,569	630.34
214	Renal failure (N17-N19) ไตวาย	รวม	460,217	4,849.77	509,752	5,152.44
		ชาย	218,318	4,145.03	242,820	5,507.14
		หญิง	241,899	4,592.75	266,932	4,867.28

ตารางที่ 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2558- 2559 (ต่อ)

รหัส/ กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย(โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2558		2559	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
215	Urolithiasis (N20-N23) นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ	รวม	26,274	276.88	27,421	277.16
		ชาย	16,204	307.65	17,182	389.69
		หญิง	10,070	191.19	10,239	186.70
216	Cystitis (N30) กระเพาะปัสสาวะอักเสบ	รวม	13,033	137.34	12,727	128.64
		ชาย	4,065	77.18	4,116	93.35
		หญิง	8,968	170.27	8,611	157.01
217	Other diseases of the urinary system (N25-N29, N31-N39) โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะ	รวม	138,410	1,458.56	147,295	1,488.82
		ชาย	54,985	1,043.96	59,659	1,353.06
		หญิง	83,425	1,583.93	87,636	1,597.97
218	Hyperplasia of prostate (N40)ต่อมลูกหมากโต จากการเพิ่มจำนวนเซลล์	รวม	66,212	697.74	73,121	739.09
		ชาย	66,212	1,257.12	73,121	1,658.38
		หญิง	0	0.00	0	0.00
219	Other disorders of prostate (N41-N42) ความผิดปกติอื่น ๆ ของต่อมลูกหมาก	รวม	503	5.30	565	5.71
		ชาย	503	9.55	565	12.81
		หญิง	0	0.00	0	0.00
220	Hydrocele and spermatocele (N43) ถุงน้ำและถุงที่มีอสุจิที่อั้นทะ	รวม	683	7.20	699	7.07
		ชาย	683	12.97	699	15.85
		หญิง	0	0.00	0	0.00
221	Redundant prepuce, phimosis and paraphimosis (N47) หนังหุ้มปลายองคชาตยาวเกินไป ปลายตีบรูเปิดไม่ได้	รวม	821	8.65	825	8.34
		ชาย	821	15.59	825	18.71
		หญิง	0	0.00	0	0.00
222	Other disease of male genital organs (N44-N46, N48-N51) โรคอื่น ๆ ของอวัยวะสืบพันธุ์ชาย	รวม	3,138	33.07	3,233	32.68
		ชาย	3,138	59.58	3,233	73.32
		หญิง	0	0.00	0	0.00
223	Disorders of breast (N60-N64) ความผิดปกติของเต้านม	รวม	1,414	14.90	1,399	14.14
		ชาย	245	4.65	186	4.22
		หญิง	1,169	22.19	1,213	22.12
224	Salpingitis and oophoritis (N70) ปีกมดลูกและรังไข่อักเสบ	รวม	102	1.07	106	1.07
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	102	1.94	106	1.93

ตารางที่ 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2558- 2559 (ต่อ)

รหัส/ กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย(โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2558		2559	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
225	Inflammatory disease of cervix uteri (N72) ปากมดลูกอักเสบ	รวม	132	1.39	126	1.27
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	132	2.51	126	2.30
226	Other inflammatory diseases of female pelvic organs (N71, N73-N77) การอักเสบอื่น ๆ ของอวัยวะในอุ้งเชิงกรานสตรี	รวม	1,891	19.93	1,875	18.95
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	1,891	35.90	1,875	34.19
227	Endometriosis (N80) เยื่อบุมดลูกอยู่ผิดที่	รวม	267	2.81	353	3.57
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	267	5.07	353	6.44
228	Female genital prolapse (N81) การหย่อนตัวของอวัยวะสืบพันธุ์สตรี	รวม	3,771	39.74	3,686	37.26
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	3,771	71.60	3,686	67.21
229	Noninflammatory disorder of ovary, fallopian tube and broad ligament (N83) ความผิดปกติอื่นที่ไม่ใช่การอักเสบของรังไข่ ท่อรังไข่	รวม	817	8.61	901	9.11
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	817	15.51	901	16.43
230	Disorder of menstruation (N91-N92) ความผิดปกติของระดู	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
231	Menopausal and other perimenopausal disorders (N95) การหมดประจำเดือนและความผิดปกติอื่นในระยะ	รวม	1,677	17.67	1,705	17.23
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	1,677	31.84	1,705	31.09
232	Female infertility (N97) ภาวะมีบุตรยากในสตรี	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
233	Other disorders of genitourinary tract (N82, N84-N90, N93-N94, N96, N98-N99) ความผิดปกติอื่น ๆ ของท่อทางเดินปัสสาวะและสืบพันธุ์	รวม	2,608	27.48	2,828	28.58
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	2,608	49.52	2,828	51.57
234	Spontaneous abortion (O03) แท้งเอง	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00

ตารางที่ 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2558- 2559 (ต่อ)

รหัส/ กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย(โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2558		2559	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
235	Medical abortion (O04)	รวม	0	0.00	0	0.00
	การทำแท้งโดยเหตุผลทางการแพทย์	ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
236	Other pregnancies with abortive outcome (O00-O02, O05-O08)	รวม	0	0.00	0	0.00
	การตั้งครรภ์อื่น ๆ ที่สิ้นสุดโดยการแท้ง	ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
237	Oedema, proteinuria and hypertensive disorders in pregnancy, childbirth and the puerperium (O10-O16)	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
238	Placenta praevia, premature separation of placenta and antepartum haemorrhage (O44-O46) รกเกาะต่ำ รกลอกตัวก่อนกำหนด และตกเลือดก่อนคลอด	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
239	Other maternal care related to fetus and amniotic cavity and possible delivery problems (O30-O43, O47-O48)	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
240	Obstructed labour (O64-O66) การคลอดติดขัด	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
241	Postpartum haemorrhage (O72) ตกเลือดหลังคลอด	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
242	Other complications of pregnancy and delivery (O20-O29, O60-O63, O67-O71, O73-O75, O81-O84)ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ของการตั้งครรภ์ และการคลอด	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00

ตารางที่ 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2558- 2559 (ต่อ)

รหัส/ กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย(โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2558		2559	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
243	Single spontaneous delivery (O80) การคลอดของครรภ์เดียว	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
244	Complications predominantly related to the puerperium and other obstetric conditions, not Elsewhere classified (O85-O99) ภาวะแทรกซ้อนที่ส่วนใหญ่พบในระยะหลังคลอด และ	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
245	Fetus and newborn affected by maternal factors and by complications of pregnancy, labor and delivery (P00-P04) ทารกในครรภ์และ แรกเกิดที่ได้รับผลจากปัจจัยทางมารดา และโรคแทรก ในระยะตั้งครรภ์ เจ็บครรภ์ และคลอด	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
246	Slow fetal growth, fetal malnutrition and disorders related to short gestation and low birth weight (P05-P07) ทารกในครรภ์โตช้า ทารก ในครรภ์ขาดสารอาหาร และความผิดปกติเกี่ยวกับการ ตั้งครรภ์ระยะสั้น และน้ำหนักทารกแรกเกิดน้อย	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
247	Birth trauma (P10-P15) บาดเจ็บจากการคลอด	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
248	Intrauterine hypoxia and birth asphyxia (P20-P21) ขาดออกซิเจนขณะอยู่ในโพรงมดลูก และ ภาวะแอสฟิกเซียเมื่อแรกเกิด	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
249	Other respiratory disorders originating in the perinatal period (P22-P28) ภาวะหายใจผิดปกติอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
250	Congenital infectious and parasitic diseases (P35-P37) การติดเชื้อแต่กำเนิดและโรคปาราสิต	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00

ตารางที่ 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2558- 2559 (ต่อ)

รหัส/ กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย(โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2558		2559	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
251	Other infections specific to the perinatal period (P38-P39)	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
	การติดเชื้อเฉพาะอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด	หญิง	0	0.00	0	0.00
252	Haemolytic disease of fetus and newborn (P55)	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
	โรคเม็ดเลือดแดงของทารกในครรภ์และแรกเกิด	หญิง	0	0.00	0	0.00
253	Other conditions originating in the perinatal period (P08, P29, P50-P54, P56-P96)	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
	ภาวะอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด	หญิง	0	0.00	0	0.00
254	Spina bifida (Q05)	รวม	5	0.05	8	0.08
		ชาย	4	0.08	3	0.07
	กระดูกสันหลังแยก	หญิง	1	0.02	5	0.09
255	Other congenital malformations of the nervous system (Q00-Q04, Q06-Q07)	รวม	56	0.59	52	0.53
		ชาย	28	0.53	33	0.75
	ความผิดปกติอื่น ๆ แต่กำเนิดของระบบประสาท	หญิง	28	0.53	19	0.35
256	Congenital malformation of the circulatory system (Q20-Q28)	รวม	1,234	13.00	1,249	12.62
		ชาย	430	8.16	506	11.48
	ความผิดปกติแต่กำเนิดของระบบไหลเวียนโลหิต	หญิง	804	15.26	743	13.55
257	Cleft lip and cleft palate (Q35-Q37)	รวม	13	0.14	15	0.15
		ชาย	6	0.11	8	0.18
	ปากแหว่งและเพดานโหว่	หญิง	7	0.13	7	0.13
258	Absence, atresia and stenosis of small intestine (Q41)	รวม	5	0.05	1	0.01
		ชาย	5	0.09	0	0.00
	ลำไส้เล็กไม่มี ตันและตีบ	หญิง	0	0.00	1	0.02
259	Other congenital malformations of the digestive system (Q38-Q40, Q42-Q45)	รวม	162	1.71	192	1.94
		ชาย	80	1.52	101	2.29
	ความผิดปกติแต่กำเนิดอื่น ๆ ของระบบย่อยอาหาร	หญิง	82	1.56	91	1.66
260	Undescended testicle (Q53)	รวม	26	0.27	45	0.45
		ชาย	26	0.49	45	1.02
	อัณฑะไม่ลงถุง	หญิง	0	0.00	0	0.00

ตารางที่ 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2558- 2559 (ต่อ)

รหัส/ กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย(โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2558		2559	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
261	Other malformations of the genitourinary system (Q50-Q52, Q54-Q64) ความผิดปกติอื่น ๆ ของระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ	รวม	435	4.58	499	5.04
		ชาย	205	3.89	237	5.38
		หญิง	230	4.37	262	4.78
262	Congenital deformities of hip (Q65) ความพิการแต่กำเนิดของสะโพก	รวม	19	0.20	16	0.16
		ชาย	4	0.08	3	0.07
		หญิง	15	0.28	13	0.24
263	Congenital deformities of feet (Q66) ความพิการแต่กำเนิดของเท้า	รวม	9	0.09	11	0.11
		ชาย	7	0.13	2	0.05
		หญิง	2	0.04	9	0.16
264	Other congenital malformations and deformations of the musculoskeletal system (Q67-Q79)	รวม	67	0.71	76	0.77
		ชาย	21	0.40	27	0.61
		หญิง	46	0.87	49	0.89
265	Other congenital malformations (Q10-Q18, Q30-Q34, Q80-Q89) ความผิดปกติแต่กำเนิดอื่น ๆ	รวม	379	3.99	353	3.57
		ชาย	181	3.44	182	4.13
		หญิง	198	3.76	171	3.12
266	Chromosomal abnormalities, not Elsewhere classified (Q90-Q99) ความผิดปกติของโครโมโซมที่มีได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น	รวม	28	0.30	43	0.43
		ชาย	11	0.21	27	0.61
		หญิง	17	0.32	16	0.29
267	Abdominal and pelvic pain (R10) ปวดท้องและปวดอุ้งเชิงกราน	รวม	7,447	78.48	7,520	76.01
		ชาย	3,243	61.57	3,334	75.61
		หญิง	4,204	79.82	4,186	76.33
268	Fever of unknown origin (R50) ไข้ไม่ทราบสาเหตุ	รวม	29,644	312.39	34,724	350.98
		ชาย	13,624	258.67	16,189	367.17
		หญิง	16,020	304.16	18,535	337.97
269	Senility (R54) ชราภาพ	รวม	3,543	37.34	2,139	21.62
		ชาย	1,425	27.06	864	19.60
		หญิง	2,118	40.21	1,275	23.25

ตารางที่ 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2558- 2559 (ต่อ)

รหัส/ กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย(โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2558		2559	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
270	Other symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not Elsewhere classified (R00-R09, R11-R49, R51-R53, R55-R99) อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจทางคลินิกและตรวจทางห้องปฏิบัติการ	รวม	366,612	3,863.36	378,230	3,823.05
		ชาย	175,440	3,330.94	181,896	4,125.39
		หญิง				
			191,172	3,629.63	196,334	3,579.98
271	Fracture of skull and facial bones (S02)กระดูกแตกหักบริเวณกะโหลกศีรษะและกระดูกหน้า	รวม	3,331	35.10	3,748	37.88
		ชาย	2,329	44.22	2,632	59.69
		หญิง	1,002	19.02	1,116	20.35
272	Fracture of neck, thorax and pelvis (S12, S22, S32, T08) กระดูกคอ กระดูกซี่โครง หรือกระดูกเชิงกรานหัก	รวม	10,044	105.84	10,791	109.07
		ชาย	5,151	97.80	5,628	127.64
		หญิง	4,893	92.90	5,163	94.14
273	Fracture of femur (S72) กระดูกต้นขาแตก หัก ร้าว	รวม	22,959	241.94	24,889	251.57
		ชาย	6,316	119.92	6,844	155.22
		หญิง	16,643	315.99	18,045	329.04
274	Fracture of other limb bones (S42, S52, S62, S82, S92, T10, T12) กระดูกแตกหักของแขนขาอื่น ๆ	รวม	22,900	241.32	24,646	249.12
		ชาย	10,488	199.13	11,120	252.20
		หญิง	12,412	235.66	13,526	246.63
275	Fracture involving multiple body regions (T02) กระดูกแตกหักหลายบริเวณในร่างกาย	รวม	14	0.15	18	0.18
		ชาย	7	0.13	5	0.11
		หญิง	7	0.13	13	0.24
276	Dislocations, sprains and strains of specified and multiple body regions (S03, S13, S23, S33, S43,S53, S63, S73, S83, S93, T03) กระดูกเคลื่อน เคล็ด ขัด บริเวณร่างกายหลายแห่งที่ระบุเฉพาะ	รวม	3,978	41.92	4,205	42.50
		ชาย	1,861	35.33	1,994	45.22
		หญิง	2,117	40.19	2,211	40.32
277	Injury of eye and orbi (S05) การบาดเจ็บของตาและเบ้าตา	รวม	2,192	23.10	2,225	22.49
		ชาย	1,447	27.47	1,441	32.68
		หญิง	745	14.14	784	14.30
278	Intracranial injury (S06) การบาดเจ็บภายในกะโหลกศีรษะ	รวม	17,978	189.45	21,233	214.62
		ชาย	10,823	205.49	12,388	280.96
		หญิง	7,155	135.85	8,845	161.28

ตารางที่ 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2558 - 2559 (ต่อ)

รหัส/ กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย(โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2558		2559	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
279	Injury of other internal organs (S26-S27, S36-S37) การบาดเจ็บของอวัยวะภายในอื่น ๆ	รวม	4,087	43.07	4,374	44.21
		ชาย	3,173	60.24	3,499	79.36
		หญิง	914	17.35	875	15.95
280	Crushing injuries and traumatic amputations of specified and multiple body regions (S07-S08, S17-S18, S28, S38, S47-S48, S57-S58, S67-S68, S77-S78, S87-S88, S97-S98, T04-T05) การบาดเจ็บจากการบดอัดและการบาดเจ็บที่เกิดจากตัดขาดบริเวณร่างกายหลายแห่งที่ระบุ	รวม	1,075	11.33	1,094	11.06
		ชาย	825	15.66	845	19.16
		หญิง	250	4.75	249	4.54
281	Other injuries of specified, unspecified and multiple body regions (S00-S01, S04, S09-S11, S14-S16, S19-S21, S24-S25, S29-S31, S34-S35, S39-S41, S44-S46, S49-S51, S54-S56, S59-S61, S64-S66, S69-S71, S74-S76, S79-S81, S84-S86, S89-S91, S94-S96, S99, T00-T01, T06-T07, T09, T11, T13-T14) การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลาย	รวม	36,718	386.93	40,166	405.99
		ชาย	21,446	407.18	23,328	529.08
		หญิง	15,272	289.96	16,838	307.03
282	Effects of foreign body entering through natural orifice (T15-T19) ผลของวัตถุแปลกปลอมผ่านเข้าทางทวารธรรมชาติของร่างกาย	รวม	1,179	12.42	1,146	11.58
		ชาย	628	11.92	622	14.11
		หญิง	551	10.46	524	9.55
283	Burns and corrosions (T20-T32) แผลถูกความร้อนและถูกสารกัดกร่อน	รวม	3,348	35.28	3,690	37.30
		ชาย	1,767	33.55	1,845	41.84
		หญิง	1,581	30.02	1,845	33.64
284	Poisoning by drugs and biological substances (T36-T50) การเป็นพิษจากยา เครื่องยาและชีววัตถุ	รวม	8,836	93.11	8,497	85.89
		ชาย	3,779	71.75	3,619	82.08
		หญิง	5,057	96.01	4,878	88.95
285	Toxic effects of substances chiefly nonmedicinal as to source (T51-T65) การเป็นพิษจากสารที่โดยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ใช้เป็นยา	รวม	8,468	89.24	8,374	84.64
		ชาย	4,329	82.19	4,188	94.98
		หญิง	4,139	78.58	4,186	76.33

ตารางที่ 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2558 - 2559 (ต่อ)

รหัส/ กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย(โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2558		2559	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
286	Maltreatment syndromes (T74) กลุ่มอาการจากการทารุณ	รวม	16	0.17	18	0.18
		ชาย	3	0.06	8	0.18
		หญิง	13	0.25	10	0.18
287	Other and unspecified effects of external causes (T33-T35, T66-T73, T75-T78) อื่น ๆ และที่มีได้ผลของสาเหตุภายนอก	รวม	4,319	45.51	4,732	47.83
		ชาย	1,930	36.64	2,227	50.51
		หญิง	2,389	45.36	2,505	45.68
288	Certain early complications of trauma and complications of surgical and medical care, note Elsewhere classified (T79-T88) ภาวะแทรกซ้อนระยะแรกของการบาดเจ็บบางชนิด และภาวะแทรกซ้อนของการรักษาทางศัลยกรรมและ อายุรกรรมที่มีได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น	รวม	56,865	599.24	61,525	621.88
		ชาย	29,444	559.03	31,747	720.02
		หญิง	27,421	520.62	29,778	542.98
289	Sequela of injuries, of poisoning and of other consequences of external causes (T90-T98)ผลระยะล่าของการบาดเจ็บ การเป็นพิษ และผลที่ตามมาจากสาเหตุภายนอกอื่น ๆ	รวม	614	6.47	618	6.25
		ชาย	335	6.36	372	8.44
		หญิง	279	5.30	246	4.49
290	Persons encountering health services for examination and investigation (Z00-Z13) บุคคลขอรับบริการเพื่อการตรวจและชันสูตร	รวม	14,947	157.51	14,941	151.02
		ชาย	6,383	121.19	5,909	134.02
		หญิง	8,564	162.60	9,032	164.69
291	Asymptomatic human immunodeficiency virus (HIV) infection status (Z21) การติดเชื้อไวรัสโดยไม่มีอาการ	รวม	175	1.84	223	2.25
		ชาย	101	1.92	129	2.93
		หญิง	74	1.40	94	1.71
292	Other persons with potential health hazards related to communicable diseases (Z20, Z22-Z29) บุคคลที่มีอาการที่น่าจะเป็นอันตรายต่อ สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่อ	รวม	607	6.40	624	6.31
		ชาย	306	5.81	325	7.37
		หญิง	301	5.71	299	5.45
293	Contraceptive management (Z30) การรับบริการคุมกำเนิด	รวม	86	0.91	66	0.67
		ชาย	20	0.38	2	0.05
		หญิง	66	1.25	64	1.17

ตารางที่ 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2558 - 2559 (ต่อ)

รหัส/ กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย(โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2558		2559	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
294	Antenatal screening and other supervision of pregnancy (Z34-Z36) การตรวจคัดกรองก่อนการคลอด และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งครรภ์อื่น ๆ	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
295	Liveborn infants according to place of birth (Z38) การเกิดของทารกตามสถานที่เกิด	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
296	Postpartum care and examination (Z39) การดูแลและการตรวจหลังคลอด	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
297	Persons encountering health services for specific procedures and health care (Z40-Z54, Z40-Z54) บุคคลขอรับบริการสุขภาพเพื่อหัตถการหรือการบริการสุขภาพที่ระบุเฉพาะ	รวม	137,260	1,446.45	155,764	1,574.42
		ชาย	69,382	1,317.30	78,505	1,780.49
		หญิง	67,878	1,288.75	77,259	1,408.75
298	Persons encountering health services for other reasons (Z31-Z33, Z37, Z55-Z99) บุคคลขอรับบริการสุขภาพด้วยเหตุผลอื่น	รวม	49,521	521.85	61,068	617.26
		ชาย	27,308	518.48	33,543	760.75
		หญิง	22,213	421.74	27,525	501.89

รวบรวม/วิเคราะห์ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน สวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการและครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ(สภส.)

ตาราง 23 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตาม เพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 -2559

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2558		2559	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
รวมทุกกลุ่มโรค		รวม	19,126,383	29,412.81	19,740,850	30,364.23
		ชาย	9,002,420	28,192.39	9,356,225	29,334.94
		หญิง	10,123,963	30,590.33	10,384,625	31,355.48
001	Cholera (A00) อหิวาตกโรค	รวม	160	0.25	142	0.22
		ชาย	81	0.25	81	0.25
		หญิง	79	0.24	61	0.18
002	Typhoid and paratyphoid fever (A01) ไข้รากสาดน้อยและไข้รากสาดเทียม	รวม	4,147	6.38	4,169	6.41
		ชาย	2,133	6.68	2,199	6.89
		หญิง	2,014	6.09	1,970	5.95
003	Shigellosis (A03) โรคบิดจากเชื้อชิกเกิลลา	รวม	142	0.22	181	0.28
		ชาย	63	0.20	90	0.28
		หญิง	79	0.24	91	0.27
004	Amoebiasis (A06) โรคบิดมีตัว	รวม	3,469	5.33	3,730	5.74
		ชาย	1,659	5.20	1,678	5.26
		หญิง	1,810	5.47	2,052	6.20
005	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin (A09) อาการท้องร่วง กระเพาะและ ลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ	รวม	401,511	617.45	446,664	687.03
		ชาย	185,876	582.10	207,392	650.24
		หญิง	215,635	651.56	239,272	722.46
006	Other intestinal infectious diseases (A02, A04-A05, A07-A08) โรคลำไส้อักเสบอื่น ๆ	รวม	56,963	87.60	64,624	99.40
		ชาย	27,109	84.90	31,304	98.15
		หญิง	29,854	90.21	33,320	100.61
007	Respiratory tuberculosis (A15-A16) วัณโรคทางเดินหายใจ	รวม	69,521	106.91	70,132	107.87
		ชาย	47,988	150.28	48,846	153.15
		หญิง	21,533	65.06	21,286	64.27
008	Other Tuberculosis (A17-A19) วัณโรคอื่น ๆ	รวม	17,701	27.22	17,737	27.28
		ชาย	10,937	34.25	10,888	34.14
		หญิง	6,764	20.44	6,849	20.68
009	Plaque (A20) กาฬโรค	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00

ตาราง 23 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตาม เพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 -2559 (ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2558		2559	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
010	Brucellosis (A23) โรคติดเชื้อบรูเซลลา	รวม	17	0.03	14	0.02
		ชาย	9	0.03	10	0.03
		หญิง	8	0.02	4	0.01
011	Leprosy (A30) โรคเรื้อน	รวม	486	0.75	436	0.67
		ชาย	316	0.99	264	0.83
		หญิง	170	0.51	172	0.52
012	Tetanus neonatorum (A33) บาดทะยักในเด็กแรกเกิด	รวม	2	0.00	1	0.00
		ชาย	1	0.00	1	0.00
		หญิง	1	0.00	0	0.00
013	Other tetanus (A34-A35) บาดทะยักอื่น ๆ	รวม	227	0.35	231	0.36
		ชาย	148	0.46	148	0.46
		หญิง	79	0.24	83	0.25
014	Diphtheria (A36) โรคคอตีบ	รวม	80	0.12	66	0.10
		ชาย	43	0.13	32	0.10
		หญิง	37	0.11	34	0.10
015	Whooping cough (A37) โรคไอกรน	รวม	59	0.09	76	0.12
		ชาย	24	0.08	31	0.10
		หญิง	35	0.11	45	0.14
016	Meningococcal infection (A39) การติดเชื้อเมนิงโกคอคคัส	รวม	146	0.22	109	0.17
		ชาย	90	0.28	65	0.20
		หญิง	56	0.17	44	0.13
017	Septicemia (A40-A41) โลหิตเป็นพิษ	รวม	135,253	207.99	140,825	216.61
		ชาย	68,657	215.01	72,113	226.10
		หญิง	66,596	201.22	68,712	207.47
018	Other bacterial diseases (A21-A22, A24-A28,A31-A32, A38, A42-A49) โรคจากแบคทีเรียอื่น ๆ	รวม	57,035	87.71	58,920	90.63
		ชาย	32,651	102.25	33,754	105.83
		หญิง	24,384	73.68	25,166	75.99
019	Congenital syphilis (A50) ซิฟิลิสแต่กำเนิด	รวม	416	0.64	590	0.91
		ชาย	219	0.69	327	1.03
		หญิง	197	0.60	263	0.79

ตาราง 23 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตาม เพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 -2559 (ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2558		2559	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
020	Early syphilis (A51) ซิฟิลิสระยะเริ่ม	รวม	211	0.32	221	0.34
		ชาย	141	0.44	148	0.46
		หญิง	70	0.21	73	0.22
021	Other syphilis (A52-A53) ซิฟิลิสอื่น ๆ	รวม	2,000	3.08	2,376	3.65
		ชาย	1,199	3.75	1,289	4.04
		หญิง	801	2.42	1,087	3.28
022	Gonococcal infection (A54) การติดเชื้อหนองใน	รวม	378	0.58	405	0.62
		ชาย	252	0.79	275	0.86
		หญิง	126	0.38	130	0.39
023	Sexually transmitted chlamydial diseases (A55-A56) โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จากเชื้อคลามัยเดีย	รวม	54	0.08	44	0.07
		ชาย	26	0.08	28	0.09
		หญิง	28	0.08	16	0.05
024	Other infections with a predominantly sexual mode of transmission (A57-A64) โรคติดเชื้ออื่น ๆ ที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นส่วนใหญ่	รวม	2,597	3.99	2,622	4.03
		ชาย	688	2.15	684	2.14
		หญิง	1,909	5.77	1,938	5.85
025	Relapsing fever (A68) โรคไขกลับซ้ำ	รวม	6	0.01	5	0.01
		ชาย	3	0.01	3	0.01
		หญิง	3	0.01	2	0.01
026	Trachoma (A71) โรคสีดวงตา	รวม	8	0.01	4	0.01
		ชาย	7	0.02	2	0.01
		หญิง	1	0.00	2	0.01
027	Typhus fever (A75) ไข้รากสาดใหญ่	รวม	14,146	21.75	11,548	17.76
		ชาย	7,953	24.91	6,431	20.16
		หญิง	6,193	18.71	5,117	15.45
028	Acute poliomyelitis (A80) โรคโปลิโอเฉียบพลัน	รวม	224	0.34	268	0.41
		ชาย	136	0.43	135	0.42
		หญิง	88	0.27	133	0.40
029	Rabies (A82) โรคพิษสุนัขบ้า	รวม	5	0.01	12	0.02
		ชาย	4	0.01	9	0.03
		หญิง	1	0.00	3	0.01

ตาราง 23 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตาม เพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 -2559 (ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2558		2559	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
030	Viral encephalitis (A83-A86) สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส	รวม	788	1.21	796	1.22
		ชาย	425	1.33	441	1.38
		หญิง	363	1.10	355	1.07
031	Yellow fever (A95) ไข้เหลือง	รวม	1	0.00	8	0.01
		ชาย	1	0.00	3	0.01
		หญิง	0	0.00	5	0.02
032	Other arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers (A90-A94, A96-A99) ไข้จากไวรัสที่นำโดยแมลงและไขเลือดออกที่เกิดจาก ไวรัสอื่น ๆ	รวม	173,897	267.42	105,126	161.70
		ชาย	86,370	270.48	52,682	165.18
		หญิง	87,527	264.47	52,444	158.35
033	Herpesviral infection (B00) เริม	รวม	5,634	8.66	5,900	9.08
		ชาย	2,582	8.09	2,702	8.47
		หญิง	3,052	9.22	3,198	9.66
034	Varicella and zoster (B01-B02) อีสุกอีใสและงูสวัด	รวม	10,735	16.51	10,594	16.30
		ชาย	5,128	16.06	4,981	15.62
		หญิง	5,607	16.94	5,613	16.95
035	Measles (B05) หัด	รวม	366	0.56	2,668	4.10
		ชาย	203	0.64	1,423	4.46
		หญิง	163	0.49	1,245	3.76
036	Rubella (B06) หัดเยอรมัน	รวม	46	0.07	45	0.07
		ชาย	22	0.07	27	0.08
		หญิง	24	0.07	18	0.05
037	Acute hepatitis B (B16) ตับอักเสบเฉียบพลันชนิดบี	รวม	6,136	9.44	6,274	9.65
		ชาย	3,962	12.41	4,100	12.85
		หญิง	2,174	6.57	2,174	6.56
038	Other viral hepatitis (B15, B17-B19) ตับอักเสบจากไวรัสอื่น ๆ	รวม	45,607	70.14	48,633	74.80
		ชาย	30,508	95.54	32,946	103.30
		หญิง	15,099	45.62	15,687	47.37
039	Human immunodeficiency virus [HIV] disease (B20-B24) ภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากไวรัส (HIV)	รวม	70,847	108.95	69,257	106.53
		ชาย	40,927	128.17	39,967	125.31
		หญิง	29,920	90.41	29,290	88.44

ตาราง 23 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตาม เพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 -2559 (ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2558		2559	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
040	Mumps (B26) คางทูม	รวม	168	0.26	149	0.23
		ชาย	101	0.32	85	0.27
		หญิง	67	0.20	64	0.19
041	Other viral diseases (A81, A87-A89, B03-B04, B07-B09, B25, B27-B34) โรคจากไวรัสอื่น	รวม	48,921	75.23	56,487	86.89
		ชาย	25,223	78.99	30,295	94.99
		หญิง	23,698	71.61	26,192	79.08
042	Mycoses (B35-B49) โรคติดเชื้อรา	รวม	27,745	42.67	27,819	42.79
		ชาย	15,429	48.32	15,221	47.72
		หญิง	12,316	37.21	12,598	38.04
043	Malaria (B50-B54) มาลาเรีย	รวม	4,170	6.41	3,436	5.29
		ชาย	3,187	9.98	2,159	6.77
		หญิง	983	2.97	1,277	3.86
044	Leishmaniasis (B55) โรคไลชมาเนีย	รวม	27	0.04	35	0.05
		ชาย	27	0.08	35	0.11
		หญิง	0	0.00	0	0.00
045	Trypanosomiasis (B56-B57) โรคทริปาโนโซม	รวม	35	0.05	36	0.06
		ชาย	18	0.06	14	0.04
		หญิง	17	0.05	22	0.07
046	Schistosomiasis (B65) โรคติดเชื้อซิสโตโซม	รวม	21	0.03	12	0.02
		ชาย	12	0.04	9	0.03
		หญิง	9	0.03	3	0.01
047	Other fluke infections (B66) โรคพยาธิใบไม้อื่น ๆ	รวม	717	1.10	713	1.10
		ชาย	398	1.25	405	1.27
		หญิง	319	0.96	308	0.93
048	Echinococcosis (B67) โรคพยาธิเอคคิโนคอกคัส	รวม	19	0.03	17	0.03
		ชาย	12	0.04	10	0.03
		หญิง	7	0.02	7	0.02
049	Dracunculiasis (B72) โรคพยาธิดราคันคูลิส	รวม	0	0.00	1	0.00
		ชาย	0	0.00	1	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00

ตาราง 23 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตาม เพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 -2559 (ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2558		2559	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
050	Onchocerciasis (B73) โรคพยาธิออนโคเชอร์คา	รวม	2	0.00	2	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	2	0.01	2	0.01
051	Filariasis (B74) โรคพยาธิฟิลาเรีย	รวม	31	0.05	36	0.06
		ชาย	16	0.05	24	0.08
		หญิง	15	0.05	12	0.04
052	Hookworm diseases (B76) โรคพยาธิปากขอ	รวม	532	0.82	499	0.77
		ชาย	261	0.82	254	0.80
		หญิง	271	0.82	245	0.74
053	Other helminthiasis (B68-B71, B75, B77-B83) โรคพยาธิตัวสัตว์อื่น ๆ	รวม	8,379	12.89	7,968	12.26
		ชาย	5,379	16.85	5,194	16.28
		หญิง	3,000	9.06	2,774	8.38
054	Sequelae of tuberculosis (B90) ผลตามหลังวัณโรค	รวม	25,337	38.96	27,126	41.72
		ชาย	16,702	52.30	18,201	57.07
		หญิง	8,635	26.09	8,925	26.95
055	Sequelae of poliomyelitis (B91) ผลตามหลังโรคโปลิโอ	รวม	81	0.12	79	0.12
		ชาย	42	0.13	46	0.14
		หญิง	39	0.12	33	0.10
056	Sequelae of leprosy (B92) ผลตามหลังโรคเรื้อน	รวม	54	0.08	52	0.08
		ชาย	34	0.11	30	0.09
		หญิง	20	0.06	22	0.07
057	Other infectious and parasitic diseases (A65-A67, A69-A70, A74, A77-A79, B58-B64, B85-B89, B94, B99)	รวม	11,521	17.72	10,991	16.91
		ชาย	6,598	20.66	6,195	19.42
		หญิง	4,923	14.88	4,796	14.48
058	Malignant neoplasm of lip, oral cavity and pharynx (C00-C14) เนื้องอกร้ายของริมฝีปาก ช่องปากและคอหอย	รวม	23,416	36.01	24,293	37.37
		ชาย	16,687	52.26	17,487	54.83
		หญิง	6,729	20.33	6,806	20.55
059	Malignant neoplasm of oesophagus (C15) เนื้องอกร้ายที่หลอดอาหาร	รวม	9,095	13.99	9,641	14.83
		ชาย	7,932	24.84	8,448	26.49
		หญิง	1,163	3.51	1,193	3.60

ตาราง 23 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตาม เพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 -2559 (ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2558		2559	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
060	Malignant neoplasm of stomach (C16) เนื้องอกร้ายที่กระเพาะอาหาร	รวม	10,499	16.15	11,270	17.33
		ชาย	6,105	19.12	6,305	19.77
		หญิง	4,394	13.28	4,965	14.99
061	Malignant neoplasm of colon (C18) เนื้องอกร้ายของลำไส้ใหญ่	รวม	49,655	76.36	54,274	83.48
		ชาย	25,828	80.88	27,855	87.33
		หญิง	23,827	72.00	26,419	79.77
062	Malignant neoplasm of recto sigmoid junction, rectum, anus and anal canal (C19-C21) เนื้องอกร้ายที่รอยต่อลำไส้ใหญ่เร็กตัมและซิกมอยด์	รวม	34,135	52.49	37,664	57.93
		ชาย	19,755	61.87	21,838	68.47
		หญิง	14,380	43.45	15,826	47.79
063	Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts (C22) เนื้องอกร้ายที่ตับและท่อน้ำดีในตับ	รวม	51,610	79.37	54,017	83.09
		ชาย	35,156	110.10	37,417	117.31
		หญิง	16,454	49.72	16,600	50.12
064	Malignant neoplasm of pancreas (C25) เนื้องอกร้ายที่ตับอ่อน	รวม	5,298	8.15	5,404	8.31
		ชาย	2,837	8.88	2,737	8.58
		หญิง	2,461	7.44	2,667	8.05
065	Other malignant neoplasms of digestive organs (C17, C23-C24, C26) เนื้องอกร้ายที่อวัยวะย่อยอาหารอื่น ๆ	รวม	6,428	9.89	6,913	10.63
		ชาย	3,224	10.10	3,513	11.01
		หญิง	3,204	9.68	3,400	10.27
066	Malignant neoplasm of larynx (C32) เนื้องอกร้ายที่กล่องเสียง	รวม	4,801	7.38	5,096	7.84
		ชาย	4,465	13.98	4,715	14.78
		หญิง	336	1.02	381	1.15
067	Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung (C33-C34) เนื้องอกร้ายที่หลอดคอ หลอดลม และปอด	รวม	41,444	63.73	42,067	64.71
		ชาย	26,131	81.83	26,100	81.83
		หญิง	15,313	46.27	15,967	48.21
068	Other malignant neoplasm of respiratory and intrathoracic organs (C30-C31, C37-C39) เนื้องอกร้ายที่อวัยวะหายใจและอวัยวะช่องอก	รวม	2,374	3.65	2,616	4.02
		ชาย	1,545	4.84	1,717	5.38
		หญิง	829	2.50	899	2.71
069	Malignant neoplasm of bone and articular cartilage (C40-C41) เนื้องอกร้ายที่กระดูกและกระดูกอ่อนผิวข้อ	รวม	3,630	5.58	3,475	5.35
		ชาย	2,049	6.42	1,932	6.06
		หญิง	1,581	4.78	1,543	4.66

ตาราง 23 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 -2559 (ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2558		2559	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
070	Malignant melanoma of skin (C43) เนื้องอกร้ายที่เมลาโนมาของผิวหนัง	รวม	821	1.26	786	1.21
		ชาย	396	1.24	411	1.29
		หญิง	425	1.28	375	1.13
071	Other malignant neoplasm of skin (C44) เนื้องอกร้ายที่ผิวหนังอื่น ๆ	รวม	2,693	4.14	2,709	4.17
		ชาย	1,344	4.21	1,356	4.25
		หญิง	1,349	4.08	1,353	4.09
072	Malignant neoplasm of mesothelial and soft tissue (C45-C49) เนื้องอกร้ายที่เมโสซีเรียลและเนื้อเยื่ออ่อน	รวม	4,783	7.36	5,217	8.02
		ชาย	1,990	6.23	2,333	7.31
		หญิง	2,793	8.44	2,884	8.71
073	Malignant neoplasm of breast (C50) เนื้องอกร้ายที่เต้านม	รวม	41,612	63.99	43,801	67.37
		ชาย	416	1.30	385	1.21
		หญิง	41,196	124.48	43,416	131.09
074	Malignant neoplasm of cervix uteri (C53) เนื้องอกร้ายที่ปากมดลูก	รวม	23,688	71.58	24,147	72.91
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	23,688	71.58	24,147	72.91
075	Malignant neoplasm of other and unspecified parts of uterus (C54-C55) เนื้องอกร้ายอื่น ๆ ที่มีได้ระบุส่วนของมดลูก	รวม	8,907	26.91	10,292	31.08
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	8,907	26.91	10,292	31.08
076	Other malignant neoplasm of female genital organs (C51-C52, C56-C58) เนื้องอกร้ายของอวัยวะสืบพันธุ์หญิง	รวม	19,166	57.91	19,704	59.49
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	19,166	57.91	19,704	59.49
077	Malignant neoplasm of prostate (C61) เนื้องอกร้ายที่ต่อมลูกหมาก	รวม	9,304	29.14	9,934	31.15
		ชาย	9,304	29.14	9,934	31.15
		หญิง	0	0.00	0	0.00
078	Other malignant neoplasms of male genital organs (C60, C62-C63) เนื้องอกร้ายของอวัยวะสืบพันธุ์ชาย	รวม	2,145	6.72	2,373	7.44
		ชาย	2,145	6.72	2,373	7.44
		หญิง	0	0.00	0	0.00
079	Malignant neoplasm of bladder (C67) เนื้องอกร้ายที่กระเพาะปัสสาวะ	รวม	10,585	16.28	11,054	17.00
		ชาย	8,240	25.80	8,710	27.31
		หญิง	2,345	7.09	2,344	7.08

ตาราง 23 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 -2559 (ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2558		2559	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
080	Other malignant neoplasm of urinary tract (C64-C66, C68) เนื้องอกร้ายอื่น ๆ ที่ท่อปัสสาวะ	รวม	3,533	5.43	3,667	5.64
		ชาย	2,316	7.25	2,390	7.49
		หญิง	1,217	3.68	1,277	3.86
081	Malignant neoplasm of eye and adnexa (C69) เนื้องอกร้ายของตาและส่วนประกอบ	รวม	969	1.49	911	1.40
		ชาย	484	1.52	469	1.47
		หญิง	485	1.47	442	1.33
082	Malignant neoplasm of brain (C71) เนื้องอกร้ายของสมอง	รวม	4,627	7.12	4,582	7.05
		ชาย	2,473	7.74	2,519	7.90
		หญิง	2,154	6.51	2,063	6.23
083	Malignant neoplasm of other parts of central nervous system (C70, C72) เนื้องอกร้ายที่ส่วนอื่น ๆ ของระบบประสาทส่วนกลาง	รวม	488	0.75	533	0.82
		ชาย	243	0.76	229	0.72
		หญิง	245	0.74	304	0.92
084	Malignant neoplasm of other, ill-defined, secondary, unspecified and multiple sites (C73-C80, C97) เนื้องอกอื่น ๆ และที่ไม่ทราบสาเหตุ เนื้องอกทุติยภูมิที่มีได้ระบุรายละเอียดและเกิดขึ้นหลายแห่ง	รวม	151,520	233.01	162,951	250.64
		ชาย	72,294	226.40	76,856	240.97
		หญิง	79,226	239.39	86,095	259.96
085	Hodgkin's disease (C81) โรคฮอดกินส์	รวม	1,767	2.72	1,850	2.85
		ชาย	1,136	3.56	1,127	3.53
		หญิง	631	1.91	723	2.18
086	Non-Hodgkin's lymphoma (C82-C85) เนื้องอกร้ายลิมโฟมาที่มีไขโรคฮอดกินส์	รวม	20,067	30.86	20,600	31.69
		ชาย	11,279	35.32	11,774	36.92
		หญิง	8,788	26.55	8,826	26.65
087	Leukaemia (C91-C95) ลิวคีเมีย	รวม	22,799	35.06	22,756	35.00
		ชาย	12,877	40.33	12,557	39.37
		หญิง	9,922	29.98	10,199	30.80
088	Other malignant neoplasm of lymphoid, haematopoietic and related tissue (C88-C90, C96) เนื้องอกร้ายอื่น ๆ ของลิมโฟออยด์ ระบบสร้างเม็ดเลือดและเนื้อเยื่อ	รวม	6,149	9.46	6,311	9.71
		ชาย	3,192	10.00	3,241	10.16
		หญิง	2,957	8.93	3,070	9.27

ตาราง 23 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตาม เพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 -2559 (ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2558		2559	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
089	Carcinoma in situ of cervix uteri (D06) มะเร็งจำกัดเฉพาะที่ของปากมดลูก	รวม	1,859	5.62	1,511	4.56
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	1,859	5.62	1,511	4.56
090	Benign neoplasm of skin (D22-D23) เนื้องอกไม่ร้ายของผิวหนัง	รวม	929	1.43	975	1.50
		ชาย	388	1.22	377	1.18
		หญิง	541	1.63	598	1.81
091	Benign neoplasm of breast (D24) เนื้องอกไม่ร้ายของเต้านม	รวม	1,398	2.15	1,348	2.07
		ชาย	13	0.04	6	0.02
		หญิง	1,385	4.18	1,342	4.05
092	Leiomyoma of uterus (D25) ไลโอไมโอมาที่มดลูก	รวม	26,046	78.70	26,905	81.24
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	26,046	78.70	26,905	81.24
093	Benign neoplasm of ovary (D27) เนื้องอกไม่ร้ายที่รังไข่	รวม	2,881	8.71	3,133	9.46
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	2,881	8.71	3,133	9.46
094	Benign neoplasm of urinary organs (D30) เนื้องอกไม่ร้ายที่ระบบปัสสาวะ	รวม	211	0.32	236	0.36
		ชาย	107	0.34	123	0.39
		หญิง	104	0.31	113	0.34
095	Benign neoplasm of brain and other parts of central nervous system (D33) เนื้องอกไม่ร้ายของ สมองและส่วนอื่นของระบบประสาทส่วนกลาง	รวม	1,732	2.66	1,659	2.55
		ชาย	723	2.26	702	2.20
		หญิง	1,009	3.05	957	2.89
096	Other in situ and benign neoplasms and neoplasms of uncertain and unknown behaviour (D00-D05, D07-D21, D26,D28-D29 D31-D32, D34-D48) เนื้องอกไม่ร้ายจำกัดเฉพาะที่ อื่น ๆ และเนื้องอกบางชนิดที่ไม่ทราบพฤติกรรม	รวม	54,183	83.32	57,392	88.28
		ชาย	23,422	73.35	24,974	78.30
		หญิง	30,761	92.95	32,418	97.88
097	Iron deficiency anaemia (D50) โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก	รวม	109,187	167.91	113,903	175.20
		ชาย	45,851	143.59	48,583	152.32
		หญิง	63,336	191.37	65,320	197.23

ตาราง 23 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตาม เพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 -2559 (ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2558		2559	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
098	Other anaemia (D51-D64) โลหิตจางอื่น ๆ	รวม	752,352	1,156.98	775,171	1,192.32
		ชาย	341,151	1,068.36	353,559	1,108.53
		หญิง	411,201	1,242.48	421,612	1,273.02
099	Haemorrhagic conditions and other diseases of blood and blood forming organs (D65-D77) ภาวะเลือดออกอื่น ๆ โรคเลือดและอวัยวะที่สร้างเลือด	รวม	165,355	254.29	171,705	264.11
		ชาย	94,765	296.77	98,283	308.15
		หญิง	70,590	213.29	73,422	221.69
100	Certain disorders involving the immune mechanism (D80-D89) ความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับกลไกของภูมิคุ้มกัน	รวม	1,663	2.56	1,755	2.70
		ชาย	1,113	3.49	1,189	3.73
		หญิง	550	1.66	566	1.71
101	Iodine deficiency related thyroid disorders (E00-E02) การขาดไอโอดีนที่มีความสัมพันธ์กับต่อมธัยรอยด์	รวม	915	1.41	1,100	1.69
		ชาย	302	0.95	382	1.20
		หญิง	613	1.85	718	2.17
102	Thyrotoxicosis (E05) โรคพิษธัยรอยด์	รวม	33,685	51.80	34,527	53.11
		ชาย	8,858	27.74	9,261	29.04
		หญิง	24,827	75.02	25,266	76.29
103	Other disorders of thyroid (E03-E04, E06-E07) ความผิดปกติของต่อมธัยรอยด์อื่น ๆ	รวม	34,409	52.91	38,231	58.80
		ชาย	7,796	24.41	8,688	27.24
		หญิง	26,613	80.41	29,543	89.20
104	Diabetes mellitus (E10-E14) เบาหวาน	รวม	802,087	1,233.46	840,489	1,292.79
		ชาย	314,832	985.94	332,605	1,042.83
		หญิง	487,255	1,472.28	507,884	1,533.51
105	Malnutrition (E40-E46) ทุพโภชนาการ	รวม	22,033	33.88	21,457	33.00
		ชาย	12,618	39.52	12,161	38.13
		หญิง	9,415	28.45	9,296	28.07
106	Vitamin A deficiency (E50) การขาดวิตามินเอ	รวม	91	0.14	111	0.17
		ชาย	34	0.11	48	0.15
		หญิง	57	0.17	63	0.19
107	Other vitamin deficiencies (E51-E56) การขาดวิตามินอื่น ๆ	รวม	2,704	4.16	3,157	4.86
		ชาย	1,409	4.41	1,561	4.89
		หญิง	1,295	3.91	1,596	4.82

ตาราง 23 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตาม เพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 -2559 (ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2558		2559	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
108	Sequelae of malnutrition and other nutritional deficiencies (E64) ผลที่ตามมาของภาวะทุพโภชนาการและภาวะพร่องโภชนาการอื่น ๆ	รวม	84	0.13	66	0.10
		ชาย	35	0.11	36	0.11
		หญิง	49	0.15	30	0.09
109	Obesity (E66) โรคอ้วน	รวม	13,105	20.15	14,090	21.67
		ชาย	4,882	15.29	4,885	15.32
		หญิง	8,223	24.85	9,205	27.79
110	Volume depletion (E86) การขาดปริมาณของเหลวในร่างกาย	รวม	108,561	166.95	95,800	147.35
		ชาย	54,825	171.69	48,901	153.32
		หญิง	53,736	162.37	46,899	141.61
111	Other Endocrine, nutritional and metabolic disorders (E15-E35, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E90) ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิกอื่น ๆ	รวม	2,039,522	3,136.40	2,115,915	3,254.58
		ชาย	968,771	3,033.85	1,010,878	3,169.44
		หญิง	1,070,751	3,235.36	1,105,037	3,336.56
112	Dementia (F00-F03) สมองเสื่อม	รวม	10,671	16.41	11,692	17.98
		ชาย	4,693	14.70	5,064	15.88
		หญิง	5,978	18.06	6,628	20.01
113	Mental and behavioral disorders due to use of alcohol (F10) ความผิดปกติของพฤติกรรมและจิตประสาทที่เกิดจากการเสพแอลกอฮอล์	รวม	110,520	169.96	112,033	172.32
		ชาย	99,109	310.37	100,494	315.08
		หญิง	11,411	34.48	11,539	34.84
114	Mental and behavioral disorders due to other psychoactive substance use (F11-F19) ความผิดปกติทางพฤติกรรมและจิตประสาทที่เกิดจากการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทอื่น ๆ	รวม	23,501	36.14	26,999	41.53
		ชาย	20,728	64.91	23,831	74.72
		หญิง	2,773	8.38	3,168	9.57
115	Schizophrenia, schizotypal and delusional disorders (F20-F29) จิตเภท พฤติกรรมแบบจิตเภท และความหลงผิด	รวม	59,782	91.93	61,698	94.90
		ชาย	37,900	118.69	39,127	122.68
		หญิง	21,882	66.12	22,571	68.15
116	Mood(affective) disorders (F30-F39) ความผิดปกติทางอารมณ์	รวม	35,613	54.77	37,444	57.59
		ชาย	11,826	37.03	12,474	39.11
		หญิง	23,787	71.87	24,970	75.39

ตาราง 23 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตาม เพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 -2559 (ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2558		2559	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
117	Neurotic, stress related and somatoform disorders (F40-F48) โรคประสาท อาการทางกายที่เกิดจากจิตใจและความเครียด	รวม	28,485	43.80	27,491	42.29
		ชาย	8,203	25.69	8,199	25.71
		หญิง	20,282	61.28	19,292	58.25
118	Mental retardation (F70-F79) ภาวะปัญญาอ่อน	รวม	6,907	10.62	7,257	11.16
		ชาย	3,904	12.23	4,179	13.10
		หญิง	3,003	9.07	3,078	9.29
119	Other mental and behavioral disorders (F04-F09, F50-F69, F80-F99) ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมอื่น ๆ	รวม	44,397	68.27	48,050	73.91
		ชาย	25,953	81.28	28,153	88.27
		หญิง	18,444	55.73	19,897	60.08
120	Inflammatory diseases of the central nervous system (G00-G09) การอักเสบของระบบประสาทส่วนกลาง	รวม	27,887	42.89	28,059	43.16
		ชาย	17,174	53.78	17,058	53.48
		หญิง	10,713	32.37	11,001	33.22
121	Parkinson's disease (G20) โรคพาคินสัน	รวม	15,603	23.99	16,845	25.91
		ชาย	7,426	23.26	8,117	25.45
		หญิง	8,177	24.71	8,728	26.35
122	Alzheimer's disease (G30) โรคอัลไซเมอร์	รวม	5,944	9.14	7,179	11.04
		ชาย	2,266	7.10	2,742	8.60
		หญิง	3,678	11.11	4,437	13.40
123	Multiple sclerosis (G35) มัลติเปิล สเคลอโรสิส	รวม	453	0.70	443	0.68
		ชาย	95	0.30	79	0.25
		หญิง	358	1.08	364	1.10
124	Epilepsy (G40-G41) ลมบ้าหมู	รวม	79,385	122.08	82,698	127.20
		ชาย	49,100	153.76	50,688	158.92
		หญิง	30,285	91.51	32,010	96.65
125	Migraine and other headache syndromes (G43-G44) โรคไมเกรนและกลุ่มอาการปวดศีรษะอื่น ๆ	รวม	18,438	28.35	16,820	25.87
		ชาย	5,493	17.20	5,298	16.61
		หญิง	12,945	39.11	11,522	34.79
126	Transient cerebral ischaemic attacks and related syndromes (G45) โรคเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยชั่วคราวและกลุ่มอาการต่อเนื่อง	รวม	11,145	17.14	11,803	18.15
		ชาย	6,039	18.91	6,394	20.05
		หญิง	5,106	15.43	5,409	16.33

ตาราง 23 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 -2559 (ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2558		2559	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
127	Nerve, nerve root and plexus disorders (G50-G59) ความผิดปกติของเส้นประสาท รากประสาท และปมประสาท	รวม	11,895	18.29	12,732	19.58
		ชาย	5,259	16.47	5,589	17.52
		หญิง	6,636	20.05	7,143	21.57
128	Cerebral palsy and other paralytic syndromes (G80-G83) สมองพิการและกลุ่มอาการอัมพาตอื่น ๆ	รวม	45,093	69.34	49,270	75.78
		ชาย	27,655	86.61	30,112	94.41
		หญิง	17,438	52.69	19,158	57.85
129	Other diseases of the nervous system (G10-G13, G21-G26, G31-G32, G36-G37, G46-G47, G60-G73, G90-G99) โรคของระบบประสาทอื่น ๆ	รวม	95,091	146.23	101,767	156.53
		ชาย	52,481	164.35	56,360	176.71
		หญิง	42,610	128.75	45,407	137.10
130	Inflammation of eyelid (H00-H01) การอักเสบของหนังตา	รวม	2,788	4.29	3,117	4.79
		ชาย	1,385	4.34	1,524	4.78
		หญิง	1,403	4.24	1,593	4.81
131	Conjunctivitis and other disorders of conjunctiva (H10-H13) เยื่อตาอักเสบและความผิดปกติของเยื่อตาอื่น ๆ	รวม	20,879	32.11	20,379	31.35
		ชาย	8,516	26.67	8,669	27.18
		หญิง	12,363	37.36	11,710	35.36
132	Keratitis and other disorders of sclera and cornea (H15-H19) กระจกตาอักเสบและความผิดปกติ ของตาขาวและกระจกตาอื่น ๆ	รวม	10,164	15.63	10,811	16.63
		ชาย	5,867	18.37	6,330	19.85
		หญิง	4,297	12.98	4,481	13.53
133	Cataract and other disorders of sclera and cornea (H25-H28) ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ	รวม	244,151	375.46	217,129	333.98
		ชาย	104,669	327.79	93,863	294.29
		หญิง	139,482	421.46	123,266	372.19
134	Retinal detachments and breaks (H33) จอประสาทตาหลุดออกและรอยฉีกของจอประสาทตา	รวม	7,742	11.91	7,899	12.15
		ชาย	4,459	13.96	4,570	14.33
		หญิง	3,283	9.92	3,329	10.05
135	Glaucoma (H40-H42) ต้อหิน	รวม	20,715	31.86	21,702	33.38
		ชาย	9,927	31.09	10,453	32.77
		หญิง	10,788	32.60	11,249	33.97
136	Strabismus (H49-H50) ตาเหล่	รวม	2,815	4.33	3,125	4.81
		ชาย	1,317	4.12	1,508	4.73
		หญิง	1,498	4.53	1,617	4.88

ตาราง 23 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตาม เพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 -2559 (ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2558		2559	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
137	Disorders of refraction and accommodation (H52) ความผิดปกติของสายตาและการเพ่งมอง	รวม	1,531	2.35	1,362	2.09
		ชาย	724	2.27	645	2.02
		หญิง	807	2.44	717	2.16
138	Blindness and low vision (H54) ตาบอดและสายตาเลือนราง	รวม	236,227	363.27	210,366	323.57
		ชาย	100,634	315.15	90,239	282.93
		หญิง	135,593	409.70	120,127	362.71
139	Other diseases of the eye and adnexa (H02-H06, H20-H22, H30-H32, H34-H36, H43-H48, H51, H53, H55-H59) โรคของตาและส่วนประกอบของตาอื่น ๆ	รวม	43,087	66.26	46,264	71.16
		ชาย	20,312	63.61	21,829	68.44
		หญิง	22,775	68.82	24,435	73.78
140	Otitis media and other disorders of middle ear and mastoid (H65-H75) หูชั้นกลางอักเสบและความผิดปกติของหูชั้นกลางและปุ่มกกหูอื่น ๆ	รวม	8,505	13.08	9,275	14.27
		ชาย	4,302	13.47	4,766	14.94
		หญิง	4,203	12.70	4,509	13.61
141	Hearing loss (H90-H91) การสูญเสียการได้ยิน	รวม	3,339	5.13	3,526	5.42
		ชาย	1,820	5.70	1,899	5.95
		หญิง	1,519	4.59	1,627	4.91
142	Other diseases of the ear and mastoid process (H60-H62, H80-H83, H92-H95) โรคของหูและปุ่มกกหูอื่น ๆ	รวม	28,145	43.28	26,919	41.41
		ชาย	8,669	27.15	8,606	26.98
		หญิง	19,476	58.85	18,313	55.29
143	Acute rheumatic fever (I00-I02) ไข้รูมาติกเฉียบพลัน	รวม	590	0.91	572	0.88
		ชาย	285	0.89	257	0.81
		หญิง	305	0.92	315	0.95
144	Chronic rheumatic heart disease (I05-I09) โรคหัวใจรูมาติกเรื้อรัง	รวม	26,850	41.29	26,788	41.20
		ชาย	10,533	32.99	10,444	32.75
		หญิง	16,317	49.30	16,344	49.35
145	Essential (primary) hypertension (I10) ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุ	รวม	1,224,023	1,882.32	1,295,968	1,993.38
		ชาย	522,663	1,636.80	558,481	1,751.03
		หญิง	701,360	2,119.21	737,487	2,226.78
146	Other hypertensive diseases (I11-I15) โรคความดันโลหิตสูงอื่น ๆ	รวม	12,187	18.74	10,102	15.54
		ชาย	5,655	17.71	4,699	14.73
		หญิง	6,532	19.74	5,403	16.31

ตาราง 23 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตาม เพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 -2559 (ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2558		2559	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
147	Acute myocardial infarction (I21-I22) กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน	รวม	81,706	125.65	82,427	126.78
		ชาย	47,065	147.39	47,760	149.74
		หญิง	34,641	104.67	34,667	104.67
148	Other ischaemic heart diseases (I20, I23-I25) โรคหัวใจขาดเลือดอื่น ๆ	รวม	244,167	375.48	245,026	376.88
		ชาย	135,205	423.41	137,972	432.59
		หญิง	108,962	329.24	107,054	323.24
149	Pulmonary embolism (I26) ก้อนเลือดอุดตันในหลอดเลือดใหญ่ของปอด	รวม	5,324	8.19	5,958	9.16
		ชาย	1,840	5.76	2,246	7.04
		หญิง	3,484	10.53	3,712	11.21
150	Conduction disorders and cardiac arrhythmias (I44-I49) ความผิดปกติของการนำกระแสไฟฟ้าหัวใจ และหัวใจเต้นผิดจังหวะ	รวม	221,395	340.46	235,107	361.63
		ชาย	105,525	330.47	112,478	352.66
		หญิง	115,870	350.11	122,629	370.27
151	Heart failure (I50) หัวใจล้มเหลว	รวม	189,759	291.81	193,018	296.89
		ชาย	82,658	258.86	85,103	266.83
		หญิง	107,101	323.61	107,915	325.84
152	Other heart diseases (I27-I43, I51-I52) โรคหัวใจอื่น ๆ	รวม	115,382	177.44	120,151	184.81
		ชาย	55,986	175.33	59,050	185.14
		หญิง	59,396	179.47	61,101	184.49
153	Intracranial haemorrhage (I60-I62) เลือดออกในสมอง	รวม	53,414	82.14	56,920	87.55
		ชาย	31,623	99.03	33,985	106.55
		หญิง	21,791	65.84	22,935	69.25
154	Cerebral infraction (I63) เนื้อสมองตาย	รวม	100,364	154.34	104,322	160.46
		ชาย	54,358	170.23	56,156	176.07
		หญิง	46,006	139.01	48,166	145.43
155	Stroke, not specified as haemorrhage or infarction (I64) เป็นลมหมดสติที่ไม่จัดกลุ่มว่าเป็นจาก เลือดออกในสมองหรือเนื้อสมองตายจากการขาดเลือด	รวม	20,805	31.99	23,349	35.91
		ชาย	11,252	35.24	12,593	39.48
		หญิง	9,553	28.87	10,756	32.48
156	Other cerebrovascular diseases (I65-I69) โรคหลอดเลือดในสมองอื่น ๆ	รวม	104,941	161.38	108,872	167.46
		ชาย	57,621	180.45	59,876	187.73
		หญิง	47,320	142.98	48,996	147.94

ตาราง 23 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตาม เพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 -2559 (ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2558		2559	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
157	Atherosclerosis (I70) อะเทอโรสเคลอโรสิส	รวม	2,200	3.38	2,316	3.56
		ชาย	1,146	3.59	1,224	3.84
		หญิง	1,054	3.18	1,092	3.30
158	Other peripheral vascular diseases (I73) โรคหลอดเลือดส่วนปลายอื่น ๆ	รวม	1,915	2.94	1,974	3.04
		ชาย	1,106	3.46	1,137	3.56
		หญิง	809	2.44	837	2.53
159	Aterial embolism and thrombosis (I74) ลิ่มเลือดและก้อนเลือดอุดตันที่หลอดเลือดแดง	รวม	6,320	9.72	6,268	9.64
		ชาย	3,535	11.07	3,495	10.96
		หญิง	2,785	8.42	2,773	8.37
160	Other disease of arteries, arterioles and capillaries (I71-I72, I77-I79) โรคของหลอดเลือดแดง หลอดเลือดแดงย่อยและแคปิลารีอื่น ๆ	รวม	15,183	23.35	16,019	24.64
		ชาย	8,957	28.05	9,605	30.11
		หญิง	6,226	18.81	6,414	19.37
161	Phlebitis, thrombophlebitis, venous embolism and thrombosis (I80-I82) หลอดเลือดดำอักเสบ หลอดเลือดดำอักเสบมีลิ่มเลือดอุดตันและลิ่มเลือด ในหลอดเลือดดำ	รวม	23,095	35.52	25,199	38.76
		ชาย	9,611	30.10	10,619	33.29
		หญิง	13,484	40.74	14,580	44.02
162	Varicose veins of lower extremities (I83) หลอดเลือดดำขอดของระยางส่วนล่าง	รวม	1,547	2.38	1,691	2.60
		ชาย	649	2.03	669	2.10
		หญิง	898	2.71	1,022	3.09
163	Haemorrhoids (I84) ริดสีดวงทวาร	รวม	19,740	30.36	20,468	31.48
		ชาย	11,447	35.85	11,664	36.57
		หญิง	8,293	25.06	8,804	26.58
164	Other diseases of the circulatory system (I85-I99) โรคอื่น ๆ ของระบบไหลเวียนโลหิต	รวม	48,889	75.18	53,455	82.22
		ชาย	29,489	92.35	32,533	102.00
		หญิง	19,400	58.62	20,922	63.17
165	Acute pharyngitis and acute tonsillitis (J02-J03) คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน	รวม	87,888	135.16	95,860	147.45
		ชาย	45,415	142.22	49,665	155.72
		หญิง	42,473	128.34	46,195	139.48
166	Acute laryngitis and tracheitis (J04) กล่องเสียงและหลอดลมใหญ่อักเสบเฉียบพลัน	รวม	1,068	1.64	1,118	1.72
		ชาย	594	1.86	626	1.96
		หญิง	474	1.43	492	1.49

ตาราง 23 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตาม เพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 -2559 (ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2558		2559	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
167	Other acute upper respiratory infections (J00-J01, J05-J06) การติดเชื้อของทางเดินหายใจ ส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ	รวม	76,250	117.26	88,315	135.84
		ชาย	40,162	125.77	46,718	146.48
		หญิง	36,088	109.04	41,597	125.60
168	Influenza (J09-J11) ไข้หวัดใหญ่	รวม	28,322	43.55	53,048	81.60
		ชาย	14,633	45.83	27,497	86.21
		หญิง	13,689	41.36	25,551	77.15
169	Pneumonia (J12-J18) ปอดบวม	รวม	456,776	702.44	514,823	791.87
		ชาย	255,676	800.69	289,141	906.55
		หญิง	201,100	607.64	225,682	681.43
170	Acute bronchitis and acute bronchiolitis (J20-J21) หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็ก อักเสบเฉียบพลัน	รวม	177,511	272.98	187,747	288.78
		ชาย	98,204	307.54	102,480	321.31
		หญิง	79,307	239.63	85,267	257.46
171	Chronic sinusitis (J32) ไซนัสอักเสบเรื้อรัง	รวม	5,989	9.21	6,205	9.54
		ชาย	3,149	9.86	3,278	10.28
		หญิง	2,840	8.58	2,927	8.84
172	Other diseases of nose and nasal sinuses (J30-J31, J33-J34) โรคอื่นของจมูกและไซนัส	รวม	14,226	21.88	15,510	23.86
		ชาย	7,731	24.21	8,402	26.34
		หญิง	6,495	19.63	7,108	21.46
173	Chronic diseases of tonsils and adenoids (J35) โรคเรื้อรังของต่อมทอนซิลและต่อมน้ำเหลืองในคอ	รวม	9,292	14.29	9,524	14.65
		ชาย	5,105	15.99	5,211	16.34
		หญิง	4,187	12.65	4,313	13.02
174	Other diseases of upper respiratory tract (J36-J39) โรคอื่น ๆ ของระบบหายใจส่วนบน	รวม	7,781	11.97	8,139	12.52
		ชาย	4,482	14.04	4,631	14.52
		หญิง	3,299	9.97	3,508	10.59
175	Bronchitis, emphysema and other chronic obstructive pulmonary diseases (J40-J44) โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้น แบบเรื้อรังอื่น	รวม	249,742	384.06	254,507	391.47
		ชาย	182,007	569.98	187,127	586.71
		หญิง	67,735	204.67	67,380	203.45

ตาราง 23 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตาม เพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 -2559 (ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2558		2559	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
176	Asthma (J45-J46) โรคหืด	รวม	115,577	177.74	119,037	183.10
		ชาย	44,574	139.59	44,763	140.35
		หญิง	71,003	214.54	74,274	224.26
177	Bronchioectasis (J47) โรคหลอดลมเล็กโป่งพอง	รวม	13,781	21.19	15,155	23.31
		ชาย	6,579	20.60	7,168	22.47
		หญิง	7,202	21.76	7,987	24.12
178	Pneumoconiosis (J60-J65) โรคฝุ่นสะสมในปอด	รวม	242	0.37	269	0.41
		ชาย	185	0.58	214	0.67
		หญิง	57	0.17	55	0.17
179	Other diseases of the respiratory system (J22, J66-J99) โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินหายใจ	รวม	322,170	495.44	339,697	522.50
		ชาย	187,661	587.69	198,864	623.51
		หญิง	134,509	406.43	140,833	425.23
180	Dental caries (K02) ฟันผุ	รวม	8,180	12.58	8,184	12.59
		ชาย	4,486	14.05	4,425	13.87
		หญิง	3,694	11.16	3,759	11.35
181	Other disorders of teeth and supporting structures (K00-K01, K03-K08) ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง	รวม	18,153	27.92	17,560	27.01
		ชาย	9,925	31.08	9,578	30.03
		หญิง	8,228	24.86	7,982	24.10
182	Other diseases of the oral cavity, salivary glands and jaws (K09-K14) โรคอื่น ๆ ของช่องปาก ต่อมน้ำลายและขากรรไกร	รวม	20,119	30.94	20,619	31.71
		ชาย	10,215	31.99	10,395	32.59
		หญิง	9,904	29.93	10,224	30.87
183	Gastric and duodenal ulcer (K25-K27) แผลเปื่อยของกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น	รวม	42,875	65.93	40,926	62.95
		ชาย	27,381	85.75	26,671	83.62
		หญิง	15,494	46.82	14,255	43.04
184	Gastritis and duodenitis (K29) กระเพาะอาหารอักเสบและลำไส้เล็กส่วนต้นอักเสบ	รวม	85,932	132.15	97,356	149.75
		ชาย	45,548	142.64	51,337	160.96
		หญิง	40,384	122.02	46,019	138.95
185	Other diseases of oesophagus, stomach and duodenum (K20-K23, K28, K30-K31) โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและลำไส้เล็กส่วนต้น	รวม	172,594	265.42	167,053	256.95
		ชาย	74,413	233.04	72,527	227.40
		หญิง	98,181	296.66	94,526	285.41

ตาราง 23 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตาม เพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 -2559 (ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2558		2559	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
186	Diseases of appEndix (K35-K38) โรคของไส้ติ่ง	รวม	96,502	148.40	93,714	144.15
		ชาย	45,323	141.94	44,090	138.24
		หญิง	51,179	154.64	49,624	149.84
187	Inguinal hernia (K40) ไส้เลื่อนที่บริเวณขาหนีบ	รวม	34,146	52.51	34,319	52.79
		ชาย	32,222	100.91	32,347	101.42
		หญิง	1,924	5.81	1,972	5.95
188	Other hernia (K41-K46) ไส้เลื่อนอื่น ๆ	รวม	5,911	9.09	6,282	9.66
		ชาย	2,671	8.36	2,819	8.84
		หญิง	3,240	9.79	3,463	10.46
189	Crohn's disease and ulcerative colitis (K50-K51) โรคโครนและลำไส้ใหญ่อักเสบแผลเปื่อย	รวม	1,142	1.76	1,192	1.83
		ชาย	568	1.78	596	1.87
		หญิง	574	1.73	596	1.80
190	Paralytic ileus and intestinal obstruction without hernia (K56) ลำไส้ไม่ทำงานและลำไส้เกิดอุดตันแบบไม่มีไส้เลื่อน	รวม	38,143	58.66	39,569	60.86
		ชาย	22,642	70.91	23,704	74.32
		หญิง	15,501	46.84	15,865	47.90
191	Diverticular disease of intestine (K57) โรคต่งเนื้อของลำไส้	รวม	7,321	11.26	8,031	12.35
		ชาย	3,600	11.27	4,131	12.95
		หญิง	3,721	11.24	3,900	11.78
192	Other diseases of intestine and peritoneum (K52-K55, K58-K67) โรคอื่น ๆ ของลำไส้และเยื่อช่องท้อง	รวม	108,465	166.80	111,844	172.03
		ชาย	59,255	185.57	61,266	192.09
		หญิง	49,210	148.69	50,578	152.72
193	Alcoholic liver disease (K70) โรคตับเกี่ยวกับแอลกอฮอล์	รวม	56,910	87.52	57,234	88.03
		ชาย	45,404	142.19	45,716	143.34
		หญิง	11,506	34.77	11,518	34.78
194	Other disease of liver (K71-K77) โรคอื่น ๆ ของตับ	รวม	145,094	223.13	149,005	229.19
		ชาย	90,230	282.57	93,620	293.53
		หญิง	54,864	165.78	55,385	167.23
195	Cholelithiasis and cholecystitis (K80-K81) โรคนิ่วในระบบน้ำดีและถุงน้ำดีอักเสบ	รวม	65,536	100.78	67,742	104.20
		ชาย	26,506	83.01	27,356	85.77
		หญิง	39,030	117.93	40,386	121.94

ตาราง 23 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตาม เพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 -2559 (ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2558		2559	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
196	Acute pancreatitis and other disease of the pancreas (K85-K86) ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันและโรคอื่น ๆ ของตับอ่อน	รวม	19,638	30.20	20,616	31.71
		ชาย	14,518	45.47	14,907	46.74
		หญิง	5,120	15.47	5,709	17.24
197	Other diseases of the digestive system (K82-K83, K87-K93) โรคอื่น ๆ ของระบบย่อยอาหาร	รวม	130,734	201.04	131,609	202.43
		ชาย	81,479	255.16	82,189	257.69
		หญิง	49,255	148.83	49,420	149.22
198	Infection of the skin and subcutaneous tissue (L00-L08) โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	รวม	152,990	235.27	142,626	219.38
		ชาย	85,665	268.27	80,035	250.94
		หญิง	67,325	203.43	62,591	188.99
199	Other diseases of the skin and subcutaneous tissue (L10-L99) โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	รวม	113,283	174.21	116,441	179.10
		ชาย	60,117	188.27	61,578	193.07
		หญิง	53,166	160.65	54,863	165.65
200	Rheumatoid arthritis and other inflammatory polyarthropathies (M05-M14) ข้ออักเสบรูมาตอยและข้ออักเสบหลายข้อ	รวม	152,164	234.00	159,880	245.92
		ชาย	98,497	308.46	104,085	326.34
		หญิง	53,667	162.16	55,795	168.47
201	Arthrosis (M15-M19) โรคข้อเสื่อม	รวม	37,132	57.10	37,386	57.50
		ชาย	8,586	26.89	8,537	26.77
		หญิง	28,546	86.25	28,849	87.11
202	Acquired deformities of limbs (M20-M21) ความพิการของแขนขา	รวม	1,907	2.93	1,918	2.95
		ชาย	839	2.63	883	2.77
		หญิง	1,068	3.23	1,035	3.13
203	Other disorders of joints (M00-M03, M22-M25) ความผิดปกติอื่น ๆ ของข้อ	รวม	23,961	36.85	24,595	37.83
		ชาย	15,020	47.04	15,314	48.01
		หญิง	8,941	27.02	9,281	28.02
204	Systemic connective tissue disorders (M30-M36) ความผิดปกติของระบบเนื้อเยื่อประสาน	รวม	25,249	38.83	25,633	39.43
		ชาย	4,789	15.00	4,851	15.21
		หญิง	20,460	61.82	20,782	62.75
205	Cervical and other intervertebral disc disorders (M50-M51) กระดูกสันหลังและหมอนรองกระดูกสันหลังอื่น ๆ	รวม	9,117	14.02	8,551	13.15
		ชาย	4,682	14.66	4,381	13.74
		หญิง	4,435	13.40	4,170	12.59

ตาราง 23 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตาม เพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 -2559 (ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2558		2559	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
206	Other dorsopathies (M40-M49, M53-M54) พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ	รวม	62,431	96.01	61,163	94.08
		ชาย	25,440	79.67	25,491	79.92
		หญิง	36,991	111.77	35,672	107.71
207	Soft tissue disorders (M60-M79) เนื้อเยื่อผิดปกติ	รวม	87,084	133.92	84,804	130.44
		ชาย	44,779	140.23	44,007	137.98
		หญิง	42,305	127.83	40,797	123.18
208	Disorders of bone density and structure (M80-M85) ความผิดปกติของความหนาแน่นของเนื้อ กระดูกและโครงสร้าง	รวม	15,615	24.01	15,814	24.32
		ชาย	5,134	16.08	5,218	16.36
		หญิง	10,481	31.67	10,596	31.99
209	Osteomyelitis (M86) กระดูกอักเสบ	รวม	10,691	16.44	10,666	16.41
		ชาย	6,519	20.42	6,583	20.64
		หญิง	4,172	12.61	4,083	12.33
210	Other diseases of the musculoskeletal system and connective tissue (M87-M99) โรคอื่น ๆ ของระบบกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อประสาน	รวม	13,235	20.35	13,275	20.42
		ชาย	6,744	21.12	6,875	21.56
		หญิง	6,491	19.61	6,400	19.32
211	Acute and rapidly progressive nephritic syndromes (N00-N01) กลุ่มอาการไตอักเสบ เฉียบพลันและชนิดกำเริบเร็ว	รวม	5,911	9.09	4,609	7.09
		ชาย	3,569	11.18	2,768	8.68
		หญิง	2,342	7.08	1,841	5.56
212	Other glomerular diseases (N02-N08) โรคของหน่วยไตอื่น ๆ	รวม	39,477	60.71	40,112	61.70
		ชาย	15,847	49.63	16,024	50.24
		หญิง	23,630	71.40	24,088	72.73
213	Renal tubulo-interstitial diseases (N10-N16) โรคของท่อและเนื้อเยื่อระหว่างท่อในไต	รวม	107,331	165.06	107,289	165.03
		ชาย	38,770	121.41	39,774	124.70
		หญิง	68,561	207.16	67,515	203.86
214	Renal failure (N17-N19) ไตวาย	รวม	646,299	993.89	710,477	1,092.81
		ชาย	322,260	1,009.20	354,548	1,111.63
		หญิง	324,039	979.11	355,929	1,074.70
215	Urolithiasis (N20-N23) นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ	รวม	59,010	90.75	58,209	89.53
		ชาย	36,301	113.68	35,903	112.57
		หญิง	22,709	68.62	22,306	67.35

ตาราง 23 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 -2559 (ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2558		2559	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
216	Cystitis (N30) กระเพาะปัสสาวะอักเสบ	รวม	24,860	38.23	24,230	37.27
		ชาย	7,276	22.79	7,148	22.41
		หญิง	17,584	53.13	17,082	51.58
217	Other diseases of the urinary system (N25-N29, N31-N39) โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะ	รวม	225,529	346.82	236,674	364.04
		ชาย	91,309	285.95	97,045	304.27
		หญิง	134,220	405.56	139,629	421.60
218	Hyperplasia of prostate (N40) ต่อมลูกหมากโตจากการเพิ่มจำนวนเซลล์	รวม	70,804	221.73	77,790	243.90
		ชาย	70,804	221.73	77,790	243.90
		หญิง	0	0.00	0	0.00
219	Other disorders of prostate (N41-N42) ความผิดปกติอื่น ๆ ของต่อมลูกหมาก	รวม	713	2.23	784	2.46
		ชาย	713	2.23	784	2.46
		หญิง	0	0.00	0	0.00
220	Hydrocele and spermatocele (N43) ถุงน้ำและถุงที่มีอสุจิที่อั้นทะ	รวม	3,496	10.95	3,512	11.01
		ชาย	3,496	10.95	3,512	11.01
		หญิง	0	0.00	0	0.00
221	Redundant prepuce, phimosis and paraphimosis (N47) หนังหุ้มปลายองคชาตยาวเกินไป ปลายตีบรูเปิดไม่ได้หรือเปิดลำบาก	รวม	5,308	16.62	5,375	16.85
		ชาย	5,308	16.62	5,375	16.85
		หญิง	0	0.00	0	0.00
222	Other disease of male genital organs (N44-N46, N48-N51) โรคอื่น ๆ ของอวัยวะสืบพันธุ์ชาย	รวม	10,904	34.15	11,494	36.04
		ชาย	10,904	34.15	11,494	36.04
		หญิง	0	0.00	0	0.00
223	Disorders of breast (N60-N64) ความผิดปกติของเต้านม	รวม	8,860	13.63	9,124	14.03
		ชาย	615	1.93	569	1.78
		หญิง	8,245	24.91	8,555	25.83
224	Salpingitis and oophoritis (N70) ปีกมดลูกและรังไข่อักเสบ	รวม	2,500	7	2,693	8.13
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	2,500	7.55	2,693	8.13
225	Inflammatory disease of cervix uteri (N72) ปากมดลูกอักเสบ	รวม	731	2.21	808	2.44
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	731	2.21	808	2.44

ตาราง 23 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตาม เพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 -2559 (ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2558		2559	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
226	Other inflammatory diseases of female pelvic organs (N71, N73-N77) การอักเสบอื่น ๆ ของอวัยวะในอุ้งเชิงกรานสตรี	รวม	20,277	61.27	21,089	63.68
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	20,277	61.27	21,089	63.68
227	Endometriosis (N80) เยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่	รวม	12,763	38.56	13,682	41.31
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	12,763	38.56	13,682	41.31
228	Female genital prolapse (N81) การหย่อนตัวออกมาของอวัยวะสืบพันธุ์สตรี	รวม	5,085	15.36	4,939	14.91
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	5,085	15.36	4,939	14.91
229	Noninflammatory disorder of ovary, fallopian tube and broad ligament (N83) ความผิดปกติอื่นที่ไม่ใช่การอักเสบของรังไข่ ท่อรังไข่และเอ็นยึดมดลูก	รวม	8,626	26.06	9,328	28.17
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	8,626	26.06	9,328	28.17
230	Disorder of menstruation (N91-N92) ความผิดปกติของระดู	รวม	10,645	32.16	10,113	30.54
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	10,645	32.16	10,113	30.54
231	Menopausal and other perimenopausal disorders (N95) การหมดประจำเดือนและความผิดปกติอื่นในระยหมดประจำเดือน	รวม	4,227	12.77	4,318	13.04
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	4,227	12.77	4,318	13.04
232	Female infertility (N97) ภาวะมีบุตรยากในสตรี	รวม	298	0.90	307	0.93
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	298	0.90	307	0.93
233	Other disorders of genitourinary tract (N82, N84-N90, N93-N94, N96, N98-N99) ความผิดปกติอื่น ๆ ของท่อทางเดินปัสสาวะและสืบพันธุ์	รวม	24,373	73.64	24,474	73.90
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	24,373	73.64	24,474	73.90
234	Spontaneous abortion (O03) แท้งเอง	รวม	14,052	42.46	13,017	39.30
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	14,052	42.46	13,017	39.30
235	Medical abortion (O04) การทำแท้งโดยเหตุผลทางการแพทย์	รวม	1,640	4.96	1,498	4.52
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	1,640	4.96	1,498	4.52

ตาราง 23 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตาม เพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 -2559 (ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2558		2559	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
236	Other pregnancies with abortive outcome (O00-O02, O05-O08) การตั้งครรภ์อื่น ๆ ที่สิ้นสุดโดยการแท้ง	รวม	28,931	87.42	28,297	85.44
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	28,931	87.42	28,297	85.44
237	Oedema, proteinuria and hypertensive disorders in pregnancy, childbirth and the puerperium (O10-O16) การบวม การมีโปรตีนในปัสสาวะ และความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ ระยะคลอดและระยะหลังคลอด	รวม	23,542	71.13	24,664	74.47
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	23,542	71.13	24,664	74.47
238	Placenta praevia, premature separation of placenta and antepartum haemorrhage (O44-O46) รกเกาะต่ำ รกลอกตัวก่อนกำหนด และตกเลือดก่อนคลอด	รวม	6,047	18.27	5,829	17.60
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	6,047	18.27	5,829	17.60
239	Other maternal care related to fetus and amniotic cavity and possible delivery problems (O30-O43, O47-O48) การดูแลมารดาอื่น ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ์ และถุงน้ำคร่ำ และปัญหาที่อาจจะเกิดได้ในระยะคลอด	รวม	147,757	446.46	148,810	449.32
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	147,757	446.46	148,810	449.32
240	Obstructed labour (O64-O66) การคลอดติดขัด	รวม	25,822	78.02	24,102	72.77
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	25,822	78.02	24,102	72.77
241	Postpartum haemorrhage (O72) ตกเลือดหลังคลอด	รวม	11,505	34.76	12,077	36.47
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	11,505	34.76	12,077	36.47
242	Other complications of pregnancy and delivery (O20-O29, O60-O63, O67-O71, O73-O75, O81-O84)	รวม	293,511	886.87	293,228	885.38
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	293,511	886.87	293,228	885.38
243	Single spontaneous delivery (O80) การคลอดของครรภ์เดียว	รวม	236,016	713.14	232,601	702.32
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	236,016	713.14	232,601	702.32

ตาราง 23 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตาม เพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 -2559 (ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2558		2559	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
244	Complications predominantly related to the puerperium and other obstetric conditions, not Elsewhere classified (O85-O99) ภาวะแทรกซ้อนที่ส่วนใหญ่พบในระยะหลังคลอด และภาวะทางสูติกรรมอื่น ๆ ที่มิได้ระบุรายละเอียด	รวม	65,183	196.96	67,990	205.29
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	65,183	196.96	67,990	205.29
245	Fetus and newborn affected by maternal factors and by complications of pregnancy, labor and delivery (P00-P04) ทารกในครรภ์และแรกเกิดที่ได้รับผลจากปัจจัยทางมารดา และโรคแทรกในระยะตั้งครรภ์ เจ็บครรภ์ และคลอด	รวม	31,398	48.28	30,315	46.63
		ชาย	16,230	50.83	15,926	49.93
		หญิง	15,168	45.83	14,389	43.45
246	Slow fetal growth, fetal malnutrition and disorders related to short gestation and low birth weight (P05-P07) ทารกในครรภ์โตช้า ทารกในครรภ์ขาดสารอาหาร และความผิดปกติเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ระยะสั้น และน้ำหนักทารกแรกเกิดน้อย	รวม	68,966	106.06	69,569	107.01
		ชาย	33,627	105.31	34,619	108.54
		หญิง	35,339	106.78	34,950	105.53
247	Birth trauma (P10-P15) บาดเจ็บจากการคลอด	รวม	8,632	13.27	8,282	12.74
		ชาย	5,085	15.92	4,925	15.44
		หญิง	3,547	10.72	3,357	10.14
248	Intrauterine hypoxia and birth asphyxia (P20-P21) ขาดออกซิเจนขณะอยู่ในโพรงมดลูก และภาวะแอสฟิกเซียเมื่อแรกเกิด	รวม	14,410	22.16	13,906	21.39
		ชาย	7,998	25.05	7,697	24.13
		หญิง	6,412	19.37	6,209	18.75
249	Other respiratory disorders originating in the perinatal period (P22-P28) ภาวะหายใจผิดปกติอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด	รวม	67,790	104.25	72,906	112.14
		ชาย	40,112	125.62	43,363	135.96
		หญิง	27,678	83.63	29,543	89.20
250	Congenital infectious and parasitic diseases (P35-P37) การติดเชื้อแต่กำเนิดและโรคปรสิต	รวม	32,431	49.87	36,244	55.75
		ชาย	17,651	55.28	19,966	62.60
		หญิง	14,780	44.66	16,278	49.15
251	Other infections specific to the perinatal period (P38-P39) การติดเชื้อเฉพาะอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด	รวม	5,944	9.14	5,581	8.58
		ชาย	3,424	10.72	3,170	9.94
		หญิง	2,520	7.61	2,411	7.28

ตาราง 23 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตาม เพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 -2559 (ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2558		2559	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
252	Haemolytic disease of fetus and newborn (P55) โรคเม็ดเลือดแดงของทารกในครรภ์และแรกเกิด	รวม	7,728	11.88	8,131	12.51
		ชาย	3,954	12.38	4,182	13.11
		หญิง	3,774	11.40	3,949	11.92
253	Other conditions originating in the perinatal period (P08, P29, P50-P54, P56-P96) ภาวะอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด	รวม	250,573	385.33	248,064	381.56
		ชาย	136,526	427.55	136,205	427.05
		หญิง	114,047	344.60	111,859	337.75
254	Spina bifida (Q05) กระดูกสันหลังแยก	รวม	617	0.95	677	1.04
		ชาย	294	0.92	294	0.92
		หญิง	323	0.98	383	1.16
255	Other congenital malformations of the nervous system (Q00-Q04, Q06-Q07) ความผิดปกติอื่น ๆ แต่กำเนิดของระบบประสาท	รวม	3,412	5.25	3,566	5.49
		ชาย	1,808	5.66	1,867	5.85
		หญิง	1,604	4.85	1,699	5.13
256	Congenital malformation of the circulatory system (Q20-Q28) ความผิดปกติแต่กำเนิดของระบบ ไหลเวียนโลหิต	รวม	33,146	50.97	34,229	52.65
		ชาย	16,530	51.77	17,011	53.34
		หญิง	16,616	50.21	17,218	51.99
257	Cleft lip and cleft palate (Q35-Q37) ปากแหว่งและเพดานโหว่	รวม	4,789	7.36	4,901	7.54
		ชาย	2,551	7.99	2,577	8.08
		หญิง	2,238	6.76	2,324	7.02
258	Absence, atresia and stenosis of small intestine (Q41) ลำไส้เล็กไม่มี ตันและตีบ	รวม	386	0.59	363	0.56
		ชาย	200	0.63	199	0.62
		หญิง	186	0.56	164	0.50
259	Other congenital malformations of the digestive system (Q38-Q40, Q42-Q45) ความผิดปกติแต่กำเนิดอื่น ๆ ของระบบย่อยอาหาร	รวม	26,532	40.80	29,494	45.37
		ชาย	15,546	48.68	17,452	54.72
		หญิง	10,986	33.20	12,042	36.36
260	Undescended testicle (Q53) อัณฑะไม่ลงถุง	รวม	2,504	7.84	2,679	8.40
		ชาย	2,504	7.84	2,679	8.40
		หญิง	0	0.00	0	0.00
261	Other malformations of the genitourinary system (Q50-Q52, Q54-Q64) ความผิดปกติอื่น ๆ ของระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ	รวม	4,865	7.48	5,189	7.98
		ชาย	3,077	9.64	3,316	10.40
		หญิง	1,788	5.40	1,873	5.66

ตาราง 23 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตาม เพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 -2559 (ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2558		2559	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
262	Congenital deformities of hip (Q65) ความพิการแต่กำเนิดของสะโพก	รวม	372	0.57	378	0.58
		ชาย	132	0.41	131	0.41
		หญิง	240	0.73	247	0.75
263	Congenital deformities of feet (Q66) ความพิการแต่กำเนิดของเท้า	รวม	2,745	4.22	2,666	4.10
		ชาย	1,449	4.54	1,342	4.21
		หญิง	1,296	3.92	1,324	4.00
264	Other congenital malformations and deformations of the musculoskeletal system (Q67-Q79) ความผิดปกติและความพิการแต่กำเนิดอื่น ๆ ของระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง	รวม	5,627	8.65	5,909	9.09
		ชาย	3,039	9.52	3,221	10.10
		หญิง	2,588	7.82	2,688	8.12
265	Other congenital malformations (Q10-Q18, Q30-Q34, Q80-Q89) ความผิดปกติแต่กำเนิดอื่น ๆ	รวม	10,427	16.03	10,854	16.70
		ชาย	5,576	17.46	5,784	18.13
		หญิง	4,851	14.66	5,070	15.31
266	Chromosomal abnormalities, not Elsewhere classified (Q90-Q99) ความผิดปกติของโครโมโซมที่ไม่ได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น	รวม	6,136	9.44	6,721	10.34
		ชาย	3,202	10.03	3,569	11.19
		หญิง	2,934	8.87	3,152	9.52
267	Abdominal and pelvic pain (R10) ปวดท้องและปวดอุ้งเชิงกราน	รวม	30,509	46.92	30,294	46.60
		ชาย	12,089	37.86	12,004	37.64
		หญิง	18,420	55.66	18,290	55.23
268	Fever of unknown origin (R50) ไข้ไม่ทราบสาเหตุ	รวม	86,060	132.34	97,308	149.67
		ชาย	44,284	138.68	50,434	158.13
		หญิง	41,776	126.23	46,874	141.53
269	Senility (R54) ชราภาพ	รวม	3,543	5.45	2,139	3.29
		ชาย	1,425	4.46	864	2.71
		หญิง	2,118	6.40	1,275	3.85
270	Other symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not Elsewhere classified (R00-R09, R11-R49, R51-R53, R55-R99) อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจทางคลินิกและตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ไม่ได้มีรหัสระบุไว้	รวม	749,696	1,152.89	768,087	1,181.43
		ชาย	384,894	1,205.35	397,101	1,245.05
		หญิง	364,802	1,102.28	370,986	1,120.16

ตาราง 23 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 -2559 (ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2558		2559	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
271	Fracture of skull and facial bones (S02)กระดูก แตกหักบริเวณกะโหลกศีรษะและกระดูกหน้า	รวม	32,750	50.36	34,935	53.74
		ชาย	26,434	82.78	28,271	88.64
		หญิง	6,316	19.08	6,664	20.12
272	Fracture of neck, thorax and pelvis (S12, S22, S32, T08) กระดูกคอ กระดูกซี่โครง หรือกระดูกเชิงกรานหัก	รวม	28,637	44.04	29,873	45.95
		ชาย	19,062	59.70	19,962	62.59
		หญิง	9,575	28.93	9,911	29.93
273	Fracture of femur (S72) กระดูกต้นขาแตก หัก ร้าว	รวม	37,693	57.96	40,711	62.62
		ชาย	16,912	52.96	18,362	57.57
		หญิง	20,781	62.79	22,349	67.48
274	Fracture of other limb bones (S42, S52, S62, S82, S92, T10, T12) กระดูกแตกหักของแขนขาอื่น ๆ	รวม	125,045	192.30	129,859	199.74
		ชาย	85,171	266.73	87,721	275.04
		หญิง	39,874	120.48	42,138	127.23
275	Fracture involving multiple body regions (T02) กระดูกแตกหักหลายบริเวณในร่างกาย	รวม	85	0.13	94	0.14
		ชาย	65	0.20	65	0.20
		หญิง	20	0.06	29	0.09
276	Dislocations, sprains and strains of specified and multiple body regions (S03, S13, S23, S33, S43,S53, S63, S73, S83, S93, T03) กระดูกเคลื่อน เคล็ด ชัด บริเวณร่างกายหลายแห่งที่ระบุเฉพาะ	รวม	19,808	30.46	20,175	31.03
		ชาย	13,406	41.98	13,610	42.67
		หญิง	6,402	19.34	6,565	19.82
277	Injury of eye and orbi (S05) การบาดเจ็บของตาและเบ้าตา	รวม	11,470	17.64	11,474	17.65
		ชาย	9,006	28.20	8,861	27.78
		หญิง	2,464	7.45	2,613	7.89
278	Intracranial injury (S06) การบาดเจ็บภายในกะโหลกศีรษะ	รวม	78,375	120.53	85,106	130.91
		ชาย	57,013	178.54	61,290	192.16
		หญิง	21,362	64.55	23,816	71.91
279	Injury of other internal organs (S26-S27, S36-S37) การบาดเจ็บของอวัยวะภายในอื่น ๆ	รวม	23,342	35.90	23,707	36.46
		ชาย	19,022	59.57	19,303	60.52
		หญิง	4,320	13.05	4,404	13.30

ตาราง 23 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตาม เพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 -2559 (ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2558		2559	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
280	Crushing injuries and traumatic amputations of specified and multiple body regions (S07-S08, S17-S18, S28, S38, S47-S48, S57-S58, S67-S68, S77-S78, S87-S88, S97-S98, T04-T05) การบาดเจ็บจากการบดอัดและการบาดเจ็บที่เกิดจากตัดขาบริเวณร่างกายหลายแห่งที่ระบุเฉพาะ	รวม	6,363	9.79	6,321	9.72
		ชาย	5,177	16.21	5,133	16.09
		หญิง	1,186	3.58	1,188	3.59
281	Other injuries of specified, unspecified and multiple body regions (S00-S01, S04, S09-S11, S14-S16, S19-S21, S24-S25, S29-S31, S34-S35, S39-S41, S44-S46, S49-S51, S54-S56, S59-S61, S64-S66, S69-S71, S74-S76, S79-S81, S84-S86, S89-S91, S94-S96, S99, T00-T01, T06-T07, T09, T11, T13-T14) การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย	รวม	199,113	306.20	200,281	308.06
		ชาย	144,076	451.19	143,737	450.66
		หญิง	55,037	166.30	56,544	170.73
282	Effects of foreign body entering through natural orifice (T15-T19) ผลของวัตถุแปลกปลอมผ่านเข้าทางทวารธรรมชาติของร่างกาย	รวม	6,434	9.89	6,406	9.85
		ชาย	3,751	11.75	3,812	11.95
		หญิง	2,683	8.11	2,594	7.83
283	Burns and corrosions (T20-T32) แผลถูกความร้อนและถูกสารกัดกร่อน	รวม	22,264	34.24	22,314	34.32
		ชาย	14,624	45.80	14,379	45.08
		หญิง	7,640	23.08	7,935	23.96
284	Poisoning by drugs and biological substances (T36-T50) การเป็นพิษจากยา เครื่องยาและชีววัตถุ	รวม	31,244	48.05	30,207	46.46
		ชาย	12,903	40.41	12,399	38.88
		หญิง	18,341	55.42	17,808	53.77
285	Toxic effects of substances chiefly nonmedicinal as to source (T51-T65) การเป็นพิษจากสารที่โดยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ใช้เป็นยา	รวม	46,078	70.86	43,542	66.97
		ชาย	26,758	83.80	25,366	79.53
		หญิง	19,320	58.38	18,176	54.88
286	Maltreatment syndromes (T74) กลุ่มอาการจากการทารุณ	รวม	449	0.69	413	0.64
		ชาย	86	0.27	73	0.23
		หญิง	363	1.10	340	1.03

ตาราง 23 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตาม เพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 -2559 (ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2558		2559	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
287	Other and unspecified effects of external causes (T33-T35, T66-T73, T75-T78) อื่น ๆ และที่มีได้ระบุผลของสาเหตุภายนอก	รวม	30,040	46.20	32,597	50.14
		ชาย	16,982	53.18	18,526	58.09
		หญิง	13,058	39.46	14,071	42.49
288	Certain early complications of trauma and complications of surgical and medical care, note Elsewhere classified (T79-T88) ภาวะแทรกซ้อนระยะแรกของการบาดเจ็บบางชนิดและภาวะแทรกซ้อนของการรักษาทางศัลยกรรมและอายุรกรรมที่มีได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น	รวม	132,237	203.36	142,362	218.97
		ชาย	75,222	235.57	80,674	252.94
		หญิง	57,015	172.28	61,688	186.26
289	Sequela of injuries, of poisoning and of other consequences of external causes (T90-T98) ผลระยะล่าของการบาดเจ็บ การเป็นพิษและผลที่ตามมาจากสาเหตุภายนอกอื่น ๆ	รวม	2,155	3.31	2,391	3.68
		ชาย	1,538	4.82	1,793	5.62
		หญิง	617	1.86	598	1.81
290	Persons encountering health services for examination and investigation (Z00-Z13) บุคคลขอรับบริการเพื่อการตรวจและชันสูตร	รวม	45,656	70.21	46,446	71.44
		ชาย	17,674	55.35	18,262	57.26
		หญิง	27,982	84.55	28,184	85.10
291	Asymptomatic human immunodeficiency virus (HIV) infection status (Z21) การติดเชื้อไวรัสโดยไม่มีอาการ	รวม	2,711	4.17	2,809	4.32
		ชาย	1,257	3.94	1,311	4.11
		หญิง	1,454	4.39	1,498	4.52
292	Other persons with potential health hazards related to communicable diseases (Z20, Z22-Z29) บุคคลที่มีอาการที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่อ	รวม	105,120	161.65	95,379	146.71
		ชาย	53,609	167.88	49,071	153.85
		หญิง	51,511	155.64	46,308	139.82
293	Contraceptive management (Z30) การรับบริการคุมกำเนิด	รวม	67,326	103.53	79,533	122.33
		ชาย	151	0.47	53	0.17
		หญิง	67,175	202.97	79,480	239.98
294	Antenatal screening and other supervision of pregnancy (Z34-Z36) การตรวจคัดกรองก่อนการคลอด และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งครรภ์อื่น ๆ	รวม	18,517	55.95	20,147	60.83
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	18,517	55.95	20,147	60.83

ตาราง 23 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 -2559 (ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2558		2559	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
295	Liveborn infants according to place of birth (Z38) การเกิดของทารกตามสถานที่เกิด	รวม	578,208	889.18	559,774	861.01
		ชาย	297,999	933.23	289,153	906.59
		หญิง	280,209	846.67	270,621	817.12
296	Postpartum care and examination (Z39) การดูแลและการตรวจหลังคลอด	รวม	1,932	5.84	2,036	6.15
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	1,932	5.84	2,036	6.15
297	Persons encountering health services for specific procedures and health care (Z40-Z54, Z40-Z54) บุคคลขอรับบริการสุขภาพ เพื่อหัตถการหรือการบริการสุขภาพที่ระบุเฉพาะ	รวม	308,395	474.25	340,086	523.10
		ชาย	155,241	486.16	171,352	537.25
		หญิง	153,154	462.77	168,734	509.48
298	Persons encountering health services for other reasons (Z31-Z33, Z37, Z55-Z99) บุคคลขอรับบริการสุขภาพด้วยเหตุผลอื่น	รวม	482,321	741.72	494,737	760.98
		ชาย	57,716	180.75	69,245	217.11
		หญิง	424,605	1,282.98	425,492	1,284.74

รวมรวม / วิเคราะห์ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แหล่งข้อมูล : สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สภส.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ตาราง 24 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน ตามกลุ่มสาเหตุภายนอกของการบาดเจ็บ จำแนกเพศ รายภาค/กรุงเทพมหานคร ตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 พ.ศ. 2559

สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง(ไม่รวม กทม.)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
รวมทุกกลุ่มโรค	รวม	476,730	733.28	94,840	812.80	119,604	720.93	72,588	783.50	163,209	745.54	26,489	473.11
	ชาย	302,962	949.89	59,464	1,037.81	74,685	926.38	45,459	995.94	106,429	976.58	16,925	641.07
	หญิง	173,768	524.68	35,376	595.70	44,919	526.71	27,129	577.19	56,780	516.50	9,564	323.24
Pedestrian injured in transport accident (V01-V09) คนเดินเท้าที่บาดเจ็บในอุบัติเหตุจากการขนส่ง	รวม	2,865	4.41	344	2.95	871	5.25	471	5.08	773	3.53	406	7.25
	ชาย	1,813	5.68	214	3.73	570	7.07	284	6.22	505	4.63	240	9.09
	หญิง	1,052	3.18	130	2.19	301	3.53	187	3.98	268	2.44	166	5.61
Pedal cyclist injured in transport accident (V10-V19) ผู้ขี่จักรยานบาดเจ็บในอุบัติเหตุจากการขนส่ง	รวม	7,781	11.97	1,846	15.82	1,571	9.47	1,027	11.09	2,963	13.53	374	6.68
	ชาย	5,203	16.31	1,153	20.12	1,050	13.02	696	15.25	2,041	18.73	263	9.96
	หญิง	2,578	7.78	693	11.67	521	6.11	331	7.04	922	8.39	111	3.75
Motorcycle rider injured in transport accident (V20-V29) คนขี่รถจักรยานยนต์บาดเจ็บในอุบัติเหตุจากการขนส่ง	รวม	62,568	96.24	9,098	77.97	20,947	126.26	10,153	109.59	16,367	74.76	6,003	107.22
	ชาย	46,252	145.02	6,711	117.13	15,321	190.04	6,956	152.40	12,454	114.28	4,810	182.19
	หญิง	16,316	49.26	2,387	40.20	5,626	65.97	3,197	68.02	3,913	35.59	1,193	40.32
Occupant of three-wheeled motor vehicle injured in transport accident (V30-V39) ผู้ใช้สามล้อเครื่องบาดเจ็บ	รวม	796	1.22	210	1.80	171	1.03	145	1.57	225	1.03	45	0.80
	ชาย	551	1.73	139	2.43	120	1.49	88	1.93	167	1.53	37	1.40
	หญิง	245	0.74	71	1.20	51	0.60	57	1.21	58	0.53	8	0.27
Car occupant injured in transport accident (V40-V49) ผู้ใช้รถยนต์บาดเจ็บจากอุบัติเหตุในการขนส่ง	รวม	2,898	4.46	505	4.33	990	5.97	530	5.72	670	3.06	203	3.63
	ชาย	1,881	5.90	321	5.60	655	8.12	331	7.25	441	4.05	133	5.04
	หญิง	1,017	3.07	184	3.10	335	3.93	199	4.23	229	2.08	70	2.37

ตาราง 24 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน ตามกลุ่มสาเหตุภายนอกของการบาดเจ็บ จำแนกเพศ รายภาค/กรุงเทพมหานคร ตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 พ.ศ. 2559 (ต่อ)

สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง(ไม่รวม กทม.)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
Occupant of pick-up truck or van injured in transport accident(V50-V59) ผู้ใช้รถบรรทุกหรือรถตู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ	รวม	2,413	3.71	379	3.25	796	4.80	444	4.79	704	3.22	90	1.61
	ชาย	1,639	5.14	265	4.62	526	6.52	322	7.05	465	4.27	61	2.31
	หญิง	774	2.34	114	1.92	270	3.17	122	2.60	239	2.17	29	0.98
Occupant of heavy transport vehicle injured in transport accident (V60-V69) ผู้ใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุขนส่ง	รวม	413	0.64	66	0.57	142	0.86	56	0.60	131	0.60	18	0.32
	ชาย	344	1.08	55	0.96	112	1.39	47	1.03	113	1.04	17	0.64
	หญิง	69	0.21	11	0.19	30	0.35	9	0.19	18	0.16	1	0.03
Bus occupant injured in transport accident (V70-V79) ผู้ใช้รถโดยสารบาดเจ็บจากอุบัติเหตุขนส่ง	รวม	102	0.16	12	0.10	23	0.14	6	0.06	47	0.21	14	0.25
	ชาย	51	0.16	4	0.07	12	0.15	2	0.04	26	0.24	7	0.27
	หญิง	51	0.15	8	0.13	11	0.13	4	0.09	21	0.19	7	0.24
Other land transport accidents (V80-V89) อุบัติเหตุจากการขนส่งทางบกอื่น	รวม	1,741	2.68	553	4.74	184	1.11	59	0.64	927	4.23	18	0.32
	ชาย	1,439	4.51	449	7.84	145	1.80	56	1.23	777	7.13	12	0.45
	หญิง	302	0.91	104	1.75	39	0.46	3	0.06	150	1.36	6	0.20
Water transport accidents (V90-V94) อุบัติเหตุจากการขนส่งทางน้ำ	รวม	109	0.17	4	0.03	45	0.27	44	0.47	10	0.05	6	0.11
	ชาย	82	0.26	3	0.05	31	0.38	39	0.85	6	0.06	3	0.11
	หญิง	27	0.08	1	0.02	14	0.16	5	0.11	4	0.04	3	0.10
Air and space transport accidents (V95-V97) อุบัติเหตุจากการขนส่งทางอากาศและอวกาศ	รวม	16	0.02	1	0.01	3	0.02	8	0.09	1	0.00	3	0.05
	ชาย	16	0.05	1	0.02	3	0.04	8	0.18	1	0.01	3	0.11
	หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

ตาราง 24 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน ตามกลุ่มสาเหตุภายนอกของการบาดเจ็บ จำแนกเพศ รายภาค/กรุงเทพมหานคร ตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 พ.ศ. 2559 (ต่อ)

สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง(ไม่รวม กทม.)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
Other and unspecified transport accidents (V98-V99) อุบัติเหตุการขนส่งอื่นและที่ไม่ระบุ	รวม	56	0.09	5	0.04	14	0.08	8	0.09	5	0.02	24	0.43
	ชาย	39	0.12	4	0.07	11	0.14	6	0.13	3	0.03	15	0.57
	หญิง	17	0.05	1	0.02	3	0.04	2	0.04	2	0.02	9	0.30
Falls (W00-W19) การพลัดตกหกล้ม	รวม	118,557	182.36	29,614	253.80	26,789	161.47	15,134	163.35	39,935	182.42	7,085	126.54
	ชาย	65,516	205.41	16,186	282.49	14,184	175.94	8,144	178.42	23,456	215.23	3,546	134.31
	หญิง	53,041	160.15	13,428	226.12	12,605	147.80	6,990	148.72	16,479	149.90	3,539	119.61
Exposure to inanimate mechanical forces (W20-W49) บาดเจ็บจากการถูกวัตถุกลไกที่ไม่มีชีวิต	รวม	76,694	117.97	16,508	141.48	16,857	101.61	11,204	120.93	29,524	134.87	2,601	46.46
	ชาย	59,656	187.04	12,910	225.32	12,952	160.65	8,665	189.84	23,111	212.06	2,018	76.44
	หญิง	17,038	51.44	3,598	60.59	3,905	45.79	2,539	54.02	6,413	58.34	583	19.70
Exposure to animate mechanical forces (W50-W64) บาดเจ็บจากการถูกกระทำจากสิ่งมีชีวิต	รวม	22,256	34.23	3,568	30.58	6,518	39.29	4,554	49.15	7,125	32.55	491	8.77
	ชาย	13,111	41.11	2,168	37.84	3,622	44.93	2,753	60.31	4,287	39.34	281	10.64
	หญิง	9,145	27.61	1,400	23.57	2,896	33.96	1,801	38.32	2,838	25.82	210	7.10
Accidental drowning and submersion (W65-W74) อุบัติเหตุจากการตกน้ำรวมถึงการจมน้ำ	รวม	1,224	1.88	147	1.26	404	2.44	234	2.53	393	1.80	46	0.82
	ชาย	844	2.65	97	1.69	278	3.45	154	3.37	283	2.60	32	1.21
	หญิง	380	1.15	50	0.84	126	1.48	80	1.70	110	1.00	14	0.47
Other accidental threats to breathing (W75-W84) อุบัติเหตุอื่นที่คุกคามต่อการหายใจ	รวม	427	0.66	89	0.76	86	0.52	90	0.97	142	0.65	20	0.36
	ชาย	255	0.80	52	0.91	54	0.67	53	1.16	82	0.75	14	0.53
	หญิง	172	0.52	37	0.62	32	0.38	37	0.79	60	0.55	6	0.20

ตาราง 24 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน ตามกลุ่มสาเหตุภายนอกของการบาดเจ็บ จำแนกเพศ รายภาค/กรุงเทพมหานคร ตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 พ.ศ. 2559 (ต่อ)

สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง(ไม่รวม กทม.)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
Exposure to electric current, radiation and extreme ambient air temperature and pressure (W85-W99) อุบัติเหตุจากกระแสไฟฟ้า รังสี อุณหภูมิอากาศและความกดอากาศที่ผิดปกติ	รวม	5,327	8.19	751	6.44	1,369	8.25	774	8.35	2,289	10.46	144	2.57
	ชาย	3,623	11.36	569	9.93	962	11.93	500	10.95	1,474	13.53	118	4.47
	หญิง	1,704	5.15	182	3.06	407	4.77	274	5.83	815	7.41	26	0.88
Exposure to smoke, fire and flames (X00-X09) การถูกควัน ไฟและเปลวไฟ	รวม	2,014	3.10	411	3.52	395	2.38	256	2.76	880	4.02	72	1.29
	ชาย	1,433	4.49	276	4.82	285	3.54	201	4.40	622	5.71	49	1.86
	หญิง	581	1.75	135	2.27	110	1.29	55	1.17	258	2.35	23	0.78
Contact with heat and hot substances (X10-X19) การถูกความร้อนและสารร้อน	รวม	4,955	7.62	921	7.89	1,123	6.77	799	8.62	1,850	8.45	262	4.68
	ชาย	2,732	8.57	495	8.64	608	7.54	447	9.79	1,040	9.54	142	5.38
	หญิง	2,223	6.71	426	7.17	515	6.04	352	7.49	810	7.37	120	4.06
Contact with venomous animals and plants (X20-X29) สัมผัสกับสัตว์หรือพืชมีพิษ	รวม	32,066	49.32	5,305	45.47	8,699	52.43	8,587	92.69	9,047	41.33	428	7.64
	ชาย	19,480	61.08	3,243	56.60	5,117	63.47	5,308	116.29	5,580	51.20	232	8.79
	หญิง	12,586	38.00	2,062	34.72	3,582	42.00	3,279	69.76	3,467	31.54	196	6.62
Exposure to forces of nature (X30-X39) ภัยอันตรายจากพลังตามธรรมชาติ	รวม	756	1.16	154	1.32	272	1.64	58	0.63	243	1.11	29	0.52
	ชาย	666	2.09	133	2.32	256	3.18	53	1.16	199	1.83	25	0.95
	หญิง	90	0.27	21	0.35	16	0.19	5	0.11	44	0.40	4	0.14

ตาราง 24 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน ตามกลุ่มสาเหตุภายนอกของการบาดเจ็บ จำแนกเพศ รายภาค/กรุงเทพมหานคร ตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 พ.ศ. 2559 (ต่อ)

สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง(ไม่รวม กทม.)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
Accidental poisoning by and exposure to noxious substances (X40-X49) การเป็นพิษโดยอุบัติเหตุ	รวม	17,310	26.63	3,060	26.22	4,433	26.72	3,363	36.30	5,941	27.14	513	9.16
	ชาย	9,172	28.76	1,618	28.24	2,427	30.10	1,746	38.25	3,122	28.65	259	9.81
	หญิง	8,138	24.57	1,442	24.28	2,006	23.52	1,617	34.40	2,819	25.64	254	8.58
Overexertion, travel and privation (X50-X57) การออกกำลังกายมากเกินไป การเดินทางและการขาดแคลน	รวม	1,445	2.22	284	2.43	425	2.56	179	1.93	464	2.12	93	1.66
	ชาย	917	2.88	157	2.74	266	3.30	117	2.56	310	2.84	67	2.54
	หญิง	528	1.59	127	2.14	159	1.86	62	1.32	154	1.40	26	0.88
Accidental exposure to other and unspecified factors (X58-X59) ภัยอันตรายจากปัจจัยอื่นหรือปัจจัยที่มีได้ระบุโดยบังเอิญ	รวม	15,898	24.45	2,327	19.94	3,201	19.29	1,949	21.04	8,068	36.85	353	6.30
	ชาย	8,767	27.49	1,300	22.69	1,685	20.90	1,039	22.76	4,562	41.86	181	6.86
	หญิง	7,131	21.53	1,027	17.29	1,516	17.78	910	19.36	3,506	31.89	172	5.81
Intentional self-harm (X60-X84) การทำร้ายตัวเอง	รวม	16,211	24.93	3,734	32.00	5,451	32.86	2,182	23.55	4,048	18.49	796	14.22
	ชาย	7,068	22.16	1,787	31.19	2,255	27.97	870	19.06	1,817	16.67	339	12.84
	หญิง	9,143	27.61	1,947	32.79	3,196	37.48	1,312	27.91	2,231	20.29	457	15.45
Assault (X85-Y09) การถูกทำร้าย	รวม	30,603	47.07	4,390	37.62	7,146	43.07	4,572	49.35	12,455	56.89	2,040	36.44
	ชาย	24,104	75.57	3,270	57.07	5,576	69.16	3,576	78.35	9,956	91.36	1,726	65.38
	หญิง	6,499	19.62	1,120	18.86	1,570	18.41	996	21.19	2,499	22.73	314	10.61
Event of undetermined intent (Y10-Y34) เหตุการณ์ที่ไม่อาจระบุเจตนา	รวม	6,599	10.15	1,379	11.82	1,455	8.77	898	9.69	2,370	10.83	497	8.88
	ชาย	3,557	11.15	761	13.28	734	9.10	475	10.41	1,317	12.08	270	10.23
	หญิง	3,042	9.19	618	10.41	721	8.45	423	9.00	1,053	9.58	227	7.67

ตาราง 24 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน ตามกลุ่มสาเหตุภายนอกของการบาดเจ็บ จำแนกเพศ รายภาค/กรุงเทพมหานคร ตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 พ.ศ. 2559 (ต่อ)


สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง(ไม่รวม กทม.)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
Legal intervention and operations of war (Y35-Y36) ปฏิบัติการหรือการแทรกแซงทางกฎหมายและการทำสงคราม	รวม	69	0.11	3	0.03	6	0.04	28	0.30	2	0.01	30	0.54
	ชาย	57	0.18	3	0.05	6	0.07	18	0.39		0.00	30	1.14
	หญิง	12	0.04		0.00		0.00	10	0.21	2	0.02		0.00
Drugs, medicaments and biological substances causing adverse effects in therapeutic use (Y40-Y59) ยา เครื่องยาและชีววัตถุที่เป็นสาเหตุให้เกิดอาการแทรกซ้อนเมื่อใช้ในการรักษา	รวม	9,363	14.40	2,038	17.47	2,161	13.03	1,297	14.00	3,423	15.64	444	7.93
	ชาย	4,185	13.12	912	15.92	948	11.76	565	12.38	1,549	14.21	211	7.99
	หญิง	5,178	15.63	1,126	18.96	1,213	14.22	732	15.57	1,874	17.05	233	7.87
Misadventures to patients during surgical and medical care (Y60-Y69) ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยขณะให้การรักษาทางศัลยกรรมและอายุรกรรม	รวม	1,074	1.65	239	2.05	253	1.52	103	1.11	292	1.33	187	3.34
	ชาย	570	1.79	145	2.53	121	1.50	50	1.10	145	1.33	109	4.13
	หญิง	504	1.52	94	1.58	132	1.55	53	1.13	147	1.34	78	2.64
Medical devices associated with adverse incidents in diagnostic and therapeutic use (Y70-Y82) ความผิดพลาดในการวินิจฉัยและการรักษาเนื่องจากความบกพร่องของอุปกรณ์ทางการแพทย์	รวม	4,562	7.02	1,680	14.40	1,146	6.91	226	2.44	780	3.56	730	13.04
	ชาย	2,660	8.34	997	17.40	668	8.29	135	2.96	463	4.25	397	15.04
	หญิง	1,902	5.74	683	11.50	478	5.60	91	1.94	317	2.88	333	11.25

ตาราง 24 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน ตามกลุ่มสาเหตุภายนอกของการบาดเจ็บ จำแนกเพศ รายภาค/กรุงเทพมหานคร ตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 พ.ศ. 2559 (ต่อ)

สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง(ไม่รวม กทม.)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
Surgical and other medical procedures as the cause of abnormal reaction of the patient, or of later complication, without mention of misadventure at the time of the procedure (Y83-Y84) วิธีการรักษาทางศัลยกรรมและอายุรกรรมที่มีผลทำให้เกิดความผิดปกติของผู้ป่วย	รวม	25,678	39.50	4,760	40.79	5,297	31.93	2,828	30.52	10,513	48.02	2,280	40.72
	ชาย	14,107	44.23	2,791	48.71	2,899	35.96	1,555	34.07	5,675	52.07	1,187	44.96
	หญิง	11,571	34.94	1,969	33.16	2,398	28.12	1,273	27.08	4,838	44.01	1,093	36.94
Sequelae of external causes of morbidity and mortality (Y85-Y89) ผลที่ตามมาจากสาเหตุภายนอกการป่วยและตาย	รวม	1,569	2.41	406	3.48	267	1.61	284	3.07	506	2.31	106	1.89
	ชาย	993	3.11	250	4.36	177	2.20	177	3.88	321	2.95	68	2.58
	หญิง	576	1.74	156	2.63	90	1.06	107	2.28	185	1.68	38	1.28
Supplementary factors related to causes of morbidity and mortality classified elsewhere (Y90-Y98) ปัจจัยเสริมที่มีความสัมพันธ์กับสาเหตุการป่วยและตายที่มีได้ระบุไว้ที่อื่น	รวม	315	0.48	49	0.42	94	0.57	38	0.41	96	0.44	38	0.68
	ชาย	179	0.56	25	0.44	49	0.61	23	0.50	59	0.54	23	0.87
	หญิง	136	0.41	24	0.40	45	0.53	15	0.32	37	0.34	15	0.51

รวบรวม / วิเคราะห์ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แหล่งข้อมูล : สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สทส.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)



กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข